

**2017 年全国卫生专业技术资格考试护理学(中级)
考前压轴密卷**

社区护理学

模拟试卷(一)

金英杰国家医学考试研究中心 编



答题须知

- 1.考生答题前应先检查试卷封面标示的考试类别和每页页角所标出的考试类别是否与本人准考证上的报考类别一致。
- 2.在开始答题前,请再次核对自己在答题卡上填写的姓名、准考证号、报考类别、考试单元等是否完整无误。
- 3.在开始答题前,请考生检查试卷有无缺损、重印、错印,发现上述情况应立即报告监考员。
- 4.答题卡上的考生信息和答案的所有信息点,必须使用 2B 铅笔按答题卡上“注意事项”栏中的要求填涂,如需要作修改,应用橡皮将原涂黑的地方擦净。
- 5.答题卡上“考场记录”一栏由监考员负责填写,考生不得自行填写。
- 6.答题卡将采用计算机阅卷,请考生注意保持答题卡平整、干净。
- 7.考试开始后半小时内,考生不得交卷离开考场。
- 8.考试结束后,请把试卷和答题卡分别翻放在桌上,不得带出考场。
- 9.监考员验收试卷和答题卡后,经监考员允许,考生方可离开考场。
- 10.考生如违反监考员宣读的“考场指令”和本“答题须知”,其一切后果由本人承担。

模拟试卷(一)

基础知识

一、以下每一道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应这母所属的方框涂黑。

- 1.关于巨幼细胞贫血的实验室检查结果,不妥的是
- A.属大细胞性贫血
 - B.白细胞、血小板增生显著
 - C.骨髓检查见红系增生活跃,可见各阶段巨幼红细胞
 - D.血清维生素 B 低于正常
 - E.血清叶酸低于正常值
- 2.欲衡量小儿营养状况,首先应做下列哪项检查
- A.头围
 - B.测体重
 - C.身长的测量
 - D.上、下部量
 - E.坐高
- 3.我国流行性乙脑的流行季节主要是
- A.春季
 - B.春夏季
 - C.夏秋季
 - D.秋冬季
 - E.冬季
- 4.用农历计算预产期,应如何推算
- A.月份减 3 或加 9,日期加 7
 - B.月份减 3 或加 9,日期加 8
 - C.月份减 3 或加 9,日期加 10
 - D.月份减 3 或加 9,日期加 13
 - E.月份减 3 或加 9,日期加 15
- 5.初乳具有下列特点,但除外
- A.是产后 5~7 天分泌的乳汁
 - B.量足
 - C.含蛋白质多,脂肪少
 - D.富含免疫物质
 - E.有生长发育调节因子
- 6.支气管自哪级开始参与气体交换
- A.支气管
 - B.终末细支气管
 - C.呼吸性细支气管
 - D.肺泡管
 - E.肺泡囊
- 7.中央型肺癌一般是指发生在
- A.主支气管
 - B.叶支气管
 - C.段支气管
 - D.段支气管以下主支气管
 - E.段支气管以上主支气管
- 8.高钾血症的原因不包括
- A.静脉补钾过快
 - B.急性肾功能衰竭
 - C.输入大量库存血
 - D.持续胃肠减压
 - E.代谢性酸中毒
- 9.下列不属于冠心病危险因素的是
- A.高血压
 - B.血脂异常
 - C.女性绝经期前
 - D.40 岁以上
 - E.吸烟
- 10.对胰腺癌有定性诊断意义的是
- A.超声波
 - B.CT

- C. 癌胚抗原测定
 D. 细胞学检查
 E. X 线造影
11. 慢性胃炎的确诊依据是
 A. 胃液分析
 B. X 线钡餐
 C. 胃镜检查
 D. 腹部 B 超
 E. 腹部 CT
12. 新生儿出生后, 开始喂哺母乳时间是
 A. 15~30 分钟
 B. 3~4 小时
 C. 6~8 小时
 D. 12 小时
 E. 24 小时
13. 下列属于临产标志的是
 A. 见红, 规律宫缩, 胎头下降
 B. 规律宫缩, 破膜, 胎头下降
 C. 见红, 破膜, 宫口扩张
 D. 见红, 破膜, 规律宫缩
 E. 规律宫缩, 胎头下降, 宫口扩张
14. 新生儿胎粪的特点是
 A. 褐色、干厚
 B. 金黄色、糊状
 C. 陶土色、软膏状
 D. 淡黄色水样便
 E. 墨绿色、黏稠状
15. 结肠癌最常见的组织学类型是
 A. 黏液癌
 B. 腺癌
 C. 未分化癌
 D. 黏液腺癌
 E. 类癌
16. 引起再生障碍性贫血最多见的药物是
 A. 阿司匹林
 B. 柔红霉素
 C. 氯霉素
 D. 保泰松
- E. 环磷酰胺
17. 麻疹的主要传播途径是
 A. 血液传播
 B. 呼吸道传播
 C. 消化道传播
 D. 皮肤接触传播
 E. 间接传播
18. 好发于儿童的卵巢肿瘤是
 A. 无性细胞瘤
 B. 内胚窦瘤
 C. 畸胎瘤
 D. 颗粒细胞瘤
 E. 勃勒纳瘤
19. 乳腺淋巴结转移的常见部位是
 A. 锁骨上淋巴结
 B. 锁骨下淋巴结
 C. 患侧腋下淋巴结
 D. 健侧腋下淋巴结
 E. 胸骨旁淋巴结
20. 大便潜血持续阳性多提示
 A. 浅表性胃炎
 B. 萎缩性胃炎
 C. 胃溃疡
 D. 十二指肠壶腹部溃疡
 E. 胃癌
21. 属于特异性感染的是
 A. 金黄色葡萄球菌感染
 B. 大肠埃希菌感染
 C. 铜绿假单胞菌感染
 D. 乙型溶血性链球菌感染
 E. 破伤风芽胞梭菌感染
22. 女性生命中可发育成熟的卵泡数目是
 A. 200 个或以下
 B. 200~300 个
 C. 300~400 个
 D. 400~500 个
 E. 500 个以上
23. 心肺复苏后, 最常见的继发性病理改

变是

- A. 心肌缺氧性损伤
- B. 肺透明膜形成
- C. 脑缺氧性损伤
- D. 急性胃黏膜糜烂
- E. 肾小管上皮细胞大量坏死

24. 诊断外伤性血气胸最简便可靠的依据是

- A. 病人出现呼吸困难及低血容量症状
- B. 胸腔穿刺抽出血液和气体
- C. X线检查患侧大片密度增高阴影
- D. 叩诊患侧为浊音,呼吸音减弱
- E. 胸部超声探查见有液平面

25. 颅内压的正常范围是

- A. 0.4~0.6 kPa (40~60 mmH₂O)
- B. 0.7~2.0 kPa (70~200 mmH₂O)
- C. 2.1~2.8 kPa (210~280 mmH₂O)
- D. 2.8~3.6 kPa (280~360 mmH₂O)
- E. 3.7~4.6 kPa (370~460 mmH₂O)

26. 属于高渗性脱水病理生理特点的是

- A. 失钠>失水
- B. 失水>失钠
- C. 失水=失钾
- D. 失钾<失水
- E. 失钠>失钾

27. 肠梗阻时,肠腔积液主要来自

- A. 经口饮入尚未被吸收的水
- B. 梗阻近端的胃肠分泌物
- C. 肠腔渗出液
- D. 肠壁血管漏出液
- E. 肠壁炎症渗出液

28. 肝癌特异性的血清标志物是

- A. 谷氨酰转肽酶
- B. 甲胎蛋白
- C. 谷丙转氨酶
- D. 乳酸脱氢酶同工酶
- E. α -抗胰蛋白酶

29. 有家族史的卵巢癌患者为

- A. 8%~12%

- B. 15%~20%

- C. 20%~25%

- D. 25%~30%

- E. 35%以上

30. 卵巢良性肿瘤中临床最常见的是

- A. 脂肪瘤
- B. 黏液性囊腺瘤
- C. 纤维瘤
- D. 浆液性囊腺瘤
- E. 成熟畸胎瘤

31. 与胆道蛔虫病发病无关的是

- A. 胃肠道功能紊乱
- B. 恶心、呕吐
- C. 体温升高
- D. 运动
- E. 驱虫不当

32. 主动脉瓣狭窄引起心功能代偿最主要的是

- A. 心脏节律改变
- B. 左心室肥厚
- C. 回心血容量增加
- D. 左心室腔扩大
- E. 右心房扩张

33. 引起左心室后负荷增加的主要因素是

- A. 二尖瓣狭窄
- B. 静脉回流增加
- C. 相对性主动脉瓣狭窄
- D. 外周血管阻力增加
- E. 动脉血容量增加

34. 急性胃炎按病因及病理变化的不同,分为不同类型,其中最常见的是

- A. 溃疡型
- B. 糜烂型
- C. 单纯型
- D. 出血型
- E. 感染型

35. 慢性支气管炎病情加剧的重要因素是

- A.大气污染
 B.粉尘刺激
 C.吸烟
 D.反复感染
 E.过敏
- 36.临床诊断新生儿低血糖标准为:血糖<
- A.1.2 mmol/L
 B.1.67 mmol/L
 C.2.2 mmol/L
 D.3.2 mmol/L
 E.3.67 mmol/L
- 37.引起上呼吸道感染的最常见病原体是
- A.革兰阳性细菌
 B.病毒
 C.肺炎支原体
 D.肺炎衣原体
 E.真菌
- 38.常见引起胃泌素升高的疾病是
- A.十二指肠球部溃疡
 B.单纯型胃炎
 C.胃溃疡
 D.糜烂型胃炎
 E.慢性萎缩性胃体胃炎
- 39.典型心绞痛的诱因中,应该除外
- A.情绪激动
 B.贫血
 C.体力劳动
 D.睡眠
 E.甲亢
- 40.患者被诊断为子痫前期轻度,其 24 小时尿蛋白定量超过
- A.0.15 g
 B.0.3 g
 C.0.4 g
 D.0.5 g
 E.0.7 g
- 41.先天性巨结肠的发病机制主要由于
- A.结肠的平滑肌发育不良
 B.结肠交感神经丛发育不良
 C.扩张结肠部分的平滑肌和弹力纤维发育不良
 D.结肠肠壁的肌间神经节细胞缺失
 E.病变发生在结肠近端
- 42.对判断新生儿缺血缺氧性脑病的预后有一定参考价值的检查是
- A.神经元特异性烯醇化酶
 B.脑电图
 C.头颅 B 超
 D.CT 扫描
 E.核磁共振
- 43.妊娠期 B 超监护不能显示的项目是
- A.胎肺成熟度
 B.胎方位
 C.有无胎心搏动
 D.胎头双顶径
 E.胎盘位置
- 44.可提示功血的发生是由于黄体功能不足的检查为
- A.基础体温呈单相型
 B.基础体温呈双相型,但上升缓慢,高温相 10 天
 C.经前宫颈黏液结晶检查出现羊齿植物叶状结晶
 D.经前血清孕酮值处在卵泡期水平
 E.经前阴道脱落细胞涂片表现为中高度雌激素作用
- 45.关于复方短效口服避孕药避孕机制的说法,错误的是
- A.抑制排卵
 B.通过异物的局部效应发挥作用
 C.改变子宫内膜形态与功能,不适于受精卵着床
 D.改变宫颈黏液性状使黏液量少、黏度增高,不利精子穿透
 E.受持续的雌、孕激素作用,输卵管的正常分泌和蠕动频率发生改变,从而改变受

精卵正常的运行速度

46.患者,女性,47岁。因子宫内膜癌行全子宫、双附件切除术及盆腔淋巴清扫术,术后48小时拔除尿管后自行排尿,第3天起阴道有尿液流出,同时仍可自行排尿,临床诊断为尿瘘,为明确瘘孔,不需做的辅助检查是

- A.宫腔镜检查
- B.靛胭脂试验
- C.输尿管镜检查
- D.排泄性尿路造影
- E.肾显像

47.吸气性呼吸困难严重者可出现三凹征,三凹征是指

A.胸骨上窝、锁骨上窝和肋间隙在吸气时明显下陷

B.胸骨上窝、锁骨上窝和肋间隙在呼气时明显下陷

C.胸骨上窝、锁骨下窝和肋间隙在吸气时明显下陷

D.胸骨下窝、锁骨上窝和肋间隙在吸气时明显下陷

E.胸骨上窝、锁骨下窝和肋间隙在呼气时明显下陷

48.形成慢性阻塞性肺气肿最常见的病因是

- A.慢性支气管炎
- B.支气管哮喘
- C.支气管扩张
- D.肺结核
- E.肺间质纤维化

49.抗结核化学药物治疗的治疗原则是

- A.早期、联合、足量、规律、全程
- B.早期、联合、足量、规律、长期
- C.早期、联合、适量、规律、全程
- D.早期、联合、适量、规律
- E.早期、联合、适量、全程

50.诊断呼吸衰竭的正确依据是

- A.发绀,呼吸困难

B.肺通气功能明显减退

C.呼吸的节律、频率和幅度发生改变

D.结膜充血、水肿和精神、神经症状

E. $\text{PaCO}_2 > 6.6 \text{ kPa}$ (50 mmHg)、 $\text{PaO}_2 <$

8.0 kPa(60 mmHg)

51.干性支气管扩张的唯一症状是

- A.慢性咳嗽
- B.大量脓痰
- C.咯血
- D.咳痰与体位变化有关
- E.呼吸困难

52.可以导致心脏压力负荷加重的疾病是

- A.主动脉瓣关闭不全
- B.室间隔缺损
- C.甲状腺功能亢进
- D.肺动脉高压
- E.慢性贫血

53.室性期前收缩的心电图特征不包括

- A.提前出现的QRS波群
- B.QRS波群时限超过0.12秒
- C.QRS波宽大畸形
- D.QRS前有P波
- E.代偿间歇完全

54.急性心肌梗死最基本的病因是

- A.体力活动
- B.情绪激动
- C.血压剧升
- D.冠状动脉张力增高
- E.冠状动脉粥样硬化

55.目前最佳的系统性红斑狼疮筛选试验是

- A.狼疮细胞检查
- B.皮肤狼疮带试验
- C.抗核抗体检查
- D.血清补体测定
- E.毛细血管镜检查

56.有机磷农药中毒后,血液中胆碱酯酶活性

- A. 不变
 B. 升至正常人的 70% 以上
 C. 降至正常人的 70% 以下
 D. 升至正常人的 90% 以上
 E. 降至正常人的 90% 以下
57. 患者, 男性, 被汽车撞伤右胸部, 呼吸 20 次/分, 胸部 X 线检查示: 右侧气胸, 肺受压 20%, 处理原则是
- A. 胸穿排气
 B. 观察病情
 C. 胸腔闭式引流
 D. 牵引固定
 E. 手术治疗
58. 诊断膀胱肿瘤最重要、不可或缺的方法是
- A. 膀胱镜检查
 B. 膀胱造影
 C. 双合诊检查
 D. 尿脱落细胞检查
 E. 尿道超声检查
59. 骨巨细胞瘤属于
- A. 骨瘤样病损
 B. 良性肿瘤
 C. 继发性肿瘤
 D. 恶性肿瘤
 E. 潜在恶性肿瘤
60. 擦伤的特点是
- A. 皮下淤血、肿胀
 B. 皮肤水肿
 C. 表皮破损
 D. 皮肤呈多数小裂口及浆液渗出
 E. 创缘较平整, 出血可渗可涌
61. 供移植器官的保存原则是
- A. 常温保存
 B. 低温原则
 C. 延长热缺血时间
 D. 变冷缺血为热缺血
 E. 中断血流后不应立即降温
62. 乳腺癌最常见的病理类型是
- A. 非浸润性癌
 B. 早期浸润性癌
 C. 浸润性特殊癌
 D. 浸润性非特殊癌
 E. 其他罕见癌
63. 腺病毒肺炎的发病年龄多见于
- A. 新生儿
 B. 2~6 个月婴儿
 C. 6~12 个月婴儿
 D. 6~24 个月婴儿
 E. 任何年龄
64. 猩红热治疗首选抗生素是
- A. 红霉素
 B. 青霉素
 C. 新霉素
 D. 庆大霉素
 E. 四环素
65. 符合正常卵巢临床特征的是
- A. 成年女性卵巢约 4 cm × 3 cm × 1 cm 大小
 B. 卵巢由骨盆漏斗韧带与子宫相连
 C. 卵巢髓质内有数以万计的原始卵泡
 D. 位于阔韧带内
 E. 卵巢白膜是一层立方上皮
66. 胎儿纵轴与母体纵轴的关系称为
- A. 胎姿势
 B. 胎儿位置
 C. 胎产式
 D. 胎先露
 E. 胎方位
67. 软产道裂伤多见于
- A. 阴道手术操作不当
 B. 胎盘植入
 C. 凝血功能障碍
 D. 软产道充分扩张
 E. 产程延长
68. 可以早期鉴别葡萄胎和侵蚀性葡萄胎的检查是
- A. 胸部 X 线摄片

- B.刮宫葡萄胎标本
C.B超及彩色多普勒
D.子宫输卵管造影术或宫腔镜
E.血清 β -hCG检测
- 69.引起支气管扩张的最常见病因是
A.支气管先天性发育缺陷
B.支气管外部纤维的牵拉
C.支气管-肺组织感染和阻塞
D.遗传因素
E.机体免疫功能失调
- 70.不属于非特异性感染病原体的是
A.大肠杆菌
B.结核杆菌
C.金黄色葡萄球菌
D.乙型溶血性链球菌
E.铜绿假单胞菌
- 71.患者,男性,77岁。高血压数年,近月来睡眠不佳,排尿困难,体重下降,且有腹部不适感,左侧腹股沟区出现肿块并逐渐增大,可进入阴囊,考虑该患者可能是腹股沟疝,与发病有关的因素是
A.高血压数年
B.睡眠不佳
C.排尿困难
D.腹部不适
E.体重下降
- 72.肾病综合征最根本的病理生理特点是
A.水肿
B.蛋白尿
C.低蛋白血症
D.血清胆固醇增高
E.低密度脂蛋白增高
- 73.膀胱炎的特征性表现不包括
A.尿频
B.尿急
C.尿痛
D.排尿困难
E.晨尿有氨臭味
- 74.患者,女性,55岁。行ECG检查示:P波消失,代之是400次/分左右的f波,QRS波形态正常,QRS波群间隔绝对不规则,心室率通常在每分钟110次,从心电图可诊断
A.房扑
B.室扑
C.房颤
D.室上速
E.室速
- 75.患者,男性,56岁。半年前因原发性肝癌行右半肝切除术,手术后建议其门诊定期随访。最能早期预测癌肿复发的检查是
A.ALT
B.GGT
C.B型超声检查
D.选择性肝动脉造影
E.动态监测AFP的变化
- 76.我国引起慢性肾衰竭的最常见疾病是
A.慢性肾盂肾炎
B.慢性肾小球肾炎
C.狼疮性肾炎
D.高血压肾病
E.糖尿病肾病
- 77.诊断贫血时血红蛋白含量正确的是
A.男性 <160 g/L,女性 <150 g/L
B.男性 <150 g/L,女性 <140 g/L
C.男性 <140 g/L,女性 <130 g/L
D.男性 <130 g/L,女性 <120 g/L
E.男性 <120 g/L,女性 <110 g/L
- 78.确诊CO中毒最主要的依据是
A.CO接触史
B.口唇颜色
C.血液中碳氧血红蛋白含量
D.昏迷的深度
E.缺氧的程度
- 79.对休克的认识正确的是
A.休克就是动脉血压下降的情况
B.休克就是心排出量减少的情况

C. 休克就是各种原因引起的组织灌注不足和细胞缺氧的结果

D. 休克就是心力衰竭

E. 休克是遭受打击后意识丧失

80. 应用复苏药物的目的不包括

A. 防治感染

B. 防治心律失常

C. 纠正急性酸中毒

D. 补充血容量和电解质

E. 防治脑水肿

81. 判断甲状腺功能亢进患者病情程度的主要指标是

A. 食欲亢进程度

B. 脉率增快和脉压增大的程度

C. 突眼程度

D. 甲状腺肿大程度

E. 体重减轻程度

82. 腹膜刺激征是指

A. 压痛、反跳痛、肌紧张

B. 肠鸣音亢进、压痛、反跳痛

C. 肠鸣音消失、腹痛、腹泻

D. 板状腹、压痛、腹泻

E. 反射性呕吐、恶心、腹泻

83. X 线检查可见气液平面及胀气肠袢的时间在肠梗阻发生后

A. 1~2 小时

B. 2~4 小时

C. 4~6 小时

D. 6~8 小时

E. 8~10 小时

84. 不符合肺炎克雷伯杆菌肺炎临床特点的是

A. 白红细胞正常或增加

B. 咳嗽, 咳红棕色胶冻状痰

C. 青壮年多见, 预后良好

D. 起病急、胸痛、畏寒

E. 对庆大霉素及第三代头孢菌素敏感

85. 患者, 男性, 54 岁。于晚餐后突发上腹持续性剧痛。考虑急性胰腺炎, 其血清淀粉酶升高的规律是

A. 发病后 2 小时开始升高, 12 小时达高峰

B. 发病后 1~2 小时开始升高, 24 小时达高峰

C. 发病后 24 小时开始升高, 48 小时达高峰

D. 发病后 12 小时开始升高, 72 小时达高峰

E. 发病后 48 小时开始升高, 72 小时达高峰

二、以下提供若干组考题, 每组考题共同在考题前列出 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与考题关系最密切的答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(86~87 题共用备选答案)

A. 脐部

B. 呼吸道

C. 消化道

D. 皮肤

E. 胎盘

86. 新生儿感染性肺炎出生前的常见感染途径是

87. 新生儿感染性肺炎出生后的常见感染途径是

(88~90 题共用备选答案)

A. 游离移植

B. 带蒂移植

C. 吻合移植

D. 输注移植

E. 联合移植

88. 游离皮片移植属于

89. 肾移植属于

90. 骨髓移植属于

(91~92 题共用备选答案)

- A.尿培养
B.痰培养
C.血培养
D.粪便培养
E.骨髓培养
- 91.确诊伤寒最常用的方法是
92.细菌性痢疾的确诊依据是
(93~95 题共用备选答案)
- A.窦前
B.窦后
C.窦内
D.肝前
E.肝后
- 93.肝炎后肝硬化所致门静脉高压症的主要阻塞部位在
94.血吸虫肝硬化所致门静脉高压症的主要阻塞部位在
95.肝静脉阻塞综合征所致门静脉高压症的主要阻塞部位在
(96~97 题共用备选答案)
- A.血红蛋白 30~60 g/L
B.血红蛋白<120 g/L
C.血红蛋白<110 g/L
D.血红蛋白 90~120 g/L
E.血红蛋白 145 g/L
- 96.6 个月至 6 岁小儿贫血的诊断标准是
97.6~14 岁小儿贫血的诊断标准是
(98~100 题共用备选答案)
- A.圆韧带
B.主韧带
C.阔韧带
D.宫骶韧带
E.骨盆漏斗韧带
- 98.固定子宫颈于正常位置的韧带是
99.间接保持子宫呈前倾位置的韧带是
100.维持子宫在盆腔正中央的韧带是



相关专业知识

一、以下每一道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应这母所属的方框涂黑。

1. 不属于艾滋病传播途径的是
 - A. 同性性接触
 - B. 异性性接触
 - C. 同桌进餐
 - D. 输血
 - E. 分娩
2. 移位菌群失调的原因不包括
 - A. 使用抗菌药物不恰当
 - B. 外科手术
 - C. 插管或介入治疗
 - D. 免疫功能降低
 - E. 细菌结构变化
3. 治疗鹅口疮错误的是
 - A. 2% 碳酸氢钠液擦洗口腔
 - B. 积极治疗原发病
 - C. 局部涂甲紫
 - D. 加大抗生素剂量
 - E. 局部应用抗真菌药物
4. 无菌物品的保存方法不当的是
 - A. 储物架及运送车要保持干净
 - B. 无菌物品应有合格标志,并标明灭菌日期
 - C. 快速压力蒸汽灭菌物品不论是否潮湿,均可保存 7~14 天
 - D. 储藏房间要保持湿式清扫,避免扬尘
 - E. 无菌物品应与未无菌物品分开存放
5. 下列沟通障碍的原因中不属于发送者障碍的有
 - A. 目的不明,导致信息内容的不确定性
 - B. 表达模糊,导致信息传递错误
 - C. 选择失误,导致信息误解的可能性增大
 - D. 言行不当,导致信息理解错误
 - E. 过度加工,导致信息的模糊或失真
6. 传染病区设置隔离室的主要目的是
 - A. 为病人提供良好的休息环境
 - B. 便于对病人进行监护
 - C. 将感染源与传播的途径分开
 - D. 将感染源与易感宿主从空间上分开
 - E. 方便家属探视
7. 医院感染暴发中流行病学处理的基本步骤,前三步是
 - A. 证实流行或暴发→查找感染源→查找引起感染的因素
 - B. 证实流行或暴发→组织落实有效的控制措施→写出调查报告
 - C. 查找感染源→证实流行或暴发→查找引起感染的因素
 - D. 查找引起感染的因素→证实流行或暴发→查找感染源
 - E. 查找感染源→查找引起感染的因素→证实流行或暴发
8. 口腔科的牙钻属于
 - A. 高度危险性物品
 - B. 中度危险性物品
 - C. 低度危险性物品
 - D. 高度水平消毒物品
 - E. 中度水平消毒物品
9. 当为某冠心病病人进行健康教育时,病人向你表达了他认为吸烟对他的健康不会产生影响,所以即使在患病期间,他仍然不想戒烟,病人的这种行为受到了哪类因素的影响
 - A. 倾向因素
 - B. 促成因素
 - C. 强化因素
 - D. 环境因素
 - E. 学习因素
10. 资源评估属于
 - A. 管理与政策诊断

- B.组织诊断
C.环境诊断
D.社会诊断
E.行为诊断
- 11.下列化学消毒剂中,可用于空气消毒的是
- A.2%戊二醛
B.75%乙醇
C.2%过氧乙酸
D.3%过氧化氢
E.0.5%氯己定
- 12.不耐热、不耐湿的物品消毒宜选用
- A.环氧乙烷气体熏蒸
B.紫外线照射法
C.高压蒸汽法
D.消毒液浸泡法
E.电离辐射法
- 13.关于控制的叙述,错误的是
- A.监视各项活动以保证它们按计划进行并纠正各种重要偏差的过程
B.控制的重要性包括在执行组织计划中的保障作用和和管理职能中的关键作用
C.控制的类型包括前馈控制、同期控制和反馈控制
D.控制的基本过程包括建立标准、衡量绩效和纠正偏差
E.控制的基本方法包括预算控制、质量控制、进度控制和数据控制
- 14.对病人最后的护理结果的质量评价属于
- A.基础质量管理
B.成效管理
C.环节质量管理
D.过程质量管理
E.终末质量管理
- 15.近中期效果评价是指
- A.形成评价
B.过程评价
C.效应评价
D.结局评价
E.总结评价
- 16.注射后处理针头的方法错误的是
- A.用过的针头采用双手“复帽”
B.不将针尖指向身体任何部位
C.使用后不用手去除针头
D.将针头放入防水耐刺穿的容器内
E.用过的针头不再重复使用
- 17.属于原位菌群二度失调的是
- A.正常菌群在原有部位发生了数量的暂时性变化
B.正常菌群在原有部位发生了种类结构的暂时性变化
C.正常菌群在原有部位比例发生了病理性波动
D.正常菌群转移到另一部位定植或定居
E.可逆性失调
- 18.连续使用的氧气湿化瓶应
- A.每周消毒 2 次,用后终末消毒,干燥保存
B.每日清洁,用后消毒,干燥保存
C.每日消毒,用后终末消毒,干燥保存
D.每周 1 次消毒,用后终末消毒,干燥保存
E.专人专用,用后进行终末消毒
- 19.护理管理的实践性下列哪句不妥
- A.护理工作时间性强,要按时完成护理服务
B.护理工作面广量大,护士常处于劳累状态
C.护理工作要保证 24 小时连续不间断
D.护理工作责任性强,护士常处于紧张状态
E.护士为护理对象提供健康服务就是管理过程
- 20.微生物从外界环境落到人体,并在一定部位不断生长、繁殖后代,这种现象称为
- A.植入
B.转移
C.定植

- D.定居
E.易位
- 21.根据标准预防的概念,下列不被看作具有传染性的物质是
- A.粪便和尿液
B.体液
C.分泌物
D.血液
E.汗液
- 22.科学管理理论的基本出发点为
- A.提高劳动生产率
B.实行科学化管理
C.调动人的积极性
D.体现公平的分配制度
E.建立健全的管理系统
- 23.护理部根据护理专业的发展变化及时调整工作模式,遵循的动态管理原则是
- A.系统原则
B.效益原则
C.弹性原则
D.人本原则
E.价值原则
- 24.感染病人使用后的器械,正确的处理程序是
- A.消毒、去污、清洗、灭菌
B.去污、清洗、消毒、灭菌
C.清洗、去污、消毒、灭菌
D.去污、消毒、清洗、灭菌
E.清洗、灭菌、消毒、去污
- 25.在确定健康教育的计划目标时错误的是
- A.总体目标必须最终得以实现
B.具体目标是由三个“W”和两个“H”组成
C.总体目标是宏观的,较为笼统的
D.总体目标可分解为多个具体目标
E.具体目标是一些具体的量化的指标
- 26.危害健康的行为不包括
- A.高脂高糖低纤维素饮食
B.A型行为
C.不良生活习惯
D.戒烟
E.C型行为
- 27.除下列哪项外,均是采用观察法收集的资料
- A.测量患者的体温
B.听右下肺有无湿啰音
C.触摸皮肤温度、湿度
D.阅读患者的查体记录
E.查看患者尿液的颜色
- 28.可达到高水平消毒法的是
- A.聚维酮碘
B.苯扎溴铵
C.过氧化氢
D.氯己定
E.乙醇
- 29.喹诺酮类抗菌药的主要作用机制是
- A.干扰细菌细胞壁合成
B.损伤细胞膜
C.影响细菌蛋白质的合成
D.抑制细菌核酸的形成
E.抑制固醇类药物的合成
- 30.真菌引起的医院感染中,最常见的致病菌是
- A.毛霉菌
B.隐球菌
C.光滑念珠菌
D.白色念珠菌
E.李斯特菌
- 31.社交距离通常是指
- A.1.2~4 m
B.4 m 以外
C.50~120 cm
D.50 cm 以内
E.100 cm 以内
- 32.基础护理合格率的评价属于
- A.基础质量评价
B.服务质量评价
C.环节质量评价
D.过程质量评价

- E. 终末质量评价
33. 下列属于高度危险物品的是
- A. 胃镜
B. 体温表
C. 便盆
D. 导尿管
E. 压舌板
34. 经粪-口途径传播的肝炎病毒有
- A. 甲型、丙型肝炎病毒
B. 甲型、戊型肝炎病毒
C. 乙型、丙型肝炎病毒
D. 丙型、戊型肝炎病毒
E. 甲型、乙型肝炎病毒
35. 下列区域物体表面消毒不合格的是
- A. 普通手术室, 细菌总数 $\leq 5 \text{ cfu/cm}^2$, 未检出致病菌
B. 急诊抢救室, 细菌总数 $\leq 10 \text{ cfu/cm}^2$, 未检出致病菌
C. 肝炎病房, 细菌总数 $\leq 15 \text{ cfu/cm}^2$, 未检出致病菌
D. 注射室, 细菌总数 $\leq 15 \text{ cfu/cm}^2$, 未检出致病菌
E. 新生儿室的工作人员, 细菌总数 $\leq 5 \text{ cfu/cm}^2$, 未检出致病菌
36. 手术前需预防性使用抗生素的是
- A. 经阴道子宫切除术
B. 甲状腺手术
C. 疝修补术
D. 子宫肌瘤切除术
E. 扁桃体摘除术
37. 我国护理管理标准规定一级医院医师与护理人员之比为
- A. 1 : 2
B. 1 : 3
C. 1 : 4
D. 1 : 1
E. 2 : 3
38. 被公认为“科学管理之父”的管理学家是
- A. 卢因
B. 泰勒
C. 韦伯
D. 亚当斯
E. 梅奥
39. 医疗用品污染后的危害程度可分为几类
- A. 1类
B. 3类
C. 5类
D. 7类
E. 9类
40. “爱探究、好攻击、易激惹、喜欢自我表现”属于哪一行为发展阶段的主要表现
- A. 被动发展阶段
B. 主动发展阶段
C. 自主发展阶段
D. 巩固发展阶段
E. 自我发展阶段
41. 不属于目标管理局限性的是
- A. 目标制定有难度
B. 限制管理者能力发挥
C. 缺乏灵活性
D. 常忽视成本估计
E. 缺乏连续性
42. 随着计算机技术的日益成熟和广泛应用, 管理幅度管理层的理论也发生着革命性的变化, 不符合目前变化的是
- A. 中层管理功能正逐渐由计算机完成
B. 组织管理幅度变宽
C. 组织管理层级变少
D. 组织日益由扁平化走向高耸型
E. 信息传递加快
43. 组织图不能提供的信息是
- A. 指挥关系
B. 人、财、物的流向
C. 管理幅度
D. 集中与分散
E. 组织规模
44. 护理人才结构的群体结构不包括
- A. 专业结构

- B.能级结构
 C.年龄结构
 D.知识结构
 E.智能结构
- 45.“条条大路通罗马”描述的有效沟通的策略是
- A.避免一味说教
 B.使用恰当的沟通方式
 C.考虑接受者的观点和立场
 D.以行动强化语言
 E.充分利用反馈机制
- 46.不属于协调基本要求的是
- A.及时协调与连续协调相结合
 B.从根本上解决问题
 C.调动当事者的积极性
 D.以大多数人的利益为主
 E.相互尊重
- 47.病房护士长最有效的监督方法是
- A.听取所有护士的汇报
 B.直接观察
 C.指派专人监督
 D.护士之间相互尊重
 E.护士之间相互监督
- 48.质量观的演变过程中,提出“全面顾客满意”概念的阶段是
- A.“符合性质量”阶段
 B.“适用性质量”阶段
 C.“满意性质量”阶段
 D.“卓越性质量”阶段
 E.“全面质量满意”阶段
- 49.在护理质量管理中树立“第一次把事情做对”观念的护理质量管理基本原则是
- A.以患者为中心原则
 B.预防为主原则
 C.工作标准“零缺陷”原则
 D.全员参与原则
 E.基于事实的决策方法原则
- 50.按教育目的或内容进行分类,不属于健康教育研究领域范畴的是
- A.学校健康教育
 B.防治疾病健康教育
 C.营养健康教育
 D.环境保护健康教育
 E.生殖健康教育
- 51.对信息和讯息的界定不正确的是
- A.讯息是一种信息
 B.信息泛指人类社会传播的一切内容
 C.讯息传播产生传、受双方有意义的交换
 D.讯息传播产生传、受双方之间的互动
 E.讯息是由信息符号构成的抽象信息
- 52.小组讨论时,一般适宜的小组人数为
- A.2~5人
 B.3~6人
 C.6~10人
 D.10~15人以上
 E.15~20人
- 53.患者在门诊诊疗过程中接受的健康教育称为
- A.住院教育
 B.病房教育
 C.随访教育
 D.门诊教育
 E.入院教育
- 54.在实施患者健康教育时,首先要进行的是
- A.确定患者教育目标
 B.分析患者的需求
 C.制订患者教育计划
 D.考虑患者教育的形式
 E.评价教育需求
- 55.属于医院获得性感染的是
- A.新生儿呕吐
 B.新生儿水痘
 C.新生儿红斑
 D.新生儿黄疸
 E.新生儿脐红
- 56.影响人体微生态平衡的因素不包括
- A.免疫系统疾病
 B.腰穿

- C.长期服用抗生素
D.慢性咽炎
E.长期静脉输液
- 57.紫外线灯照射强度监测至少应
- A.每月一次
B.每季度一次
C.每半年一次
D.每年一次
E.每一年半一次
- 58.医务人员应立即洗手的条件是
- A.接触患者的分泌物前
B.接触患者的血液前
C.脱去污染手套后
D.接触同一个患者身体的同一部位时
E.接触污染器械前
- 59.甲型肝炎传播途径不包括
- A.粪-口途径
B.密切接触
C.垂直传播
D.粪便污染食物
E.粪便污染水源
- 60.乙型肝炎的传播途径是
- A.通过共同就餐传播
B.通过拥抱传播
C.通过共用牙刷和剃刀
D.通过空气传播
E.通过握手传播
- 61.系统的特性不包括
- A.整体性
B.目的性
C.相关性
D.内部适应性
E.层次性
- 62.护理仪器设备的维护计划是
- A.战略性计划
B.战术性计划
C.综合性计划
D.长期计划
E.短期计划
- 63.目标管理的基本精神是

- A.以自我管理为中心
B.员工参与管理
C.重视成果
D.强调自我评价
E.以共同制定的目标为依据
- 64.沟通障碍中属于接受者障碍的是
- A.目的不明
B.表达模糊
C.选择失误
D.过度加工
E.言行不当
- 65.有效沟通策略中不正确的是
- A.使用正式沟通的方式
B.考虑接受者的观点和立场
C.充分利用反馈机制
D.以行动强化语言
E.避免一味说教
- 66.正确的谈话技巧是
- A.善于掌控下属发言内容
B.善于启发下属聆听,控制情绪
C.善于启发下属讲真情实话
D.善于抓住所有问题
E.善于规避敏感话题
- 67.医疗护理所用材料及药品购买控制,其控制的对象类型是
- A.作业
B.人员
C.信息
D.财务
E.组织绩效
- 68.不属于护理管理控制关键点的是
- A.高危时间
B.高危患者
C.高危护士
D.关键制度
E.所有科室
- 69.获取患者满意程度的最佳方式是
- A.问卷调查
B.电话随访
C.患者投诉

- D.与患者直接沟通
E.第三方调查
- 70.健康促进的三个基本策略是
A.提倡、协调、控制
B.提倡、赋权、协助
C.控制、赋权、协调
D.控制、赋权、倡导
E.倡导、赋权、协调
- 71.不属于健康促进活动领域的是
A.制定促进健康的公共政策
B.描述人群的健康状况
C.发展个人技能
D.加强社区行动
E.调整卫生服务方向
- 72.人的行为的基本构成要素有行为主体、行为客体、行为环境、行为手段和
A.行为动机
B.行为目的
C.行为计划
D.行为过程
E.行为结果
- 73.人类的行为因遗传、环境以及学习经历的不同而千差万别,丰富多彩,表现出较大的
A.目的性
B.可塑性
C.一致性
D.差异性
E.规律性
- 74.危害健康行为的主要特点是危害性、明显和稳定性以及
A.连续性
B.单一性
C.危险性
D.多样性
E.习得性
- 75.健康信息应具有的特点中,针对性是指
A.健康信息的选择、制作、传递必须针对传播者的需求和特点
B.健康信息的选择、制作、传递必须针对传播媒介的特点
C.健康信息的选择、制作、传递必须针对受者的需求和特点
D.健康信息的选择、制作、传递必须针对传播环境的特点
E.健康信息的选择、制作、传递必须针对主管部门的需求和特点
- 76.健康传播中受者在接触信息时普遍存在的心理特点不包括
A.求异
B.求真
C.求短
D.求新
E.求近

二、以下提供若干组考题,每组考题共同在考题前列出 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与考题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

- (77~78 题共用备选答案)
- A.胃炎
B.痰中培养大肠埃希杆菌
C.阑尾炎
D.新生儿腹泻
E.产后乳腺炎
- 77.通过消毒、灭菌、隔离、无菌技术等措施可有效地预防和控制的是
- 78.通过合理使用抗菌药物和免疫抑制类药物降低感染风险的是
- (79~81 题共用备选答案)
- A.高压蒸汽灭菌
B.干热灭菌
C.滤过除菌
D.紫外线
E.煮沸消毒
- 79.空气的消毒宜采用
- 80.动物免疫血清的除菌宜采用

- 81.手术用金属器械宜采用
(82~83题共用备选答案)
- A.戴清洁手套
 - B.戴一次性手套
 - C.戴医用口罩
 - D.戴口罩
 - E.穿隔离衣
- 82.医务人员接触血液及污染物品时应
- 83.进行手术等无菌操作时应
(84~86题共用备选答案)
- A.信息源
 - B.编码
 - C.传递信息
 - D.解码
 - E.反馈
- 84.信息被译成能理解的一系列符号的过程属于沟通步骤中
- 85.包括接受、译码和理解三个环节的沟通步骤是
- 86.信息沟通属于沟通步骤中的
(87~89题共用备选答案)
- A.目标控制
 - B.进度控制
 - C.预算控制
 - D.质量控制
 - E.技术控制
- 87.将实际情况与预算计划对比检查,及时发现问题、纠正偏差的控制方法是
- 88.对生产和工作的进程在时间上进行控制的方法是
- 89.把执行结果与预期目标及标准进行对照检查,以发现问题,采取纠偏措施的控制
(90~91题共用备选答案)
- A.呼吸机相关性肺炎
 - B.呼吸衰竭
 - C.肺癌
 - D.新生儿腹泻
 - E.结肠癌
- 90.属于医院感染的是
- 91.不属于医院感染的是
(92~94题共用备选答案)
- A.碘伏消毒液原液局部擦拭2遍
 - B.碘伏消毒液原液局部擦拭
 - C.20 000 mg/mL 葡萄糖酸氯己定擦拭
 - D.有效含量>1 g/L 氯己定乙醇溶液局部擦拭2~3遍
 - E.3%过氧化氢冲洗
- 92.适用于穿刺部位的皮肤消毒的方法为
- 93.适用于手术切口部位的皮肤清洁方法为
- 94.适用于伤口创面消毒的冲洗方法为
(95~97题共用备选答案)
- A.管理的科学性
 - B.管理的自然属性
 - C.管理的广泛性
 - D.人和时间
 - E.能源和信息
- 95.管理的基本特征
- 96.护理管理的特点
- 97.管理二重性的体现
(98~100题共用备选答案)
- A.倒放
 - B.竖放
 - C.平放
 - D.斜放
 - E.侧放
- 98.手术器械包、硬式容器应
- 99.盆、盘、碗类物品应
- 100.纸袋、纸塑包装应

专业知识

一、以下每一道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应这母所属的方框涂黑。

- 1.社区的功能不包括
 - A.生产、分配、消费、协调和利用资源的功能
 - B.家庭化的功能
 - C.社会控制的功能
 - D.社会参与的功能
 - E.相互支援的功能
- 2.表示计量资料的统计描述指标的是
 - A.均数
 - B.率
 - C.构成比
 - D.百分比
 - E.相对比
- 3.家庭评估的内容不包括
 - A.家庭内部结构
 - B.家庭资源
 - C.家庭基本资料
 - D.社会资源
 - E.家庭发展阶段
- 4.初次家庭访视首先要做的是
 - A.家庭成员的个别评估
 - B.家庭健康评估
 - C.制订护理计划
 - D.适当护理
 - E.适当指导
- 5.健康教育的核心是
 - A.增强健康意识
 - B.掌握自我保健的知识和技能
 - C.促进人们改变不良的行为和生活方式
 - D.改善、维护和促进个体和社区的健康状况
 - E.健康教育是投入少、产出高、效益大的战略措施
- 6.健康教育时的人际沟通和谈话技巧包括
 - A.不要重复
 - B.尽量使问题详细、复杂
 - C.启发思维
 - D.尽量用简单通俗的语言
 - E.尽量使用医学术语
- 7.幼儿视力保健要求连续看电视的时间以及与电视的距离分别是
 - A.0.5~1 小时;2 m
 - B.0.5~1 小时;3 m
 - C.1~2 小时;2 m
 - D.1~2 小时;3 m
 - E.2~3 小时;3 m
- 8.控制和改变不良行为习惯不包括
 - A.吸烟
 - B.滥用药物
 - C.娱乐
 - D.嗜赌
 - E.酗酒
- 9.关于 COPD 患者的家庭氧疗,叙述正确的是
 - A.低浓度吸氧;氧流量 2~4 L/min
 - B.一昼夜不少于 10 小时
 - C.夜间为避免影响休息,可间断、暂停吸氧
 - D.使 $\text{PaO}_2 > 80 \text{ mmHg}$, 使 $\text{SaO}_2 > 90\%$
 - E.COPD、慢性呼吸衰竭者提倡长期家庭氧疗
- 10.产前检查是指
 - A.从怀孕开始至生产
 - B.从怀孕 3 个月开始至生产
 - C.从怀孕 3 个月开始至生产 1 个月内
 - D.从怀孕开始至生产 1 个月内

- E.从怀孕 6 周至生产
11. 菌苗打开后若没有立即使用,置于常温下疫苗失去活性的时间为
- A.0.5 小时
B.1 小时
C.2 小时
D.3 小时
E.4 小时
12. 出生时要接种的疫苗为
- A.脊髓灰质炎疫苗
B.乙肝
C.百白破
D.麻疹
E.甲肝
13. 产后忧郁在产后发生的最常见时间为
- A.10 天内
B.20 天内
C.30 天内
D.40 天内
E.60 天内
14. 我国 5 岁以下儿童死亡的第一位原因是
- A.小儿肺炎
B.小儿腹泻
C.小儿传染病
D.意外
E.先天性疾病
15. 脑血管病的首要危险因素是
- A.糖尿病
B.心脏病
C.高血脂
D.高血压
E.A 型行为
16. 偏瘫患者被动运动的原则正确的是
- A.先上肢后下肢
B.先小关节后大关节
C.运动量由大到小
D.运动幅度由强到弱
E.只适用于早期
17. 胰岛素的注射时间通常是
- A.餐后 20~30 分钟
B.餐后 60 分钟
C.餐前 20~30 分钟
D.餐前 60 分钟
E.餐中注射
18. COPD 患者在家中禁用的药物是
- A.强心药
B.解热镇痛药
C.镇静药
D.激素
E.大环内酯类抗生素
19. 老年前列腺增生症的家庭护理内容,错误的是
- A.避免过度劳累
B.温热水坐浴
C.不宜久坐
D.多吃脂肪类食物,以及富含纤维素的食物
E.不饮酒,防止便秘
20. 龋齿发生率最高的时期是
- A.童年
B.幼年
C.学龄前
D.青少年
E.成年
21. 对社区人群的评估内容不必要的是
- A.人口数量和分布
B.人口年龄、性别、信仰的构成及变动情况
C.人口相貌的评估
D.经济阶层和文化程度
E.健康水平
22. 家庭护理的范畴,一般不包括
- A.临终关怀
B.急性病护理
C.用药指导
D.慢性病管理

- E.传染病的消毒隔离
- 23.健康促进的总体目标的特点是
- A.具体的目标
 - B.可测量的目标
 - C.不可完成的目标
 - D.宏观的目标,是努力的方向
 - E.没有时间限制的目标
- 24.健康教育的“知-信-行”模式中的“知”指的是
- A.信念
 - B.态度
 - C.行为
 - D.方式
 - E.知识
- 25.老年人临床合理用药五大原则正确的是
- A.受益原则
 - B.三种药物原则
 - C.四种药物原则
 - D.大剂量原则
 - E.不停用药原则
- 26.关于冠心病的发病,叙述正确的是
- A.多发生于40岁以上
 - B.女性多
 - C.体力劳动者多
 - D.中国比欧美国家多
 - E.生活贫穷的地域多
- 27.脑血管病的先兆症状不包括
- A.突然剧烈头痛
 - B.步履蹒跚,走路无力
 - C.精神症状
 - D.哈欠不断
 - E.鼻出血
- 28.母乳喂养一般一次哺育的时间最好不超过
- A.10分钟
 - B.20分钟
 - C.30分钟
 - D.60分钟
 - E.没有时间限制
- 29.社区常见的健康促进活动不包括
- A.社区体育锻炼
 - B.老年人卫生
 - C.AIDS教育
 - D.慢性病的综合防治
 - E.母乳喂养
- 30.关于家庭权力结构的说法正确的是
- A.传统权威型,指经济占主导地位
 - B.工具权威型,由性别决定主导地位
 - C.分享权威型,多是孩子起主要作用
 - D.感情权威型,常为男权主义
 - E.反映权力在家庭内部的分布情况,决策时谁的作用最大,谁的作用次之
- 31.胸外心脏按压时,有效按压深度为
- A.1~2 cm
 - B.2~3 cm
 - C.3~4 cm
 - D.4~5 cm
 - E.5~6 cm
- 32.社区卫生服务的主要目的是
- A.预防疾病
 - B.治疗疾病
 - C.健康教育
 - D.康复保健
 - E.促进健康和预防疾病
- 33.表示计数资料的统计描述指标的是
- A.算术均数
 - B.几何均数
 - C.中位数
 - D.率
 - E.标准差
- 34.动态人口学调查不包括
- A.人口普查
 - B.出生率
 - C.死亡率
 - D.结婚率
 - E.人口增长率
- 35.家庭健康护理的主要目的是

- A.维持和提高家庭的健康水平及其家庭自我保健功能
- B.维持原有的身体和心理状况
- C.保护家庭成员不受外在因素的影响
- D.保护家庭免受疾病影响
- E.提高家庭自我保健功能
- 36.社区健康教育的讲座或演讲一般时间为
- A.30 分钟
- B.45 分钟
- C.1 小时
- D.1.5 小时
- E.2 小时
- 37.行为矫正的方法不包括
- A.脱敏法
- B.示范法
- C.厌恶法
- D.弱化法
- E.替代法
- 38.关于脑卒中的康复护理,功能恢复的关键时期是
- A.发病后 2 周内
- B.发病后 1 个月内
- C.发病后 2 个月内
- D.发病后 3 个月内
- E.发病后 6 个月内
- 39.产后白色恶露干净需要的时间是
- A.产后 7 天
- B.产后 14 天
- C.产后 21 天
- D.产后 28 天
- E.产后 42 天
- 40.中老年女性最常见的尿失禁类型是
- A.充盈性
- B.急迫性
- C.压力性
- D.暂时性
- E.混合性
- 41.2~12 岁儿童身长生长发育的推算公式是
- A.身长 $\text{cm} = \text{年龄} \times 6 + 60 \text{ cm}$
- B.身长 $\text{cm} = \text{年龄} \times 7 + 70 \text{ cm}$
- C.身长 $\text{cm} = \text{年龄} \times 8 + 80 \text{ cm}$
- D.身长 $\text{cm} = \text{年龄} \times 6 + 80 \text{ cm}$
- E.身长 $\text{cm} = \text{年龄} \times 8 + 60 \text{ cm}$
- 42.婴儿添加辅食的时间一般是
- A.3 个月
- B.4~6 个月
- C.6~8 个月
- D.8~10 个月
- E.12 个月
- 43.脑血管病先兆症状的突然眩晕最常发生的时间是
- A.疲劳时
- B.洗澡时
- C.排便时
- D.转头回顾时
- E.清晨起床时
- 44.偏瘫患者常见的并发症不包括
- A.压疮
- B.肺炎
- C.尿路感染
- D.便秘
- E.静脉血栓
- 45.胰岛素注射的部位不适合的是
- A.前臂
- B.大腿前侧
- C.大腿外侧
- D.臀部
- E.脐周
- 46.青少年时期死亡最主要的原因是
- A.意外损伤
- B.肿瘤
- C.先天性疾病
- D.传染性疾病
- E.自杀
- 47.妇女更年期一般发生于
- A.40~50 岁

- B.45~50 岁
C.45~55 岁
D.50~55 岁
E.40~55 岁
- 48.关于健康促进的具体目标的特点,正确的是
- A.长期的目标
B.可测量的目标
C.不可完成的目标
D.宏观的目标,是努力的方向
E.没有时间限制的目标
- 49.目前 AIDS 健康教育的内容主要是
- A.图片小册子宣传
B.AIDS 患者不能参加工作
C.AIDS 患者适当隔离
D.安全性行为教育
E.治疗方法的宣传教育
- 50.关于健康促进的任务,主要需要强化的是
- A.政策行动
B.家庭行动
C.个人行动
D.社区行动
E.社会行动
- 51.家庭访视应避开吃饭和会客时间,访视时间长短一般是
- A.0.5 小时以内
B.1 小时以内
C.15 分钟以内
D.45 分钟以内
E.1.5 小时以内
- 52.影响健康的因素,主要包括
- A.自然环境、社会环境、遗传、心理、经济
B.遗传、心理、自然环境、社会环境
C.文化、民族、经济、社会、环境
D.环境、生物学、生活方式、卫生保健设施
E.环境、文化、遗传、心理
- 53.社区卫生服务的重点对象不包括
- A.青年女性
B.老年人
C.残疾人
D.儿童
E.精神病患者
- 54.13 岁女孩,企图自杀,与父亲常常深夜对家人施暴有关。该事件说明与健康伤害相关的主要家庭压力事件是
- A.离婚
B.家庭冲突
C.失业
D.酗酒
E.丧先亲人
- 55.对家访优点的阐述,不正确的是
- A.多数人愿意在家接受照顾
B.与健康有关的环境因素能被观察和考虑
C.有利于家庭其他成员的参与
D.减少住院次数、缩短住院时间
E.提高效率
- 56.可引起“生活方式病”的行为习惯不包括
- A.吸烟
B.不良风俗
C.不良饮食习惯
D.旅游
E.活动量减少
- 57.不属于糖尿病患者足部自我护理内容的是
- A.每晚温水洗脚
B.出汗多时,用滑石粉放在趾间、鞋袜中
C.不要赤足行走
D.如有溃疡,严禁碘酒消毒
E.用热水袋温热足部,不用电热毯
- 58.患者,70 岁,高血压病史 30 年,昨晚和家里人不愉快,大发雷霆。夜里突然发生脑出血。其发生脑出血的诱因是

- A.不明显
- B.情绪激动
- C.用力过猛
- D.过度劳累
- E.暴饮暴食

(59~61 题共用题干)

患者,女性,61岁。15年前开始在咳嗽、打喷嚏、奔跑时尿液不自主地溢出,并随着健康状况的好坏而时重时轻。今年开始症状加重。询问过去史,得知其近期持续咳嗽长达4个月,且漏尿症状加重。询问生育史,育有一子一女,女儿为产钳助产。妇科检查见子宫I度脱垂。泌尿系统检查,膀胱内压正常,膀胱逼尿肌稳定。尿道压力测试:在膀胱充盈状态下,站立位可见随咳嗽尿液漏出,咳嗽停止后还见漏尿。

59.根据上述资料,患者尿失禁的危险因素主要是

- A.绝经后雌激素下降
- B.产钳助产
- C.咳嗽
- D.子宫脱垂
- E.健康状况不良

60.考虑该患者的尿失禁类型是

- A.急迫性
- B.压力性
- C.充盈性
- D.暂时性
- E.混合性

61.建议采用的主要护理措施是

- A.雌激素用药
- B.体质锻炼
- C.少喝水
- D.盆底肌训练
- E.治疗咳嗽

二、以下提供若干组考题,每组考题共同在考题前列出A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与考题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方格涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(62~63 题共用备选答案)

- A.家庭
- B.全社会
- C.单位团体
- D.社区的全体居民
- E.个人自己选择

62.社区护理的服务对象是

63.临床护理的服务对象是

(64~66 题共用备选答案)

- A.护理提供者
- B.咨询者
- C.教育者
- D.卫生服务协调者
- E.管理者

64.社区护士作为社区居民的健康监护人,所扮演的角色是

65.社区护士设计、组织健康促进和健康教育的活动,所扮演的角色是

66.社区护士为患者家属提供健康指导,所扮演的角色是

(67~70 题共用备选答案)

- A.形成期
- B.扩展期
- C.收缩期
- D.衰弱期
- E.再生产期

67.夫妻生产一女儿,属于家庭发展周期的

68.如果孩子长大,独立成家,属于家庭发展周期的

69.如果夫妻任何一方或双方都退休,属于家庭发展周期的

70.假如夫妻一方去世,属于家庭发展周期的

(71~73 题共用备选答案)

- A.认识压力

- B.逃避
C.攻击
D.药物滥用
E.固执
71. 中年期应付危机最无效的方式是
72. 中年期应付危机破坏性的方式是
73. 中年期应付危机建设性的方式是
(74~76 题共用备选答案)
- A. 两个以上样本均数有无差异性的检验
- B. 两个或两个以上样本率的比较
C. 资料不满足参数检验条件时的检验
D. 两个样本均数有无差异性的检验
E. 用于等级资料的统计推断
74. 方差分析用于统计推断的情况是
75. 卡方检验用于统计推断的情况是
76. t 检验用于统计推断的情况是
(77~80 题共用备选答案)
- A. 预防性家访
B. 评估性家访
C. 连续性家访
D. 急诊性家访
E. 初次家访
77. 用于慢性病或康复期的患者及临终患者的家访是
78. 用于有危机或病残家庭的评估的家访是
79. 用于临时问题或紧急情况家庭的家访是
80. 用于妇幼保健与计划免疫的家访是
(81~82 题共用备选答案)
- A. 核心家庭
B. 主干家庭
C. 联合家庭
D. 兄弟姐妹组成的家庭
E. 同性恋家庭
81. 结构简单、关系较稳定但资源少, 占我国 67% 比例的家庭的类型是
82. 由父母、已婚子女及第三代组成的家

庭, 属于

(83~85 题共用备选答案)

- A. 昏迷
B. 头痛、头晕、呕吐
C. 血压增高
D. 瞳孔早期缩小, 后扩大, 且两侧不等
E. 三偏表现: 偏瘫、偏盲、偏身感觉障碍
83. 发生脑出血的首发症状多为
84. 发生脑出血的最主要症状为
85. 内囊出血的典型表现为

(86~89 题共用备选答案)

- A. 模糊性沟通
B. 机械性沟通
C. 情感性沟通
D. 直接沟通
E. 间接沟通

某男准备明天出差, 可是明天是他母亲的生日, 于是打算跟妻子说明。

86. 如果某男含情脉脉地对妻子说: “我明天要出差了, 要走三天呢, 你自己要照顾好自己呀, 等我回来。” 该沟通属于

87. 如果某男生硬地对妻子说: “我明天出差。” 也不加任何解释与说明, 该沟通属于

88. 假如某男当着妻子的面对孩子说: “明天奶奶要过生日了, 奶奶没有钱, 也没人照顾。” 那么他与妻子的沟通属于

89. 如果某男只对妻子说, 明天不在家, 而妻子问他去哪里, 他也没吭声, 再追问什么时候回来, 他也没说清楚。那么这种沟通属于

(90~94 题共用备选答案)

- A. 近记忆力减退
B. 定向力障碍
C. 思维、判断力障碍
D. 情感障碍
E. 行为失常

90. 关于老年期痴呆的主要临床表现最常见的症状是

91. 某某看电视连续剧, 不能联系上下集

的内容

92. 某某的爱人染了头发, 某某就不认识爱人

93. 某某终日忙忙碌碌, 常捡脏东西吃

94. 某某常常失眠, 且焦虑抑郁

(95~98 题共用备选答案)

A. 少量阴道流血, 伴轻微下腹痛, 宫颈口未开

B. 阴道出血量和贫血程度不一致, 伴腹痛

C. 妊娠晚期或临产时无痛性反复阴道出血

D. 分娩阻滞, 剧烈疼痛, 宫缩停止, 病情恶化

E. 妊娠产物完全排出, 阴道流血停止

95. 胎盘早剥

96. 先兆流产

97. 前置胎盘

98. 子宫破裂

(99~100 题共用备选答案)

A. 具体的、没有时间限制的目标

B. 可测量的目标

C. 不可完成的目标

D. 宏观的目标, 是努力的方向

E. 没有时间限制的目标

99. 属于健康促进的总体目标特点的是

100. 属于健康促进的具体目标特点的是



专业实践能力

一、以下每一道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应这母所属的方框涂黑。

1. 护理抑郁发作的患者首要应引起注意的问题是
- 拒食导致营养不良
 - 活动少而引起合并感染
 - 自责有自杀观念
 - 症状波动昼重夜轻
 - 较严重的睡眠障碍
2. 重症抑郁发作最常见的症状是表现为显著的
- 自我感觉差
 - 精力减退
 - 抑郁心境
 - 行动迟缓
 - 自杀倾向
3. 从事精神卫生工作的医护人员应遵循的首要伦理道德规范是
- 保护患者的个人隐私
 - 掌握与患者沟通的分寸
 - 尊重患者的人格与权利
 - 恪守保护性医疗制度的原则
 - 贯穿慎独精神于工作全程
4. 不会引起药物依赖的是
- 地西洋
 - 苯巴比妥
 - 阿普唑仑
 - 苯丙胺
 - 氯丙嗪
5. 甲型病毒性肝炎的主要传播途径是
- 粪-口传播
 - 血行传播
 - 呼吸道传播
 - 蚊虫叮咬
 - 水源传播
6. 结核病患者的餐具处理应选择
- 煮沸 10 分钟
 - 2% 来苏儿浸泡 2 小时
 - 0.5% 过氧乙酸溶液浸泡 2 小时
 - 5% 石炭酸浸泡 2 小时
 - 5% 碳酸氢钠浸泡 30 分钟
7. 预防伤寒病最关键的环节是
- 控制传染源
 - 切断传播途径
 - 提高人群免疫力
 - 做好传染病调查
 - 早期发现
8. 抗休克治疗首要而基本的措施是
- 改善心功能
 - 补充血容量
 - 纠正酸中毒
 - 改善周围血管张力
 - 防治急性肾衰
9. 反常呼吸常发生于
- 单根肋骨多处骨折
 - 多根肋骨单处骨折
 - 多根肋骨多处骨折
 - 单根肋骨单处骨折
 - 胸壁软组织损伤
10. 静脉出血的表现为
- 流出的血液鲜红, 血流较急
 - 流出的血液鲜红, 血流较缓
 - 流出的血液暗红, 血流较急
 - 流出的血液暗红, 血流较缓
 - 流出的血液鲜红, 血液从创面渗出
11. 使用假肢者、瘫痪患者恢复行走能力最重要的锻炼方法是
- 扶持行走训练
 - 拐杖行走训练
 - 立位移动训练

- D.轮椅移动训练
E.上下楼梯训练
- 12.符合濒死患者常见希氏面容的表现是
- A.面色苍白
B.眼球突出
C.嘴角歪斜
D.双眼紧闭
E.鼻翼扇动
- 13.心理治疗的最高目标是
- A.症状减轻或缓解
B.行为改变
C.态度改变
D.人格改变
E.人际关系改善
- 14.肺性脑病患者出现昏迷,一侧瞳孔扩大,急救措施首先用
- A.加大抗生素用量
B.双氢克尿噻
C.螺内酯
D.20%甘露醇静脉推注
E.5%NaHCO₃静脉推注
- 15.提高老年人服药依从性的护理措施,正确的说法是
- A.严格给药规程,发药到手,便可离开
B.出院带药时说明或写明药名、用量、时间
C.社区护士不可到老人家中清点药数
D.外用药物,贴黑色标签,告知不可口服
E.开展健康教育,并建立治疗性护患关系
- 16.将临终患者的心理过程分为五个阶段的是
- A.南丁格尔
B.库勒-罗斯
C.桑德斯
D.史密斯
E.布鲁姆
- 17.在灾害现场,有一伤员呼吸频率大于30次/分,脉搏摸不清,意识存在,应给予标志
- A.红色
B.黄色
C.绿色
D.黑色
E.蓝色
- 18.患者,女性,30岁。于家中发现步态不稳,言语不清,无任何气味怀疑中毒,可能为
- A.CO中毒
B.酒精中毒
C.安眠药中毒
D.食物中毒
E.有机磷中毒
- 19.为残疾者进行社区环境和家庭改造的是
- A.创造舒适、美观的居住环境
B.改变对残疾者活动造成障碍的设施
C.营造融洽、温暖的家庭环境
D.创造利于残疾者康复锻炼的环境
E.创造利于残疾者社会交往的环境
- 20.尸斑多出现在死亡后
- A.1~2小时
B.2~4小时
C.4~6小时
D.6~8小时
E.8~10小时
- 21.通过帮助患者的家庭成员,找出使患者发病、症状持续加重的家庭因素,指导他们共同克服这些障碍,而使患者的病情得到改善,属于心理治疗中的
- A.集体治疗
B.家庭治疗
C.行为治疗
D.个别心理治疗
E.人际心理治疗
- 22.社区精神卫生的最基本服务形式是

- A.家庭病床
 B.社区医疗
 C.过渡性康复站
 D.综合性康复措施
 E.住院治疗
- 23.慢性酒精中毒不包括的类型是
 A.依赖综合征
 B.病理性醉酒
 C.酒中毒性幻觉症
 D.酒中毒性妄想症
 E.酒中毒性痴呆
- 24.保护易感人群的主动免疫措施是
 A.接种抗毒素
 B.注射丙种球蛋白
 C.接种疫苗、菌苗、类毒素
 D.注射高价免疫球蛋白
 E.加强营养
- 25.传染病的基本特征为
 A.有传染性、传播途径和免疫性
 B.有传染性、免疫性和流行性
 C.有病原体、地方性和季节性
 D.有病原体、免疫性和传染性
 E.有传染性、流行性和易发性
- 26.急性重型肝炎的最主要病理变化是
 A.肝细胞桥形坏死
 B.肝细胞广泛性坏死
 C.汇管区碎屑样坏死
 D.肝小叶及汇管区单核细胞浸润
 E.肝细胞灶性坏死
- 27.符合浸润型肺结核发生条件的是
 A.因早期血行播散病灶的活动而致
 B.因机体首次感染结核杆菌造成
 C.结核在全肺呈弥漫散布
 D.因原发病灶治愈后复发
 E.儿童好发
- 28.艾滋病的癌瘤主要是
 A.卡波西肉瘤
 B.霍奇金病
 C.鳞癌

- D.基底细胞癌
 E.湿疹样癌
- 29.烧伤休克期的主要病理生理改变是
 A.大量红细胞丧失
 B.大量水分蒸发
 C.大量体液从血管渗出
 D.疼痛
 E.败血症
- 30.在灾害现场,黄色标志着伤员接受治疗的时间应在
 A.1小时内
 B.2~3小时内
 C.4~6小时内
 D.12小时内
 E.24小时内
- 31.固定的原则是
 A.先止血,再包扎,最后固定
 B.先复位,后固定
 C.先还纳骨折外露端,再固定
 D.大小腿骨折先固定下端,再固定上端
 E.使用夹板,以固定带能上下活动0.5 cm为宜
- 32.全面康复是指帮助患者达到
 A.肢体功能的全部恢复
 B.全身功能的全部恢复
 C.心理功能的全部恢复
 D.器官功能的全部恢复
 E.身体、心理、职业、社会生活的整体恢复
- 33.偏瘫患者功能训练的重点内容是
 A.有氧运动
 B.健侧功能的代偿
 C.患侧肌肉锻炼
 D.患侧的恢复
 E.辅助性支具使用
- 34.尸体护理时,将尸体放平,头下垫一软枕的目的是
 A.保持良好姿势
 B.防止下颌骨脱位

- C.便于进行尸体护理操作
D.避免头面部充血发紫
E.接近自然状态
- 35.全髋关节置换术后患者负重训练,要求达到完全负重的时间是
- A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.9个月
E.12个月
- 36.慢性病社区管理需要团队的合作,其中团队的核心是
- A.全科医生
B.社区护士
C.患者和家属
D.康复师
E.社会工作者
- 37.现代医学已开始主张作为死亡依据的指标是
- A.心跳停止
B.呼吸停止
C.脑死亡
D.心电图平直
E.瞳孔散大
- 38.伤残使用最广泛的辅助性支具为
- A.轮椅
B.拐杖
C.推车
D.助视器
E.助听器
- 39.阿尔茨海默病患者的首发症状是
- A.情绪急躁易怒
B.记忆障碍
C.性格改变
D.空间定向能力受损
E.片断的妄想
- 40.社区精神病患者以轻性精神障碍者居多,不包括的是
- A.神经症
B.躁狂型精神分裂症
C.适应障碍
D.发育障碍
E.人格障碍
- 41.一般情况下,与社区精神疾病患者第一次交谈时,护士最主要做的是
- A.尽可能多地收集有关信息
B.与患者建立良好、融洽的护患关系
C.做出下一步的治疗计划
D.劝说患者的家属给予配合
E.做出明确的诊断并告知患者
- 42.不符合传染的概念的是
- A.又称感染
B.是病原体对人体的一种寄生过程
C.包括机会性感染
D.包括所有寄生物对人体的共生状态
E.传染后可产生5种不同的感染谱,传染病仅是表现之一
- 43.表明乙型肝炎患者有较强的传染性的是
- A.抗HBe阳性
B.抗HBc阳性
C.HBeAg阳性
D.抗HBs阳性
E.HBsAg阳性
- 44.外伤急救时若安置止血带,放松止血带的间隔时间是
- A.每5小时一次
B.每4小时一次
C.每3小时一次
D.每2小时一次
E.每1小时一次
- 45.不属于社区精神疾病康复服务形式之“基层专科”工作内容的是
- A.开设职业康复训练课程
B.具体指导家庭及志愿者
C.开展精神障碍防治康复知识的宣教
D.开设家庭病床,定期进行家庭访视
E.定期随访本社区精神障碍的重点

患者

46. 不属于抢救肝硬化所致消化道出血性休克的措施的是

- A. 建立静脉通道
- B. 烦躁者给予吗啡或巴比妥类药物
- C. 保持呼吸道通畅
- D. 积极补充血容量
- E. 监测生命体征的变化

47. 患者, 男性, 40 岁。多年饮酒, 不饮酒则身体难受、失眠、出汗等。几天来停饮, 则听到声音议论他。其所患疾病可能是

- A. 精神分裂症
- B. 酒精中毒性幻觉症
- C. 心因性精神障碍
- D. 抑郁症
- E. 癔痛性精神障碍

48. 患者, 男性, 19 岁。咳嗽 2 个月, 痰中带血丝, 体温 $36.7 \sim 37.9^{\circ}\text{C}$, X 线胸片示: 右上肺有云雾状淡薄阴影, 内有圆形透光区。对确诊最有价值的检查应选

- A. 集 24 小时痰查抗酸杆菌
- B. 痰涂片查抗酸杆菌
- C. 痰细菌培养
- D. 冷凝集试验
- E. 结核菌素试验

49. 患儿, 男, 12 岁。突发寒战、高热、抽搐、昏迷。体检: 体温 40.5°C , 脉搏 140 次/分, 血压 $61/32 \text{ mmHg}$, 口唇发绀。实验室检查: 血白细胞 $15 \times 10^9/\text{L}$, 中性粒细胞 82%, 肛拭子取便, 镜检脓细胞(+), 拟诊断为细菌性痢疾。其所属类型为

- A. 中毒性细菌性痢疾(脑型)
- B. 慢性细菌性痢疾急性发作
- C. 急性细菌性痢疾(普通型)
- D. 中毒性细菌性痢疾(休克型)
- E. 中毒性细菌性痢疾(混合型)

50. 患者, 男性, 24 岁。患支气管扩张症, 突然一次咯血 700 mL。患者烦躁, 面色苍白, 皮肤湿冷。血压 $110/94 \text{ mmHg}$, 脉搏

98 次/分。应判断为

- A. 尚未发生休克
- B. 休克失代偿期
- C. 早期休克
- D. 顽固性休克
- E. 严重休克

51. 患者, 男性, 25 岁。在工作中不幸遭到电击伤, 造成呼吸心跳骤停, 进行心肺复苏急救, 应给患者取的体位是

- A. 头高脚低位
- B. 头低脚高位
- C. 半坐卧位
- D. 去枕仰卧位
- E. 俯卧位

52. 患者, 女性, 72 岁。银行职员, 高中文化, 3 年前开始记忆力下降, 逐渐加重, 刚吃完饭后就忘记, 说没吃饭, 记不住孙子的名字, 把子女错认为别人, 远记忆力尚可, 经常吵闹要回原来的家, 有时焦虑, 简单计算均可, 复杂计算力差, 在家乱翻东西, 自己存折忘记放在什么地方, 找不到认为被女儿偷去了, 躯体及神经系统检查无异常。最可能为

- A. 老年性痴呆
- B. 脑肿瘤
- C. 脑血管病
- D. 人格改变
- E. 抑郁症

53. 患者, 男性, 40 岁。起病时水泻, 剧烈呕吐, 但无腹痛及里急后重, 也无发热, 大便革兰染色有革兰阴性菌, 治疗后症状明显好转, 但发病后 1 年内进食生冷食物后反复出现腹痛、腹泻, 应采取的措施是

- A. 分离病原菌根据药敏结果选用有效抗生素
- B. 消化道隔离直至症状消失
- C. 进行医学观察可暂不予治疗
- D. 针对肠功能紊乱给予解痉药物
- E. 给予非甾体抗炎药保留灌肠

54.患者,男性,25岁。尿道口脓性分泌物3天。5天前不洁性接触史。查体:尿道口红肿,深黄色脓性分泌物,腹股沟淋巴结肿大,触痛。尿道分泌物涂片,革兰染色,镜下可见大量多形核白细胞,细胞内可见数量不等的革兰阴性双球菌。诊断为淋病。做病原菌培养后发现该病原菌属耐青霉素菌株,首选药物应为

- A.壮观霉素
- B.红霉素
- C.四环素
- D.诺氟沙星
- E.螺旋霉素

55.患儿,6岁。无症状,入学体检时作PPD,硬结直径15mm,胸片示右肺门结构紊乱,隐约可见一结节状影。该患儿宜选用的治疗方案为

- A.异烟肼
- B.异烟肼+利福平
- C.异烟肼+乙胺丁醇
- D.异烟肼+乙胺丁醇+利福平
- E.异烟肼+利福平+链霉素

56.患者,男性,18岁。车祸致伤,神志模糊,咯血,口鼻均有泥沙夹血外溢,呼吸困难,烦躁不安,左胸侧严重擦伤、肿胀,心率98次/分,血压120/90mmHg,四肢尚可自主活动,左大腿中下段中度肿胀、瘀斑和严重擦伤。此时最紧迫的抢救措施是

- A.立即送医院就诊
- B.清除上呼吸道异物,保持呼吸道通畅
- C.输血
- D.给氧
- E.左下肢夹板固定

57.患者,男性,20岁。胫骨中下1/3骨折,骨折愈合慢,其主要原因是

- A.附近主要血管损伤
- B.附近的周围神经损伤
- C.远骨折段完全丧失血供
- D.两骨折段血供减少
- E.远骨折段血供减少

E.远骨折段血供减少

58.患者,男性,50岁。胃溃疡穿孔后因交通不便而延误治疗,继发急性化脓性腹膜炎,感染性休克,其发生休克的原因主要是

- A.急性呼吸衰竭
- B.中毒性心肌炎
- C.炎性疼痛
- D.毒素吸收和血容量减少
- E.急性肾衰竭

59.患者,女性,20岁。护士,近1周以来疲倦乏力,食欲减退,恶心。查体:巩膜黄染,血ALT720U/L,追问2个月前工作中被污染的针头刺破手指。被污染时应采取的重要措施为

- A.过氧乙酸泡手
- B.局部擦碘酒消毒
- C.肌肉注射乙型肝炎疫苗
- D.肌肉注射乙型肝炎免疫球蛋白
- E.肌肉注射丙种球蛋白

60.患者,男性,67岁。因急性心肌梗死抢救无效确定死亡,护士进行尸体护理时,首先应完成的操作是

- A.填写尸体识别卡
- B.尸体仰卧,取下枕头,洗脸闭合眼睑
- C.给患者装上义齿,以避免脸部变形
- D.用不脱脂棉堵塞身体孔道
- E.拔出引流管缝合伤口

61.患儿,男,14岁。读书成绩差,经常不完成作业,在学校常打骂同学,在家却非常听话和胆小。其父母为一般职员,常为琐事在患者面前争吵或不理睬,尤其是在患者的教育问题上经常出现分歧;父亲对患者的期望要求甚高,考试成绩必须名列前茅,否则拳脚相加。对此患者,适合的心理治疗是

- A.婚姻治疗
- B.家庭治疗
- C.行为治疗
- D.人际心理治疗
- E.短程精神动力学心理治疗

(62~64 题共用题干)

患者,男性,40岁。全身起红斑、手足心起褐色斑点周,不痛、不痒。体检阴茎末端包皮与冠状沟连接处可见一指甲盖大瘢痕,实验室检查确诊为梅毒。

62.感染梅毒后第一期皮肤病变出现的时间是

- A.6 日
- B.1 周
- C.3 周
- D.5 周
- E.8 周

63.本病治疗首选

- A.青霉素
- B.红霉素
- C.四环素
- D.螺旋霉素
- E.甲砒霉素

64.不属于社区护理管理中对梅毒传染源管理的措施是

- A.做好患者的登记报告工作
- B.要求患者治愈后一年内定期复查和随访
- C.妥善处理患者的分泌物、排泄物,严格消毒
- D.要求患者未治愈前性生活使用避孕套
- E.要求患者避免妊娠

(65~68 题共用题干)

患者,男性,45岁。上消化道出血,烦躁、尿少、面色苍白、四肢湿冷,血压 79.5/60 mmHg,出血量约在 700 mL。

65.患者应先用“生理盐水”或林格液快速静脉输入,其作用为

- A.补充血容量
- B.补充电解质
- C.纠正酸中毒
- D.疏通微循环
- E.为输血做准备

66.输液总量为 2 500 mL,滴速为 80 滴/分,每小时可输入液体量为

- A.320 mL
- B.260 mL
- C.240 mL
- D.300 mL
- E.280 mL

67.输液过程中患者出现寒战、发热、体温升高至 40℃,伴恶心、呕吐、头痛、脉速等,可能因为

- A.溶血反应
- B.发热反应
- C.感染
- D.过敏反应
- E.循环负荷过重

68.需根据病情和药物性状调节滴速,液体加入以下药物不宜快速输入的是

- A.维生素 C
- B.氨甲苯酸
- C.雷尼替丁
- D.多巴胺
- E.地塞米松

(69~71 题共用题干)

患者,女性,61岁。晚期肝癌,治疗效果不佳,肝区疼痛剧烈,腹水、呼吸困难,患者感到痛苦,悲哀,有自杀念头。

69.该患者此时心理反应属于

- A.忧郁期
- B.愤怒期
- C.否认期
- D.接受期
- E.协议期

70.随着病情进展,患者出现意识模糊不清,进而昏迷,首先应采取的护理措施是

- A.头偏向一侧,有呼吸道分泌物及时吸出
- B.躁动时选用保护具
- C.眼睑不能闭合盖凡士林纱布
- D.保持患者口腔清洁,定期漱口

E.注意营养及水分的补充

71.患者昏迷1周,对其皮肤护理的重点是

- A.保持皮肤清洁卫生
- B.防止压疮发生
- C.防止皮肤过敏
- D.防止皮肤感染
- E.防止出汗过多

(72~73题共用题干)

患者,女性,38岁。常用“高兴不起来”“心里难受”描述自己的心理体验,觉得活着毫无意义,经诊断为抑郁症,在家口服药物治疗。

72.常用的抗抑郁药是

- A.吩噻嗪类药物
- B.丁酰苯类药物
- C.硫杂蒯类药物
- D.苯二氮草类药物
- E.三环类药物

73.该类药物均有的不良反应是

- A.消化系统副作用
- B.白细胞减少
- C.过敏反应
- D.性功能障碍
- E.抗胆碱能反应

(74~77题共用题干)

患者,女性,24岁。于某城镇社区医院门诊就诊。主诉近2个月出现长期不规则发热,反复腹泻、盗汗,有与艾滋病患者性接触史。

74.目前确认该患者为艾滋病疑似患者,向卫生防疫机构报告的时限应为

- A.4小时
- B.6小时
- C.8小时
- D.12小时
- E.24小时

75.经实验室检查确诊该患者为HIV病毒携带者,下列传播途径不引起HIV感染

的是

- A.性接触传播
- B.血制品传播
- C.母婴传播
- D.破损皮肤受污染
- E.呼吸道传播

76.下列体液中含HIV最多的体液是

- A.眼泪
- B.唾液
- C.阴道分泌物
- D.痰液
- E.羊水

77.护士为HIV/AIDS患者抽血时

- A.不必戴手套
- B.须穿双层隔离衣
- C.只能使用一次性注射器
- D.戴手套、口罩、防护眼镜
- E.操作毕将针头回插入针头帽

(78~80题共用题干)

患者,女性,25岁。因食入不洁饮食,出现严重呕吐腹泻,表现明显脱水,诊断为急性胃肠炎。

78.判断患者脱水的最可靠的标志是

- A.眼球深度凹陷
- B.血细胞比容
- C.24小时尿量
- D.血压
- E.全身表现

79.患者出现严重脱水,其体重应减轻

- A.1%
- B.4%
- C.6%
- D.8%
- E.10%

80.给予快速输液时,应注意观察患者反应,防止发生

- A.肺水肿
- B.空气栓塞
- C.发热反应

D.过敏反应

E.静脉炎

(81~83 题共用题干)

患者,男性,51 岁。患胰腺癌广泛转移,病情日趋恶化,面部消瘦,呈铅灰色,眼眶凹陷,下颌下垂,双眼半睁、呆滞,嘴微张,目前患者对过去做的错事表示悔恨,变得很和善,愿意努力配合治疗。

81.该患者目前属于死亡过程的

A.濒死期

B.临床死亡期

C.生物学死亡期

D.生理学死亡期

E.脑死亡期

82.该患者此时的心理反应属于

A.忧郁期

B.愤怒期

C.否认期

D.接受期

E.协议期

83.不属于对该患者亲属的心理支持的是

A.多给患者同情和照顾

B.多听取并鼓励家属表达情感

C.避免亲属单独接触患者,以免悲伤过度

D.讲解有关卫生知识

E.共同讨论护理计划

(84~86 题共用题干)

患儿,男,10 岁。在学校不慎从 2 楼坠落,腰剧痛,双下肢感觉运动障碍,大小便功能障碍。

84.现场搬运的正确方法是

A.平托或滚动法

B.单人搂抱法

C.双人搂抱法

D.侧卧搬运法

E.背驮法

85.在运送医院的过程中,患者应保持

A.头高脚低位

B.平卧位

C.侧卧位

D.半卧位

E.头略低位

86.患者经治疗出院后,社区护士指导其进行 ROM 训练,ROM 训练是脊髓损伤患者康复护理中的重要环节,ROM 指的是

A.肌力

B.关节活动范围

C.倾斜床站立

D.运动和转移

E.肌肉代偿

二、以下提供若干组考题,每组考题共同在考题前列出 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与考题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(87~89 题共用备选答案)

A.带状疱疹

B.急性肺炎

C.流行性感胃

D.梅毒

E.霍乱

87.属于甲类传染病的是

88.属于乙类传染病的是

89.属于丙类传染病的是

(90~93 题共用备选答案)

A.红肿、灼痛、无水疱

B.张力较大的水疱、剧痛

C.水痕张力小、基底红白相间

D.干燥、焦和蜡白

E.水痕、基底水肿、感觉迟钝

90.属于 I 度烧伤表现的是

91.属于浅 II 度烧伤表现的是

92.属于深 II 度烧伤表现的是

- 93.属于Ⅲ度烧伤表现的是
(94~95 题共用备选答案)
- A.设法促进肌张力和主动运动的出现
 - B.降低痉挛,促进分离运动的恢复
 - C.进一步降低肌痉挛,促进更多的分离运动恢复,改善运动速度、精细程度和耐力
 - D.多种训练交替进行,有所侧重,在不引起异常反应和过度疲劳的情况下,逐渐加大活动量
 - E.瘫痪恢复的次序是先躯干后肩胛区和骨盆,先下肢后上肢
- 94.脑卒中康复训练的原则是
- 95.软瘫期的康复原则是
(96~97 题共用备选答案)
- A.否认期
 - B.愤怒期
 - C.协议期
 - D.忧郁期
 - E.接受期
- 96.临终患者对自己的病情抱有希望,能配合治疗,属于心理分期中的
- 97.临终患者经常斥责医护人员和家属,甚至拒绝治疗,属于心理分期中的
(98~100 题共用备选答案)
- A.接种乙肝疫苗
 - B.诊断梅毒及时报告
 - C.结核病化学药物治疗
 - D.肿瘤的早发现、早诊断
 - E.查找高血压危险因素
- 98.属于传染病一级预防措施的是
- 99.属于传染病二级预防措施的是
- 100.属于传染病三级预防措施的是



考前点睛班