

# 护士执业资格考试

## VIP 模拟试卷



考生姓名: \_\_\_\_\_

准考证号: \_\_\_\_\_

考 场 号: \_\_\_\_\_



# 模拟试卷

## 专业实务

一、以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属方框涂黑。

- |   |  |
|---|--|
| <p>1.下列有关护士坐姿的说法不正确的是</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A.大腿与小腿呈 90°</li> <li>B.两膝自然分开</li> <li>C.上半身挺直</li> <li>D.双手自然置于两腿上</li> <li>E.坐在椅子前部 2/3 处</li> </ul> <p>2.对传染病或疑似传染病患者，门诊护士应</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A.立即安排就诊并做疫情报告</li> <li>B.立即卫生处置并做疫情报告</li> <li>C.立即安排就诊并做卫生处置</li> <li>D.分诊到隔离门诊并做疫情报告</li> <li>E.分诊到隔离门诊并做卫生处置</li> </ul> <p>3.下列护理操作中不需要进行无菌技术的是</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A.吸痰</li> <li>B.留置导尿</li> <li>C.注射药物</li> <li>D.静脉输液</li> <li>E.协助患者翻身</li> </ul> <p>4.以下哪种情况适用一级护理</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A.重症患者，大手术后绝对卧床休息的患者</li> <li>B.患者病情危重，需随时进行抢救的患者</li> <li>C.随时需要观察病情变化的患者</li> <li>D.生活不能完全自理的患者</li> <li>E.年老或婴幼儿</li> </ul> <p>5.低盐饮食每日限用食盐量不超过</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A.2 g</li> <li>B.4 g</li> <li>C.6 g</li> <li>D.8 g</li> <li>E.10 g</li> </ul> | <p>6.因疾病长期侧卧位的患者，压疮最易发生在</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A.足跟</li> <li>B.坐骨结节处</li> <li>C.肩胛</li> <li>D.耳廓</li> <li>E.髂前上棘</li> </ul> <p>7.以下药瓶的标签不妥的是</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A.外用药用红色边</li> <li>B.内服药用蓝色边</li> <li>C.剧毒药用黑色边</li> <li>D.瓶签上应标明药物浓度和剂量</li> <li>E.瓶签上药名应用中文，不可用外文</li> </ul> <p>8.冷疗时间过长可导致</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A.肌肉、肌腱和韧带等组织松弛</li> <li>B.血液循环障碍以致组织坏死</li> <li>C.增进局部免疫功能</li> <li>D.增加痛觉神经的兴奋性</li> <li>E.使皮肤抵抗力降低</li> </ul> <p>9.以下不属于尿潴留临床表现的是</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A.有膀胱刺激症状</li> <li>B.下腹部胀痛不适</li> <li>C.扪及有囊样包块</li> <li>D.可见耻骨上膨隆</li> <li>E.自觉有尿排不出来</li> </ul> <p>10.不符合血培养标本采集原则的是</p> |
|---|--|

- A.血液注入标本瓶后轻轻摇动  
B.标本容器外贴标签  
C.采集量一般为3 mL  
D.在使用抗生素前采集  
E.采集时严格执行无菌操作
- 11.“1.2.3”灌肠溶液的正确配制方法是  
A.50%硫酸镁90 mL、甘油30 mL、温开水60 mL  
B.50%硫酸镁60 mL、甘油30 mL、温开水90 mL  
C.50%硫酸镁30 mL、甘油60 mL、温开水90 mL  
D.50%硫酸镁60 mL、甘油90 mL、温开水30 mL  
E.50%硫酸镁30 mL、甘油90 mL、温开水60 mL
- 12.昏迷患者呼吸道有较多分泌物蓄积时,可出现  
A.潮式呼吸  
B.鼾声呼吸  
C.蝉鸣样呼吸  
D.叹息样呼吸  
E.库斯莫尔呼吸
- 13.最能体现昏迷患者病情的体征变化是  
A.瞳孔  
B.呼吸  
C.脉搏  
D.神志  
E.体温
- 14.以下哪项不是导致静脉炎的原因  
A.反复输入刺激性强的药物  
B.输液速度过快  
C.长期输入高浓度溶液  
D.无菌操作不严格  
E.静脉内留置塑料管时间较长
- 15.患者心脏移植术后6小时应接受何种护理  
A.小组护理
- B.整体护理  
C.临床路径  
D.个案护理  
E.功能制护理
- 16.一人搬运患者时,平车与床的位置是  
A.平行紧靠  
B.平车头端与床头呈锐角  
C.平车头端与床尾呈锐角  
D.平车头端与床头呈钝角  
E.平车头端与床尾呈钝角
- 17.以下哪项是最常见的原发性恶性骨肿瘤  
A.骨瘤  
B.骨肉瘤  
C.骨髓瘤  
D.骨软骨瘤  
E.骨巨细胞瘤
- 18.休克患者抬高下肢的目的是  
A.有利于静脉血液回流,增加心排血量  
B.减少头部充血  
C.便于观察病情  
D.降低颅内压  
E.减轻头痛
- 19.胎盘早剥的常规处理原则是  
A.立即终止妊娠  
B.严密监护下保胎  
C.有充足血源后手术  
D.等交付费用后手术  
E.转往家属要求的医院
- 20.病室湿度过高时,患者会感到  
A.机体散热不畅、皮肤干燥  
B.闷热、难受  
C.消化不良、腹胀便秘  
D.呼吸道黏膜干燥、咽痛  
E.肌肉紧张、易受凉
- 21.以下哪种情况不属于医院内感染  
A.新入院的患者诊断为肺结核  
B.医师诊治肺炎患者后发生感冒  
C.骨折患者入院2周后并发肺炎

- D.患者胃大部分切除术后2天腹部伤口发生感染  
E.护士护理乙肝患者针刺伤后感染乙肝
- 22.下列哪种患者适合使用要素饮食  
A.心力衰竭患者  
B.肝胆疾患患者  
C.肾病综合征患者  
D.重度高血压患者  
E.急性胰腺炎患者
- 23.下列饮食中属于治疗饮食的是  
A.高脂肪饮食  
B.低蛋白饮食  
C.半流质饮食  
D.普通饮食  
E.忌碘饮食
- 24.为口腔有真菌感染的患者进行口腔护理时应首选  
A.醋酸溶液  
B.生理盐水  
C.过氧化氢溶液  
D.碳酸氢钠溶液  
E.洗必泰(氯己定)溶液
- 25.以下哪项是冷热疗法共同的生理效应  
A.解除肌肉痉挛  
B.加速炎症进程  
C.减轻疼痛  
D.降低体温  
E.控制出血
- 26.有关尿液颜色的描述错误的是  
A.正常的新鲜尿液呈淡黄色  
B.胆红素尿振荡后泡沫也呈黄色  
C.尿液呈洗肉水色是因为尿液中含血红蛋白  
D.进食大量胡萝卜素时新鲜尿液呈深黄色  
E.尿液中含有淋巴液,排出的尿液为乳白色
- 27.粪便查寄生虫卵时,为提高检出率应采集  
A.脓血部分的粪便  
B.中间部位的粪便  
C.黏液部分的粪便  
D.边缘部位的粪便  
E.不同部位带血或黏液的粪便
- 28.献血后应注意补充的元素是  
A.镁  
B.钙  
C.铜  
D.硒  
E.铁
- 29.临终患者最后消失的感觉是  
A.视觉  
B.听觉  
C.嗅觉  
D.味觉  
E.触觉
- 30.下列对于护患关系理解正确的是  
A.护患关系不属于人际关系  
B.护患关系是一般的人际关系  
C.护患关系是一种单向的人际关系  
D.护患关系是一种非专业性的人际关系  
E.护患关系是一种帮助与被帮助的人际关系
- 31.注射破伤风抗毒素(TAT)的目的是  
A.对可疑或确诊的破伤风患者进行紧急预防或治疗  
B.杀灭伤口中繁殖的破伤风梭(杆)菌  
C.对易感人群进行预防接种  
D.中和与神经细胞结合的毒素  
E.主要用于儿童的预防接种
- 32.下列引起心室后负荷,即压力负荷过重的疾病是  
A.贫血  
B.高血压  
C.瓣膜关闭不全

D. 室间隔缺损

E. 甲状腺功能亢进

33. 正常足月羊水量为

A. 200 mL

B. 500 mL

C. 1 000 mL

D. 2 000 mL

E. 2 500 mL

34. 质子泵抑制剂治疗胃溃疡的机制为

A. 竞争性结合 H<sub>2</sub>受体B. 抑制 H<sup>+</sup>-K<sup>+</sup>-ATP 酶活性

C. 促进受损胃上皮细胞再生

D. 改善胃黏膜微循环

E. 在胃黏膜表面形成保护膜

35. 下述哪项是早期子宫颈癌的常见症状

A. 更年期周期短的阴道流血

B. 接触性阴道流血

C. 阴道水样排液

D. 绝经后的出血

E. 月经量增多

36. 下列选项中, 属于护士义务的是

A. 参与公共卫生和疾病预防控制

B. 对医疗卫生机构和卫生主管部门的工作提出意见和建议

C. 从事有感染传染病危险工作的护士, 应当接受职业健康监护

D. 获得与本人业务能力和学术水平相应专业技术职务、职称

E. 按照国家有关规定获取工资报酬、享受福利待遇、参加社会保险

37. 患者, 男, 33岁, 因突发支气管哮喘导致呼吸困难而采取端坐位, 该患者所处的体位属于

A. 被迫卧位

B. 治疗体位

C. 被动卧位

D. 主动卧位

E. 专业体位

38. 小李是一名心血管内科护士, 在病房示教室为高血压患者进行高血压疾病护理健康教育时, 她与患者之间应采用的最佳距离应为

A. 个人距离

B. 社会距离

C. 亲密距离

D. 社区距离

E. 公众距离

39. 患者, 男, 50岁, 诊断为“淋巴瘤”入院化疗, 在对该患者的护理措施中不妥的是

A. 病室适当通风

B. 定期病室消毒

C. 病室和走廊可适当摆设鲜花和绿色植物

D. 为保持病室安静, 护士间应附耳细语

E. 患者夜间睡眠时, 用地灯或罩壁灯

40. 患者, 男, 38岁, 诊断为“胆结石”入院。今日行胆囊切除术。病房护士为其铺麻醉床, 下列哪项措施是错误的

A. 中单要全部遮住橡胶单

B. 椅子放在盖被折叠的同侧床尾

C. 盖被纵向呈扇形三折叠于床的一侧, 开口向门

D. 橡胶单、中单先铺床头, 再铺床中部

E. 枕头横立于床头, 开口背门

41. 患者, 女, 56岁, 因心绞痛入院, 护士为其制订一系列护理计划, 以下实施护理计划的过程错误的是

A. 及时评价实施的质量、效果

B. 实施过程是独立的, 与其他医务人员没有关系

C. 实施前应重新评估患者

D. 实施前应准备实施护理措施的知识和技能

E. 如护理计划与患者情况不符, 需立即修改护理计划

42. 患者, 男, 39岁, 高位截瘫长期卧床, 活动受限对机体的影响不包括下列哪项

- A.腹泻  
B.骨质疏松  
C.排尿困难  
D.坠积性肺炎  
E.体位性低血压

43.患者,男,72岁,诊断为“COPD”,遵医嘱给予吸氧,吸入氧浓度为29%,应调节氧流量为

- A.5 L/min  
B.4 L/min  
C.3 L/min  
D.2 L/min  
E.1 L/min

44.患者,男,7天前下田不慎脚趾被玻璃划伤,近2天发热、厌食,说话受限,咬嚼困难,苦笑面容,急诊入院,接诊护士应行

- A.血液隔离  
B.接触性隔离  
C.消化道隔离  
D.呼吸道隔离  
E.严密隔离

45.患者,男,18岁,面部危险三角区化脓性感染,忌用热敷的主要原因是

- A.加重疼痛  
B.加重局部出血  
C.易致颅内感染  
D.掩盖病情,难以确诊  
E.易导致面部皮肤烫伤

46.护士小王准备对油剂、粉剂进行灭菌,下列哪项是最佳的灭菌方法

- A.戊二醇法  
B.干热消毒法  
C.压力蒸汽法  
D.过氧乙酸法  
E.环氧乙烷法

47.患者,男,78岁,肝癌晚期,临终前出现规律呼吸几次后,突然停止呼吸,一段时间后又开始呼吸,如此反复交替。该患者的呼吸型态属于

- A.毕奥呼吸  
B.陈-施呼吸  
C.库斯莫呼吸  
D.抑制性呼吸  
E.叹息样呼吸

48.患者,男,69岁,肝癌晚期,自感不久于人世,常常一人呆坐,泪流满面,十分悲哀。相应的最佳护理措施为

- A.维持患者希望  
B.指导患者更好配合  
C.鼓励患者增强信心  
D.尽量不让患者流露失落情绪  
E.安慰患者并允许家属陪伴

49.患者,男,68岁,充血性心力衰竭,为其灌肠时禁忌使用的灌肠液是

- A.肥皂水  
B.“1.2.3”溶液  
C.抗生素  
D.0.9%氯化钠溶液  
E.植物油

50.患者,女,46岁,因“急性胃穿孔”需急诊手术而入院,住院处护士应

- A.实施卫生处置  
B.办理入院手续  
C.测量生命体征  
D.建立静脉通路  
E.立即送手术室进行手术

51.孕妇,29岁,G<sub>1</sub>P<sub>0</sub>孕28周,产前门诊检查发现胎儿横位,其余情况正常。为矫正胎位,护士应为患者安置

- A.膝胸卧位  
B.半坐卧位  
C.去枕仰卧位  
D.头低足高位  
E.头高足低位

52.患者,男,24岁,车祸导致大量失血,遵医嘱给予输注血浆,下列输血过程中错误的是

- A.输血前双人核对

- B.开始输入时速度宜慢
- C.输完的血袋保留 24 小时
- D.输注完一袋血浆立即接上另一袋
- E.在输血卡上记录输血的时间、滴速、患者情况，并签全名

53.患者，男，72岁，心脏瓣膜置换术后第10天，患者进食中突然意识丧失，瞳孔散大，大小便失禁。护士在配合医生抢救过程中，下列哪项措施是正确的

- A.任何情况下，护士不执行口头医嘱
- B.抢救完毕，请医生第2天补写医嘱与处方
- C.输液瓶、输血袋用后及时按医用垃圾处理
- D.急救药品的空安瓿经患者检查后方可丢弃
- E.口头医嘱向医生复述一遍，经双方确认无误后方可执行

54.患者，男，43岁，因急性右上腹痛入院。护士为其制定护理计划，1周之后评价护理效果。以下说法错误的是

- A.如问题仍然存在，目标和措施恰当，应停止原计划，重新制订计划
- B.将服务对象的反应与预期目标进行比较，了解目标是否实现
- C.护理评价时需要重新收集服务对象的主客观资料
- D.目标如未完全实现，应分析原因
- E.如问题已经解决，停止采取措施

55.王护士长应用护理程序的方法进行手术室护士的继续教育管理。护理程序最早提出者是

- A.赫尔(Hall)
- B.约翰逊(Johnson)
- C.尤拉(Yura)
- D.沃尔什(Walsh)
- E.盖比(Gebbie)

56.患者，女，31岁，术后恢复中，肢体能抬离床面，但不能对抗阻力，护士评价其肌

力为

- A.1 级
- B.2 级
- C.3 级
- D.4 级
- E.5 级

57.患者，女，32岁，将行卵巢肿瘤剥除术，护士为其行术前导尿，下列哪项戴、脱无菌手套的操作是错误的

A.已戴手套的手可以触及另一手套的内面

- B.戴好手套后，两手置腰部以上水平
- C.脱手套后应再次洗手
- D.戴手套前先将手洗净擦干

E.核对手套袋外的手套号码、灭菌日期

58.患者，男，48岁，因心绞痛入院，护士指导患者舌下含服硝酸甘油片，正确的方法是应将药片放于

- A.舌面上
- B.用温水含服
- C.口中咀嚼后咽下
- D.上下牙齿之间咬住
- E.舌下热窝处待其溶化吸收

59.患者，男，69岁，诊断为“冠心病”入院。患者自行沐浴时，下列哪项措施不妥

- A.浴室应闩门
- B.用物准备齐全
- C.门外挂牌以示室内有人
- D.沐浴应于餐后1小时进行
- E.调节浴室室温在22~24℃

60.患儿，6岁，不慎将花生米误吸人气管，其不可能出现的临床表现是

- A.烦躁不安
- B.吸气费力
- C.呼气费力
- D.鼻翼扇动
- E.口唇发绀

61.患者，女，53岁，慢性便秘，遵医嘱进行大量不保留灌肠。灌肠过程中溶液流入

受阻时,正确处理的方法是

- A.抬高灌肠筒的高度
- B.降低灌肠筒的高度
- C.让患者快速呼吸
- D.让患者深呼吸
- E.移动肛管

62.患者,女,28岁,因急性胃肠炎入院,剧烈呕吐,护士遵医嘱肌内注射“甲氧氯普胺”。以下用过的物品中需丢弃在感染性垃圾桶的是

- A.安瓶
- B.棉签
- C.针头
- D.小棉垫
- E.止血带

63.患者,男,23岁,一侧下腹部剧烈疼痛,头晕、眼花、出冷汗并伴有恶心、呕吐,门诊护士处理方法正确的是

- A.转急诊室诊治
- B.立即送抢救室抢救
- C.将患者转隔离门诊诊治
- D.详细询问患者的家庭经济情况
- E.为其测量血压,安慰患者后嘱其耐心等待

64.患者,男,45岁,长期胸部疼痛、咯血,疑诊为肺癌。遵医嘱留取痰标本查癌细胞,固定标本的溶液宜选用

- A.10%甲醛
- B.40%甲醛
- C.40%甲苯
- D.70%乙醇
- E.75%乙醇

65.患儿,男,6岁,在河边玩水时不慎溺水窒息,急救的首要步骤是

- A.心脏按压
- B.挤压简易呼吸器
- C.清除呼吸道异物和分泌物
- D.肌内注射呼吸兴奋剂
- E.口对口人工呼吸

66.患者,男,20岁,擦玻璃时不慎从楼上跌下,造成严重的颅脑损伤,需随时观察、抢救,入院后对此患者应给予

- A.个案护理
- B.特级护理
- C.一级护理
- D.二级护理
- E.三级护理

67.患儿,10岁,右腿不慎被烧伤,Ⅱ度烧伤面积达15%,入院后经评估需使用保护具,以下措施哪项是错误的

- A.短期使用保护性制动
- B.不可在烧伤的皮肤上约束
- C.下肢约束带无法限制患者坐起
- D.使用约束带应使肢体处于功能位
- E.将患者的双上肢外展固定于身体两侧

68.患者,男,56岁,因车祸颅脑损伤,抢救无效,医师确定死亡后,护士进行尸体护理,下列操作哪项不正确

- A.尸体仰卧,取下枕头,洗脸,闭合眼睑
- B.给患者装上义齿,以避免脸部变形
- C.态度真诚严肃,表示同情理解
- D.用不脱脂棉填塞尸体孔道
- E.填写尸体识别卡

69.患者,男,42岁,为协助诊断有无消化道出血,遵医嘱拟进行大便隐血试验,下列对患者的指导中,正确的是

- A.禁食8小时
- B.禁食含碘食物
- C.不可食用牛奶、豆制品
- D.试验前3天起禁食肉类、肝类、动物血、含铁食物、绿色蔬菜等
- E.检查当日早晨禁食

70.患者,因发热40.2℃,使用冰袋降温,取下冰袋的标准是使体温降至

- A.37℃
- B.37.5℃
- C.37℃以下

D.38 ℃以下

E.39 ℃以下

71.患者,女,65岁,截瘫。因长期卧床,患者可能发生的并发症不包括

- A.腹泻
- B.压疮
- C.坠积性肺炎
- D.深静脉血栓
- E.泌尿系统感染

72.患者,男,60岁,胃大部切除术后行空肠造瘘。该患者饮食应采取

- A.少渣饮食
- B.要素饮食
- C.流质饮食
- D.低脂肪饮食
- E.半流质饮食

73.患者,男,30岁,车祸致左上肢骨折,护士在为其换衣时,正确脱、穿的方法是

- A.先脱左肢,先穿左肢
- B.先脱左肢,先穿右肢
- C.先脱右肢,先穿左肢
- D.先脱右肢,先穿右肢
- E.按患者意愿做

74.患者,女,32岁,阴道真菌感染,为减轻或消除炎症,可采用的方法是

- A.湿热敷
- B.热水袋热敷
- C.红外线照射
- D.局部浸泡
- E.热水坐浴

75.患者,女,36岁,尿失禁,遵医嘱给予留置导尿,下列操作中错误的是

- A.每个棉球限用一次
  - B.操作前嘱患者清洁外阴
  - C.插入导尿管,见尿后再插1~2cm
  - D.初次消毒顺序由外向内,自上而下
  - E.再次消毒顺序由内-外-内,自上而下
- 76.患者,男,23岁,腹痛、腹泻、里急后重,排脓血便,诊断为“慢性细菌性痢疾”。

医嘱:1%新霉素50mL,保留灌肠,以下操作哪项不妥

- A.取屈膝仰卧位抬高臀部
- B.嘱患者先排尿、排便
- C.保留溶液1小时以上
- D.液面距肛门小于30cm
- E.插入肛管10~15cm

77.护士在巡视输液患者时,发现某患者溶液不滴,轻轻挤压输液管有阻力,且无回血,正确的处理方法是

- A.更换输液器
- B.热敷局部血管
- C.调整针头位置
- D.更换针头,重新穿刺
- E.注射器推注生理盐水

78.患者,男,76岁,因前列腺肥大而尿潴留,医嘱导尿。为患者导尿时尿管应插入的深度为

- A.16~18cm
- B.18~20cm
- C.20~22cm
- D.22~24cm
- E.24~26cm

79.患者,男,40岁,右小腿丹毒,拟给予青霉素治疗,进行皮肤试验局部呈阳性反应,下列做法哪项不妥

- A.给予肾上腺素抢救
- B.报告医师,修改治疗方案
- C.告知患者本人,禁用青霉素
- D.严格交班,并写入交班报告
- E.在治疗单、门诊卡、床头卡等地方注明青霉素阳性标记

80.患者,男,65岁,胰腺癌晚期,经过一段时间的治疗之后,病情恶化,身体更加虚弱。患者沉默,常独自流泪,反应迟钝,对任何事情都不感兴趣。此时患者的心理处于

- A.愤怒期
- B.协议期
- C.忧郁期

D. 接受期

E. 否认期

81. 患者，男，30岁，CT示颅内肿物，近日日常处于睡眠状态，不易唤醒，醒时睁眼，但缺乏表情，回答问题答非所问，各种反射活动存在。此情况属于

A.嗜睡

B.昏睡

C.昏迷

D.精神错乱

E.意识模糊

82. 患者，女，27岁，诊断为支气管哮喘，快速静滴某药后，出现心悸、头晕、心律失常、血压下降，此药物可能是

A.甲泼尼松

B.多索茶碱

C.盐酸氨溴索

D.头孢他啶

E.沙丁胺醇

83. 患儿，女，8个月，按公式计算其标准体重应为

A.6.5 kg

B.7.0 kg

C.7.5 kg

D.8.0 kg

E.8.5 kg

84. 患者，男，35岁，因面色苍白伴乏力、皮肤紫癜1个月来院就诊，查血常规示：血红蛋白 $75\text{ g/L}$ ，白细胞 $1.0\times 10^9/\text{L}$ ，血小板 $70\times 10^9/\text{L}$ 。该患者目前最主要的护理诊断是

A.焦虑

B.有受伤的危险

C.有感染的危险

D.皮肤黏膜完整性受损

E.潜在并发症：颅内出血

85. 患者，男，43岁，下肢静脉曲张剥脱术后，护士告知其早期下床活动的主要目的是

A.避免肠粘连

B.防止术后复发

C.促进切口愈合

D.预防坠积性肺炎

E.避免深静脉血栓形成

86. 患者，男，65岁，近两年右上肢抖动，动作迟缓，面容呆板，行走起步困难，体检右上下肢肌张力齿轮样增高，诊断为帕金森病，服用左旋多巴进行治疗。对该患者的护理正确的是

A.右侧肢体无需功能锻炼

B.鼓励患者进行自我护理

C.固定右侧肢体，防止肢体抖动

D.给予高热量、高维生素、高蛋白饮食

E.告知患者疾病可根治，树立信心

87. 患者，男，45岁，以大叶性肺炎收治入院，入院后青霉素皮试结果阳性，当班护士未将皮试结果记录到护理记录单中，导致接班护士误将青霉素注射给该患者，患者出现青霉素过敏反应，经抢救无效死亡。该事件属于几级医疗事故

A.一级

B.二级

C.三级

D.四级

E.五级

88. 男，36岁，车祸头部受伤，伤后不省人事约半小时，清醒后诉头痛、恶心、呕吐，4小时后再次昏迷。首先考虑

A.脑震荡

B.颅底骨折

C.颅盖骨折

D.硬脑膜下血肿

E.硬脑膜外血肿

89. 某医院内科病房，护士小李误将甲床患者的青霉素注射给乙床患者，而将乙床患者的庆大霉素注射给甲床患者，此时护士小李正确的做法是

A.直接隐瞒下去，不将此事告知护士长

B.立即将此事告知护士长，并对患者进

行进一步的观察

C.自己严密观察,若发现患者出现过敏反应,立即告知护士长

D.自己严密观察,若患者没有出现异常现象,就将此事隐瞒下去

E.若患者出现过敏反应,等护士长对此事进行调查时,再告知护士长

**二、以下提供若干案例,每个案例下设若干个考题。请根据各考题题干所提供的信息,在每题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应字母所属方框涂黑。**

(91~93题共用题干)

患者,男,38岁,中毒性肺炎,休克。经抢救病情稳定,为维持血压。医嘱:10%葡萄糖400mL加多巴胺20mg。

91.如果按每分钟滴液20滴,估计输液时间能维持

- A.2小时
- B.3小时
- C.4小时
- D.5小时
- E.6小时

92.输液过程中应密切观察患者的输液反应,临床最常见的输液反应是

- A.肺水肿
- B.静脉炎
- C.发热反应
- D.过敏反应
- E.心力衰竭

93.输液一段时间后,发现注射部位沿静脉走向出现条索状红线,并有红、肿、热、痛,下述护理措施中哪项不宜

- A.患肢活动增加
- B.更换注射部位
- C.硫酸镁湿敷
- D.患肢抬高
- E.局部理疗

(94~96题共用题干)

患者,男,26岁,车祸后导致颅内出血昏迷,现需用平车运送去做CT检查。

90.患者,女,22岁,右胸外伤导致血气胸,行胸腔闭式引流术,其作用不包括

- A.促进呼吸道分泌物排出
- B.重建负压,促进肺复张
- C.平衡压力,预防纵隔移位
- D.及时发现胸膜腔内活动性出血
- E.排除积气、积液

94.如果两名护士搬运患者至平车,以下做法正确的是

- A.甲托患者头、颈、背部;乙托腰、膝部
- B.甲托患者头、颈、肩部;乙托臀、膝部
- C.甲托患者头、颈、肩、背部;乙托腰、大腿处
- D.甲托患者头、颈、背部;乙托臀、小腿处
- E.甲托患者头、颈、肩、腰部;乙托臀、膝部

95.平车运送患者时正确的方法是

- A.车速宜快,以免耽误抢救
- B.护士应位于患者头部,随时观察病情变化
- C.进出门时用车撞门
- D.暂停吸氧、输液等治疗措施
- E.推车时护士站于小轮端

96.护士推平车上下坡时,患者头部应在高处,是因为

- A.减轻头部充血不适
- B.有利于与患者交谈
- C.防止血压下降
- D.避免呼吸不畅
- E.预防坠车

(97~99题共用题干)

患者,女,31岁,突发高热、巩膜黄染、肝区疼痛2天,诊断为“甲型肝炎”入院,收入传染病区。

97.护士在入院指导时告知此病区的清

洁区是

- A.化验室
- B.值班室
- C.病区走廊
- D.患者浴室
- E.医护办公室

98.护士给患者的排泄物消毒时最好选用的消毒剂是

- A.乙醇
- B.戊二醛
- C.过氧乙酸
- D.过氧化氢
- E.含氯消毒剂

99.护士在对该患者的隔离措施中,下列哪项措施不符合隔离原则

- A.隔离病室门口,隔离标志明确,卫生设施齐全
- B.穿好隔离衣后再备好所需物品进入隔离病室
- C.探视人员按要求采取相应隔离措施
- D.加强隔离患者的心理护理
- E.每日消毒隔离病室环境

(100~101题共用题干)

患者,男,65岁,因脑出血已在家卧床2个月,不能自行翻身,近日尾骶部皮肤呈紫红色,压之不褪色。

- 100.此患者压疮所处的临床分期是
- A.溃疡期
  - B.淤血红润期
  - C.炎性红润期
  - D.炎性浸润期
  - E.淤血浸润期

101.护理的重点是定期为患者翻身,确定翻身间隔时间是根据

- A.医嘱
- B.患者要求
- C.病情和受压情况
- D.家属的提议
- E.护理人员情况

(102~104题共用题干)

患者,男,69岁,因头痛、头晕入院,在平静状态下测得血压为165/95 mmHg,其余检查正常。

102.该患者最有可能的诊断是

- A.脑瘤
- B.脑膜炎
- C.冠心病
- D.脑出血
- E.原发性高血压

103.患者住院期间,为其测量血压,以下正确的是

- A.若采取立位测量,手臂应平第6肋间
- B.放气时听到的最强音即为收缩压
- C.缓慢放气,速度以水银柱下降4 mmHg/s为宜
- D.听到舒张压后保持放气速度,直到汞柱回到零位

E.发现血压听不清时,立即重新测量

104.为该患者做健康宣教,下列哪项内容是不正确的

- A.低盐饮食
- B.规律服用降压药物
- C.适度的体育锻炼
- D.在药物的作用下将血压控制得越低越好
- E.多吃含纤维素的食物,预防便秘

(105~106题共用题干)

患者,男,29岁,打篮球时突发自发性气胸,遵医嘱给予高浓度吸氧,卧床休息。

105.下列给氧的操作中,错误的是

- A.用生理盐水湿化
- B.先调节流量再应用
- C.用氧前先用棉签清洁鼻腔
- D.记录用氧时间、氧流量
- E.改变流量时,先分离鼻导管再调节流量

106.吸氧两天后,患者出现胸骨下不适、灼热感,继而出现呼吸增快、恶心呕吐、干

咳。最可能的原因是

- A.缺氧
- B.肺不张
- C.氧中毒
- D.呼吸困难
- E.呼吸抑制

(107~109题共用题干)

患者,张某,患慢性支气管炎十七年,10天前急性发作并发肺部感染,痰黏稠不易咳出。107.为患者进行吸痰时,下列哪项操作是错误的

- A.调节负压至40~53.3 kPa
- B.吸痰用物隔日更换
- C.痰黏稠时可叩拍胸背部
- D.先插管后开动吸引器
- E.操作前先检查吸引器性能是否良好

108.电动吸引器吸痰每次插入导管吸引时间不超过

- A.2秒
- B.5秒
- C.10秒
- D.15秒
- E.20秒

109.通过治疗和给氧护理后病情好转,按医嘱停用氧,护士应首先

- A.关总开关
- B.拔出鼻导管
- C.取下湿化瓶
- D.关流量表
- E.从供氧装置上取下氧气表

(110~111题共用题干)

患者,男,53岁,在施工工地不慎从三楼坠落。

110.评估患者有哪些临床表现才可对其进行心肺复苏

- A.瞳孔散大;血压下降
- B.呼吸停止;瞳孔散大
- C.呼吸停止;伤口不出血
- D.皮肤苍白或发绀;血压下降

E.突然面色死灰、意识丧失;颈动脉搏动消失

111.急救人员赶到现场后发现患者头颈部有外伤,为其进行心肺复苏,以下方法错误的是

- A.应用仰头抬颈法开放气道
- B.心脏按压的频率不低于100次/分
- C.吹气时口唇包住患者口唇,不留空隙
- D.口腔内如有异物应清除,有义齿应取下
- E.将患者仰卧于地上,头颈躯干保持一条直线

(112~115题共用题干)

患者,男,27岁,长途客车司机,因在高速公路发生交通事故导致上肢骨折,大量出血急诊入院。

112.针对此情况,急诊预检护士应立即通知

- A.家属
- B.总值班
- C.医务科
- D.护士长
- E.医院保卫部门

113.在医生未到之前,急诊值班护士首先应

- A.通知病房,准备床位
- B.注射镇痛剂
- C.了解患者的心理状况,安慰患者
- D.止血、测血压、配血、建立静脉通道
- E.详细询问交通事故的发生过程

114.经初步处理后患者可用轮椅转运至骨科病房,使用轮椅运送患者时下列哪项是错误的

- A.寒冷季节注意保暖
- B.护士站在轮椅背后固定轮椅
- C.下坡时适当加快速度
- D.嘱患者手扶轮椅向后靠
- E.轮椅椅背与床尾平齐且面向床头

115.医生给予患者手术治疗后,医嘱:

级护理,下列做法哪项不妥

- A.按需准备急救药物
- B.及时、准确填写护理记录单
- C.做好基础护理,满足患者身心需要
- D.每1~2小时巡视患者一次,观察病情
- E.制订护理计划,严格执行各项诊疗措施

(116~120题共用题干)

患者,男,71岁,因慢性阻塞性肺气肿住院治疗。今早8时起开始静脉输入5%葡萄糖溶液500mL,滴速为80滴/分。8时左右,当护士来巡房时,发现患者咳嗽、咳粉红色泡沫样痰,呼吸急促,大汗淋漓。

116.根据患者的临床表现,该患者可能出现了

- A.心脏负荷过量
- B.发热反应
- C.过敏反应
- D.急性感染
- E.空气栓塞

117.护士首先应采取的措施是

- A.给患者吸氧
- B.立即停止输液

C.立即通知医生

- D.安慰患者
- E.协助患者取端坐位,两腿垂直

118.为缓解症状,可协助患者采取下列哪种体位

- A.仰卧,头偏向一侧,防止窒息
- B.抬高床头20~30°,以利于呼吸
- C.左侧卧位,防止空气阻塞肺动脉口
- D.端坐位,两腿下垂,减少回心血量
- E.抬高床头15~30cm,减少回心血量

119.为了减轻呼吸困难的症状,护士可采用

- A.生理盐水湿化给氧
- B.无菌蒸馏水湿化给氧
- C.10%~20%乙醇湿化加压给氧
- D.20%~30%乙醇湿化加压给氧
- E.50%~70%乙醇湿化加压给氧

120.该患者目前不存在的护理问题是

- A.活动无耐力
- B.知识缺乏
- C.体液过多
- D.恐惧
- E.气体交换受损

# 参考答案

## 专业实务

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	D	E	A	A	D	E	B	A	C
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C	B	A	B	D	E	B	A	A	B
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
A	E	B	D	C	C	E	E	B	E
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
A	B	C	B	B	A	A	E	D	D
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
B	A	D	B	C	B	A	E	D	E
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
A	D	E	A	A	C	A	E	A	C
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
E	B	A	A	C	B	E	A	D	E
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
A	B	C	E	C	A	D	C	A	C
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
B	B	D	C	E	B	A	E	B	B
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
D	C	A	E	B	A	B	E	B	B
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
C	E	C	D	A	C	B	D	B	E
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
A	E	D	C	D	A	B	D	D	B

## 实践能力

一、以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属方框涂黑。

- |   |  |
|---|--|
| <p>1.肺癌最常见的早期症状是</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A.咯血</li> <li>B.咳嗽</li> <li>C.发热</li> <li>D.胸闷</li> <li>E.喘鸣</li> </ul> <p>2.肺炎患者胸痛时宜采取的体位是</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A.头抬高 15°,脚抬高 20°</li> <li>B.头低脚高位</li> <li>C.患侧卧位</li> <li>D.健侧卧位</li> <li>E.平卧位</li> </ul> <p>3.流行性乙型脑炎致死的主要原因是</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A.呼吸衰竭</li> <li>B.高热</li> <li>C.惊厥</li> <li>D.休克</li> <li>E.昏迷</li> </ul> <p>4.关于颅底骨折,下列错误的是</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A.颅中窝骨折可出现鼻漏</li> <li>B.颅后窝骨折可出现乳突区皮下瘀斑</li> <li>C.脑脊液漏一般应在 2 周内自行停止,若不停止,即应行手术修补</li> <li>D.有脑脊液漏时禁行腰穿</li> <li>E.颅前窝骨折可出现“熊猫眼”</li> </ul> <p>5.溃疡性结肠炎活动期表现是</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A.发热</li> <li>B.腹泻</li> <li>C.便秘</li> <li>D.外周关节炎</li> <li>E.黏液脓血便</li> </ul> <p>6.为预防急性肾衰竭,哪种外伤患者,应从静脉输入碱性溶液以碱化尿液</p> | <p>A.肾挫伤</p> <p>B.前臂裂伤</p> <p>C.肋骨骨折</p> <p>D.头皮撕脱伤</p> <p>E.大腿挤压伤</p> <p>7.女性骨盆平面及径线的陈述,正确的是</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A.胎儿最先进入的是入口横径</li> <li>B.中骨盆平面的各径线较宽大</li> <li>C.骨盆腔的三个平面是假想的</li> <li>D.骨盆入口平面有两条径线</li> <li>E.出口平面前后径线是最短的</li> </ul> <p>8.开放性气胸急救的首要措施是</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A.止痛</li> <li>B.抗感染</li> <li>C.吸氧</li> <li>D.封闭伤口</li> <li>E.立即清创</li> </ul> <p>9.宫颈癌前病变确诊方法是</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A.宫颈和宫颈管活组织检查</li> <li>B.宫颈刮片细胞学检查</li> <li>C.分段诊断性刮宫</li> <li>D.X 线检查</li> <li>E.B 超检查</li> </ul> <p>10.疖与痈的主要区别是</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A.两者的致病菌不同</li> <li>B.疖是单个毛囊的病变,痈是多个毛囊的病变</li> <li>C.疖以局部症状为主,痈较多伴全身症状</li> <li>D.痈比疖更容易发生脓肿</li> <li>E.痈比疖更多发区域淋巴结肿大</li> </ul> <p>11.新生儿缺氧缺血性脑病最常见的</p> |
|---|--|

## 原因

- A.呼吸暂停  
B.围生期窒息  
C.脑血管栓塞  
D.一氧化碳中毒  
E.心力衰竭

12.维生素 D 缺乏性手足搐搦症发生惊厥、喉痉挛多见于

- A.婴儿  
B.幼儿  
C.年长儿  
D.学龄前儿童  
E.学龄期儿童

13.肾病综合征最常见的并发症是

- A.感染  
B.急性肾衰竭  
C.生长发育落后  
D.电解质紊乱和低血容量  
E.凝血状态及血栓形成

14.肾结核的血尿特点为

- A.全血尿  
B.镜下血尿  
C.终末血尿  
D.间歇性无痛血尿  
E.伴有尿路刺激症状的终末血尿

15.患者,女,45岁。因“支气管扩张”住院,今晨出现咯血一次,量约300mL。患者神情紧张,护士拟采取的急救措施不妥的是

- A.立即置患者于头低足高位  
B.立即清除口腔内血块  
C.给予高流量吸氧  
D.立即应用镇静、镇咳剂  
E.做好气管插管或切开的准备

16.对外伤性脑内血肿颅内压增高的患者,下列哪项措施是最危险的

- A.脑室外引流  
B.腰穿放脑脊液  
C.不规则服用利尿药

## D.灌肠

E.卧床休息

17.急性肾衰竭少尿期最容易出现

- A.高钠血症  
B.低钾血症  
C.代谢性酸中毒  
D.高磷血症  
E.高钙血症

18.有糖尿病史的患者进行术前护理准备时,下列措施错误的是

- A.术前2周戒烟  
B.术前12小时禁食  
C.术晨嘱患者取下活动假牙  
D.术晨询问患者是否月经来潮  
E.术前予胰岛素控制血糖,使尿糖转为阴性

19.以下不属于右半结肠癌的临床特点的是

- A.贫血  
B.消瘦  
C.腹部包块  
D.肠梗阻较常见  
E.肿瘤多呈肿块型

20.母乳喂养每次哺乳时间约为

- A.1~5分钟  
B.5~10分钟  
C.15~20分钟  
D.20~25分钟  
E.25~30分钟

21.早产儿体重低于多少时,宜及早置入温箱保暖

- A.1 000 g  
B.1 500 g  
C.2 000 g  
D.2 500 g  
E.3 000 g

22.抢救对硫磷等硫代类有机磷中毒患者,洗胃液忌用

- A.高锰酸钾溶液  
B.碳酸氢钠  
C.生理盐水  
D.温水  
E.清水
- 23.营养性巨幼细胞贫血的特异临床表现是  
A.肢体震颤  
B.食欲减退  
C.头晕眼花  
D.注意力不集中  
E.面色苍白
- 24.消化性溃疡最常见的并发症为  
A.营养不良  
B.出血  
C.穿孔  
D.幽门梗阻  
E.癌变
- 25.确诊感染性心内膜炎的最重要的依据是  
A.超声心动图异常  
B.血培养阳性  
C.感染  
D.发热  
E.心律失常
- 26.下面哪种不是控制艾滋病有效的方法  
A.全民动员开展健康教育,不断提高广大民众艾滋病知识知晓率  
B.正确使用安全套  
C.洁身自爱,避免高危性行为  
D.隔离艾滋病病毒携带者  
E.及早治愈性病可大大减少感染艾滋病、性病的危险
- 27.对于颅内压增高患者,腰椎穿刺的主要危险是  
A.引起感染  
B.诱发脑疝
- C.引起脑出血  
D.引起癫痫发作  
E.引起颅内压降低
- 28.老年人运动原则不包括  
A.体弱和高龄老人不应参加运动  
B.应重视重量训练  
C.注意维持体内运动“平衡”  
D.关注与锻炼相关的运动心理  
E.重视有助于心、血管健康的运动
- 29.乳腺癌常见的病因中,与下列哪项无关  
A.雌酮含量增高  
B.高脂饮食  
C.生活方式  
D.遗传  
E.血型
- 30.胆道蛔虫病患者服用驱虫药的时间应选择在  
A.与早餐同服  
B.晚上睡前空腹  
C.早餐后半小时  
D.午餐前半小时  
E.与晚餐同服
- 31.破伤风发病时,最先出现的症状是  
A.牙关紧闭,开口困难  
B.上肢屈曲,下肢挺直  
C.苦笑面容  
D.颈项强直  
E.角弓反张
- 32.下列哪项符合新生儿轻度缺氧缺血性脑病的表现  
A.意识模糊  
B.呼吸暂停  
C.肌张力正常  
D.拥抱反射减弱  
E.惊厥
- 33.以下哪项不是过敏性紫癜的临床表现

- A. 血尿、蛋白尿
- B. 长期发热
- C. 皮肤紫癜
- D. 关节疼痛
- E. 腹痛、便血

34. 下肢静脉曲张患者为避免腹内压增高所采取的护理措施不包括

- A. 穿宽松衣物
- B. 保持大便通畅
- C. 使用弹力绷带
- D. 避免长时间站立
- E. 有计划地减轻体重

35. 绒毛膜癌与侵蚀性葡萄胎的主要区别是

- A. 有出血坏死
- B. 侵犯肌层和血管
- C. 有阴道转移结节
- D. 不形成绒毛结构
- E. 成片滋养细胞浸润

36. 患者,男,28岁,平素体健,无明显诱因突然出现右侧面部剧烈疼痛,频繁发作,诊断为三叉神经痛,以下缓解患者疼痛的措施不妥的是

- A. 避免强光和噪声刺激
- B. 不可使用止痛药物
- C. 指导患者进行放松训练
- D. 指导患者合理休息、适度娱乐
- E. 洗脸、刷牙动作宜轻柔

37. 患者,男,39岁,因胸痛2小时入院,有肥厚性心肌病史。首要的护理措施是

- A. 进行入院评估
- B. 饮食指导
- C. 活动指导
- D. 给氧
- E. 体格检查

38. 患者,男,56岁,患糖尿病十余年,目前患者出现神经病变,该患者最可能的神经系统合并症是

- A. 神经根炎
- B. 运动神经炎
- C. 周围神经病变
- D. 中枢神经损害
- E. 自主神经损害

39. 患者,男,65岁,患有慢性支气管炎15年,冬季易发作,近2年出现气促,可能患有慢性阻塞性肺疾病,护士告知患者以下哪项检查可以确诊

- A. 胸部X线检查
- B. 肺功能检查
- C. 痰培养
- D. 心电图
- E. 动脉血气分析

40. 患者,女,25岁,新婚,家庭和睦。因不明原因高热就诊,经检查诊断为急性白血病,患者得知病情后终日不语,表情呆滞,拒绝接受任何治疗。该患者的心理反应是

- A. 焦虑
- B. 绝望
- C. 恐惧
- D. 神经质
- E. 紧张

41. 患者,女,55岁,因上消化大出血入院。住院期间出现尿量减少,约700mL/d,血肌酐每天上升5mmol/L,诊断为急性肾衰竭。该患者出现急性肾衰竭可能的原因为

- A. 输尿管梗阻
- B. 肾性肾衰竭
- C. 肾前性肾衰竭
- D. 肾后性肾衰竭
- E. 双侧肾小球坏死

42. 患者,男,15岁,1年来逐渐出现性格古怪,不敢吃猪肝,说“吃了猪肝自己会变成猪”,自称“大脑神经细胞被人偷窃了”,入院后诊断为精神分裂症。其症状为

- A. 妄想
- B. 思维扩散

C.语词新作

D.病理性抽象思维

E.逻辑倒错思维

43.患者,女,56岁,受教育程度为小学水平,诊断为原发性高血压,护士指导其服用降压药后应防止直立性低血压,以下不正确的是

A.感觉头晕时加量服药

B.不宜做剧烈运动

C.体位变换时应缓慢

D.2小时内不宜盆浴

E.感觉头晕时卧床休息

44.患者,女,双手、双前臂、右上臂和前胸3手掌面积的烫伤,创面可见较大水疱,疱壁较薄,疼痛较剧烈。其烫伤面积估计为

A.13.5%

B.15.5%

C.17.5%

D.19.5%

E.21.5%

45.患者,男,24岁,因外伤急诊入院。入院当晚出现DIC,遵医嘱予以肝素抗凝治疗后3P转为阴性,但患者伤口及注射部位出现渗血,血尿。最可能的原因是

A.并发肾栓塞

B.再发DIC

C.肝素用量不足

D.肝素过量

E.并发多脏器功能衰竭

46.患者,女,33岁,产后30天出现左侧乳房疼痛,全身畏寒、发热、脉快。体检:左侧乳房皮肤红肿明显,可扪及一压痛性硬块。护士应告知患者预防该病的关键在于

A.避免乳汁淤积

B.防止乳房皮肤破损

C.保持乳房皮肤清洁

D.尽量采用人工喂养

E.预防性使用抗生素

47.患者,男,68岁,近1周来出现消化不良,到社区卫生服务中心咨询护士消化不良的原因。护士的解释不正确的是

A.吞咽功能下降

B.胃收缩力降低

C.牙体变硬,咀嚼能力下降

D.胃液、胆汁和胰液分泌减少

E.食管括约肌张力增强,影响消化

48.患者,男,38岁,腹股沟斜疝行无张力疝修补术,术后第1天护士对该患者进行术后指导,正确的是

A.限制患肢活动

B.指导下床进行室内活动

C.局部切口给予沙袋压迫

D.嘱禁食

E.嘱禁饮

49.患者,女,48岁,有多次分娩史。半年来,咳嗽及下楼梯时常出现尿失禁症状。该患者尿失禁为

A.真性尿失禁

B.充盈性尿失禁

C.容量性尿失禁

D.压力性尿失禁

E.急迫性尿失禁

50.患者,女,22岁,平素体健,3天前受凉后出现打喷嚏、流鼻涕、喉痛,查体:T38.2℃,P88次/分,R22次/分,诊断为急性上呼吸道感染,以下哪项措施是错误的

A.含服消炎喉片

B.立即应用抗生素

C.应用解热镇痛剂

D.早期应用抗病毒药

E.嘱患者适当休息,多饮水

51.患者,男,61岁,近5个月来时有腹胀,大便带黏液,大便次数增加,每日2~3次,无排便不尽及里急后重感,发病以来,患者体重减轻6kg,睡眠欠佳。针对该患者的术前准备,以下护理措施哪项是错误的

- A.从胃管注入高渗平衡溶液清洁肠道
- B.生命体征平稳可取半坐卧位
- C.合理输液并记录出入量
- D.胃肠减压
- E.禁食

52.张某,男,15岁,频繁遗精。护士对其进行健康教育,不正确的是

- A.合理安排学习生活
- B.临睡前多喝水
- C.保持外阴清洁
- D.内裤不宜过紧
- E.睡觉时宜侧卧

53.患者,女,51岁,风心病二尖瓣狭窄并关闭不全20年,房颤4年。无高血压及高脂血症病史。3小时前在家做饭时突然跌倒在地伴失语,最可能的原因是

- A.脑血栓
- B.脑栓塞
- C.脑动脉硬化
- D.脑血肿
- E.脑出血

54.患者,女,诊断为系统性红斑狼疮,病史2年,近日体温升高,关节红肿有压痛,出现面部红斑、蛋白尿而入院治疗,下列处理措施不正确的是

- A.忌食无花果、芹菜、香菜等
- B.避免阳光照射
- C.卧床休息
- D.破损处用洗面奶洗脸
- E.维持激素治疗

55.患者,男,17岁,家人诉其两年来逐渐变得少语少动,不与人交往,孤僻离群,对亲人冷淡,不讲究个人卫生,常独自发笑发呆。诊断为精神分裂症。患者目前最主要的护理问题是

- A.社会交往障碍
- B.睡眠型态紊乱
- C.身体形象障碍

- D.有暴力行为的危险
- E.营养失调:低于机体需要量

56.患者,男,27岁,癫痫病史2年。连日加班后突发神志丧失,全身肌肉持续收缩,继而四肢抽搐,持续30分钟,发作后意识一直未恢复,来院后又有一次四肢抽搐发作。该患者发作类型属于

- A.失神发作
- B.癫痫持续状态
- C.单纯部分性发作
- D.强直阵挛性发作
- E.复杂部分性发作

57.患者,女,27岁,发热3天,同时伴有乏力、腹痛,出现无痛性肉眼血尿。查体:体温38℃,脊肋角及输尿管压痛阳性,尿白细胞10~15个/高倍镜,其原因是

- A.肾结石
- B.上呼吸道感染
- C.肾盂肾炎
- D.膀胱炎
- E.肾小球肾炎

58.患儿,女,6个月,以高热、惊厥起病,出现剧烈呕吐,烦躁不安等表现,结核菌素试验阳性,诊断:结核性脑膜炎。其脑膜刺激征主要以哪种表现为主

- A.前囟饱满
- B.颈项强直
- C.凯尔尼格征
- D.面神经瘫痪
- E.布鲁津斯基征

59.患者,女性,34岁,因甲状腺功能亢进进行甲状腺大部切除术,术后1天,患者出现面部麻木,有强直感,遵医嘱予口服钙剂治疗。患者家属为其准备了以下食物,请问哪项是允许摄入的

- A.冰激凌
- B.瘦肉汤
- C.牛奶

- D.蛋汤  
E.咖啡

60.患者,男,72岁,排尿困难10年,尿线细,射程短,排尿时间延长。一天前突发不能自行排尿,下腹区胀痛难忍,应先行

- A.导尿  
B.理疗  
C.针刺  
D.输液抗感染  
E.前列腺切除术

61.新生儿,男,胎龄34周出生,出生体重2.3kg,身长46cm,皮肤薄嫩,胎毛多,乳晕不清,足底纹少,睾丸未降。该新生儿属于下列哪种情况

- A.早产儿  
B.足月儿  
C.足月小样儿  
D.小于胎龄儿  
E.低出生体重儿

62.患者,女,57岁,3个月前于洗澡时发现左侧乳房有一小指头大小的无痛性肿块,近1个月来肿块逐渐增大,且皮肤呈橘皮样变化,其原因主要是

- A.癌肿侵犯乳管  
B.癌肿与胸肌粘连  
C.癌肿与皮肤粘连  
D.癌细胞堵塞皮下淋巴管  
E.癌细胞侵犯乳房Cooper韧带

63.患者,女,52岁,患慢性粒细胞白血病半年,不慎摔倒撞击腹部后出现剧烈腹痛,腹壁紧张,拒按,伴面色苍白、出冷汗、手脚冰冷,最可能的原因是

- A.并发感染性腹膜炎  
B.慢性粒细胞白血病急性病变  
C.白血病细胞浸润腹膜  
D.胃穿孔出血  
E.脾破裂出血

64.患者,男,64岁,因颈椎病予颈椎前

路手术,术后21小时,患者出现呼吸困难,颈部皮肤明显肿胀,张力高,最首要的处理措施是

- A.拆开缝线,切口敞开引流  
B.立即给予气管切开  
C.密切观察呼吸情况  
D.加大引流管负压  
E.吸痰

65.患者,女,67岁,肝炎后肝硬化,水肿明显,大量腹水,医嘱给予放腹水治疗。下列关于腹腔穿刺放腹水的护理措施,不合理的是

- A.腹水立即弃去  
B.术前测量生命征  
C.术前嘱患者排空膀胱  
D.术中及术后观察有无不适  
E.术毕用腹带缚紧腹部

66.患者,男,75岁,慢性肾衰竭尿毒症期,近2天来主诉皮肤瘙痒,以下护理措施不恰当的是

- A.勤用肥皂洗澡  
B.经常更换衣服  
C.可用温水擦浴  
D.控制含磷食物的摄入  
E.可以涂用乳化剂油

67.患者,女,41岁,因咳嗽,伴间断腹泻,近段时间明显消瘦,查血清HIV阳性,诊断艾滋病,给予三种抗病毒药联合治疗的主要作用是

- A.改善症状  
B.减少副作用  
C.预防感染  
D.避免产生耐药性  
E.提高用药依从性

68.患者,男,43岁,诊断为躁郁症。住院时觉得自己精力旺盛,所以到每位病友的房间找人聊天或站在桌上对着病友大声发表言论,面对这些情形,以下护理措施最恰

当的是

- A. 提醒患者病房的规章制度
- B. 安排患者打扫病房的卫生,完成后给予鼓励
- C. 给予大声批评和训斥
- D. 安排患者与另一位病友进行投篮比赛,以发泄其精力
- E. 告诉患者如果他再不从桌子上下来,只好让他进隔离室

69. 患者,女,32岁,因疲乏无力、多汗怕热、爱发脾气、体重减轻,诊断为甲状腺功能亢进。护士为其进行饮食指导时,应告诉患者避免食用

- A. 含碘丰富的食物
- B. 低纤维素食物
- C. 富含钾、钙的食物
- D. 豆腐、豆浆等豆制品
- E. 高热量、高蛋白食物

70. 患儿,女,8岁,因“少尿、水肿3天”入院。患儿3天前出现尿量减少,每日2~3次,每次约100mL,浓茶色,同时伴有眼睑水肿,以晨起较为明显,后加重至全身。该患儿早期最重要的护理措施是

- A. 止血
- B. 利尿
- C. 卧床休息
- D. 低蛋白饮食
- E. 预防感染

71. 患者,男,31岁,左小腿刀割伤6.5小时,伤口约5cm,伤口正确的处理方法是

- A. 立即用胶布黏合伤口
- B. 立即用消毒敷料包扎
- C. 局部应用抗菌药和止血剂
- D. 伤口表面放消炎粉
- E. 伤口彻底清创缝合后包扎

72. 患者,女,47岁,下肢静脉曲张手术后,下列关于弹力绷带的使用不妥的是

- A. 为防止静脉剥脱部位出血,使用期间

严禁松开弹力绷带

- B. 术后立即使用弹力绷带
- C. 弹力绷带自足背向大腿方向加压包扎

- D. 患者下床活动时仍需使用弹力绷带

- E. 维持弹力绷带包扎2周左右

73. 患者,女,45岁,烧伤面积60%,伤后11小时入院,转送途中输液1500mL,入院测血压80/50mmHg,尿量为每小时20mL,中心静脉压0.4kPa(4cmH<sub>2</sub>O)。提示该患者有

- A. 血容量不足
- B. 心功能不全
- C. 肺功能不全
- D. 肾功能不全
- E. 补液过量

74. 患者,男,39岁,车祸后T<sub>4</sub>~T<sub>5</sub>骨折,合并脱位。以下哪项不是该患者卧床期间容易合并的并发症

- A. 压疮
- B. 泌尿系感染
- C. 缺血性骨坏死和缺血性肌挛缩
- D. 关节僵硬
- E. 便秘

75. 患者,男,48岁,因“急性阑尾炎”行保守治疗。第3天出现肝区疼痛,体温高达39.2℃,B超确诊为肝脓肿,请问该患者的感染途径为

- A. 经门静脉感染
- B. 经肝动脉感染
- C. 经胆道感染
- D. 透过肠壁蔓延感染
- E. 经淋巴系统感染

76. 患者,男,40岁,排便后肛门处剧烈疼痛。于肛门口见一椭圆形肿块,有明显触痛,应首先考虑为

- A. 肛周脓肿
- B. 前哨痔

- C. 血栓性外痔  
D. 直肠息肉脱出  
E. 内痔脱出嵌顿

77. 孕妇, 27岁, 本人是双胎, 孕28周, 近来感觉胃部受压、胀满且食欲下降, 若考虑双胎, 还可能出现的临床表现是

二、以下提供若干案例, 每个案例下设若干个考题。请根据各考题题干所提供的信息, 在每题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应字母所属方框涂黑。

(78~79题共用题干)

孕妇, 32岁, 妊娠35周, 四步触诊结果为宫底部是圆、硬有浮球感的胎儿部分, 耻骨联合上方是软而宽, 形态不规则的胎儿部分, 腹部左侧平坦饱满, 右侧高低不平。

78. 请判断其胎方位

- A. LOA  
B. ROA  
C. LMA  
D. RSA  
E. LSA

79. 应在腹部的哪个位置为该孕妇听诊胎心音最清楚

- A. 脐周  
B. 脐左上方  
C. 脐左下方  
D. 脐右上方  
E. 脐右下方

(80~82题共用题干)

患者, 女, 63岁, 情绪激动时出现剧烈头痛、呕吐, 继之昏迷, 体温36.9℃, 血压220/120 mmHg, 既往有高血压病史近10年。查体: 右侧上、下肢软瘫, 考虑为脑出血。

80. 患者的儿子询问护士, 为了明确诊断应该先做哪项检查, 护士的回答是

- A. 颅脑CT  
B. 颅脑MRI  
C. 腰椎穿刺  
D. 脑血管造影  
E. 脑超声检查

- A. 因孕周小, 腹部只能触到一个胎头  
B. 两个胎心速率相差每分钟>6次  
C. 腹部可触及多个肢体和胎臀  
D. 腹部不同部位可听到两个胎心  
E. 宫底高度一般等同于正常孕周

81. 本病急性期主要威胁患者生命的是

- A. 肺部感染  
B. 消化性出血  
C. 电解质紊乱  
D. 脑水肿并发脑疝  
E. 下肢深静脉血栓形成
82. 急性期护理措施哪项是错误的
- A. 保持呼吸道通畅  
B. 鼓励家属及朋友多探视, 帮忙、安慰患者  
C. 严密观察神志、瞳孔、生命体征变化  
D. 作好生活护理  
E. 绝对卧床休息

(83~85题共用题干)

患者, 女, 28岁, 被公司解聘后, 近几个月来出现语无伦次、怪异行为、房门及窗户贴满符咒、口中念念有词, 由其母亲陪同入院, 患者诊断为精神分裂症。

83. 护士与患者会谈时, 患者表现极为焦虑、坐立不安, 不时地东张西望, 说话也压低音量, 护士正确的做法是

- A. 以正常音调向患者说明他现在所处的地点, 并说明在这里他很安全  
B. 和患者一样尽量压低声音与之会谈  
C. 保持沉默  
D. 立即用纸笔记录患者的反应  
E. 终止会谈, 以保障患者的安全感

84. 患者表示“我被解聘是一项阴谋, 有人要害我”, 针对患者的陈述, 护士正确的做法或说法是

- A. 没有此事,你想的太不实际了
- B. 你觉得是谁要陷害你
- C. 据我所知,没有人要害您
- D. 倾听患者的陈述,不予评论
- E. 制止患者的陈述,并批评患者

85.患者有强烈的被害妄想,拒绝服药,下列护理措施最恰当的是

A. 以渐进的方法建立信赖的人际关系  
后再劝其服药

B. 使用水剂口服液,滴于患者的食物或  
饮料中服用

- C. 请医师来协助给药
- D. 顺从患者
- E. 制服患者,强迫给药

(86~88题共用题干)

患儿,女,8个月,体重7.5kg,腹泻2天,每天10余次,精神萎靡,皮肤弹性差,口腔黏膜干燥,前囟眼窝明显凹陷,尿量少。血生化检查:血钾3.0mmol/L,血钠135mmol/L。

86.判断该患儿脱水程度为

- A. 无脱水
- B. 轻度脱水
- C. 中度脱水
- D. 重度脱水
- E. 极重度脱水

87.估计该患儿丢失累积损失量为

- A. 30~50mL/kg
- B. 50~100mL/kg
- C. 100~120mL/kg
- D. 120~150mL/kg
- E. 150~180mL/kg

88.该患儿脱水的性质是

- A. 等渗脱水
- B. 低渗脱水
- C. 高渗脱水
- D. 极高渗脱水
- E. 极低渗脱水

(89~91题共用题干)

患者,男,66岁,肝硬化门脉高压。住院

期间出现大量腹腔积液,神志模糊,贫血、巩膜轻度黄染。

89.该患者饮食中合理的蛋白质供应量是

- A. 25g
- B. 50g
- C. 75g
- D. 100g
- E. 暂时不给蛋白质

90.该患者宜采取的体位是

- A. 半卧位
- B. 平卧位
- C. 侧卧位
- D. 坐位
- E. 头高足低位

91.该患者每日的进水量应控制在

- A. 300mL
- B. 500mL
- C. 800mL
- D. 1000mL
- E. 1500mL

(92~94题共用题干)

患儿,男,7岁,左足底被铁锈钉刺伤8天,突然出现张口困难,继之出现苦笑面容,角弓反张,声响及触碰患者可诱发上述症状,患者神志清楚,不发热。

92.该病致病菌属于

- A. 革兰染色阴性变形杆菌
- B. 革兰染色阴性大肠埃希菌
- C. 革兰染色阴性厌氧拟杆菌
- D. 革兰染色阳性厌氧芽胞杆菌
- E. 革兰染色阳性梭形芽胞杆菌

93.该病属于

- A. 菌血症
- B. 败血症
- C. 脓血症
- D. 脓毒血症
- E. 毒血症

94.该病对机体构成的最大威胁是

- A. 营养障碍
  - B. 肌肉断裂
  - C. 骨折
  - D. 尿潴留
  - E. 持续的呼吸肌痉挛
- (95~96题共用题干)

患者，男，34岁，在屋内使用火盆烤火时昏迷在屋内，被家人发现后送至医院，查血液碳氧血红蛋白实验呈阳性，诊断为一氧化碳中毒。

95.下列一氧化碳中毒急救措施哪项是错误的

- A. 给予高压氧治疗
- B. 迅速脱离中毒现场
- C. 高流量给氧
- D. 防止脑水肿的发生
- E. 持续低流量吸氧

96.护士建议患者留院观察和休息2周，主要是考虑可能发生的并发症是

- A. 昏迷
- B. 肺水肿
- C. 脑水肿
- D. 迟发性脑病
- E. 水、电解质紊乱

(97~99题共用题干)

男婴，母乳喂养，发育正常，体重8kg，身高72cm，家长述小儿会独坐很久，会爬，会扶着栏杆站起来，会拍手，能重复大人所发简单音节。

97.根据该男婴发育情况，估计其年龄为

- A. 4个月
- B. 6个月
- C. 8个月
- D. 10个月
- E. 1岁

98.根据儿童计划免疫程序，该婴儿此时应接种的疫苗是

- A. 脊灰疫苗
- B. 麻疹疫苗

- C. 乙肝疫苗
- D. 乙脑灭活疫苗
- E. 百白破疫苗

99.该婴儿的保健重点是

- A. 体格锻炼
- B. 预防感染
- C. 防止意外
- D. 合理喂养
- E. 培养自理能力

(100~102题共用题干)

患者，男，47岁，胃溃疡史8年。近1个月来上腹不适、疼痛、反酸、嗳气等症状明显加重，体重下降3kg。经胃镜检查确诊为胃癌，拟行胃大部切除术。

100.术后第1天，下列护理措施哪项是错误的

- A. 禁食
- B. 鼓励患者于床边活动
- C. 记录24小时出入量
- D. 重点观察有无术后出血
- E. 血压平稳予以低半卧位

101.若该患者拔除胃管进食后20分钟出现面色苍白、头晕、恶心、呕吐，护士应考虑该患者可能并发了

- A. 输入袢梗阻
- B. 输出袢梗阻
- C. 吻合口梗阻
- D. 早期倾倒综合征
- E. 晚期倾倒综合征

102.该患者手术后恢复良好，予以出院，下列健康教育哪项是错误的

- A. 禁食腌制食物
- B. 若有腹部不适随时复查
- C. 尽量多参加体育锻炼
- D. 术后3~5年，每半年复查一次
- E. 术后3年内每3~6个月复查一次

(103~106题共用题干)

患者，男，47岁，十二指肠溃疡病史5年余。以“间断上腹痛3年，腹胀、呕吐20天”

为主诉入院。20天前食辛辣食物后出现上腹不适、恶心，进食后加重，腹胀逐渐加重并出现呕吐，非喷射性，量多，为胃内容物，有隔夜宿食，呕吐后腹胀可缓解。

103.该患者最可能出现了

- A.癌变
- B.感染
- C.出血
- D.幽门梗阻
- E.肠梗阻

104.为进一步明确诊断，下列哪项措施最适宜

- A.血常规
- B.胃镜
- C.大便隐血
- D.腹部平片
- E.粪便常规

105.该病最常见的病因为

- A.乙醇
- B.吸烟
- C.自身免疫
- D.化学损伤
- E.幽门螺杆菌感染

106.下列护理措施不恰当的是

- A.禁水
- B.禁食
- C.置三腔二囊管
- D.全胃肠外营养
- E.持续胃肠减压

(107~110题共用题干)

患者，男，47岁，体型肥胖，2小时前运动中出现心前区剧痛，并向左手臂放射，伴有恶心，急诊入院，心电监护示II导联ST段弓背状抬高，T波倒置。

107.该患者最可能的原因是

- A.急性胰腺炎
- B.稳定型心绞痛
- C.急性心包填塞
- D.急性心肌梗死

E.急性胃炎

108.该患者目前宜首选的辅助检查是

- A.胸部CT
- B.腹部B超
- C.心脏彩超
- D.急诊胃镜
- E.12导联心电图

109.该患者适宜的给氧流量为

- A.1~2 L/min
- B.3~4 L/min
- C.5~6 L/min
- D.6~8 L/min
- E.酒精湿化给氧

110.入院后经治疗疼痛缓解，但患者烦躁不安、大汗、皮肤湿冷，血压80/50 mmHg，心率115次/分，尿量20 mL/h，该患者最可能出现了

- A.心律失常
- B.心源性休克
- C.急性肾衰竭
- D.心脏破裂
- E.急性心力衰竭

(111~114题共用题干)

患者，女，21岁，患有风湿性心脏病瓣膜病，临床诊断为联合瓣膜病变，二尖瓣狭窄伴主动脉瓣关闭不全。

111.为明确病情严重程度，患者最重要的辅助检查是

- A.超声多普勒
- B.超声心动图
- C.心电图
- D.血液生化全套
- E.冠状动脉造影

112.患者近来因肺部感染出现心力衰竭，提示发生右心衰竭的是

- A.口唇发绀
- B.下肢凹陷性水肿
- C.夜间不能平卧
- D.呼吸费力

E. 颈动脉搏动显著

113. 住院期间,受凉后并发肺部感染,患者卧床时亦表现有明显心悸、气短、不能平卧,其心功能评估为

- A. I 级
- B. II 级
- C. III 级
- D. IV 级
- E. V 级

114. 此时患者宜

- A. 劳逸结合,避免过度劳累
- B. 从事轻体力活动
- C. 绝对卧床休息
- D. 卧床休息,生活自理
- E. 减少活动,增加睡眠时间

(115~118 题共用题干)

患者,女,57岁,主诉阴道口脱出肿物1年,休息时能自动还纳,近10天来,大笑、咳嗽时有小便流出,伴尿频,每次解尿量不多。妇科检查:会阴Ⅱ度陈旧性裂伤,阴道前壁有膨出,宫颈已脱出于阴道外,子宫正常大小,两侧附件未触及。

115. 患者属于子宫脱垂的哪种程度

- A. 子宫脱垂I度重型
- B. 子宫脱垂III度轻型
- C. 子宫脱垂III度重型
- D. 子宫脱垂II度重型
- E. 子宫脱垂II度轻型

116. 如采用非手术治疗,以下护理措施项不正确

- A. 每日阴道冲洗后用手将脱垂的子宫还纳于阴道内
- B. 指导患者每日缩肛练习3次,每次10~15分钟
- C. 外阴及阴道局部用己烯雌酚涂抹增加局部张力
- D. 每日用1:5 000高锰酸钾溶液坐浴保持局部清洁

E. 教会患者子宫托的放取方法和上托后随访的必要性

117. 拟行阴式子宫全切及阴道前后壁修补术,术前护理措施哪项不正确

- A. 给予阴道灌洗,每天1次
- B. 术前1天无渣半流质饮食
- C. 术前晚及术日晨清洁灌肠
- D. 缓解患者的紧张焦虑情绪
- E. 遵医嘱行阴道及宫颈上药

118. 下列术后护理措施正确的是

- A. 术后禁食3~5天
- B. 术后24小时改半卧位
- C. 术后留置尿管10~14天
- D. 术后第6天服缓泻剂防便秘
- E. 术后3~5天进食少量流食

(119~120题共用题干)

患儿,男,4岁,自生后5个月起出现青紫并逐渐加重,喜蹲踞。查体:心前区略隆起,胸骨左缘第2~4肋间听到Ⅱ~Ⅲ级柔和喷射性收缩期杂音,肺动脉瓣第二心音减弱,四肢活动正常,末端可见发绀及杵状指(趾)。

119. 患儿最可能的原因是

- A. 法洛四联症
- B. 肺动脉狭窄
- C. 动脉导管未闭
- D. 室间隔缺损
- E. 房间隔缺损

120. 该患儿在查体时因哭闹出现突然晕厥,面色青紫,经按压人中后清醒过来,家长咨询护士出现晕厥的原因,护士的正确解释是

- A. 脑血栓形成
- B. 左心负荷过重
- C. 脑供血不足
- D. 肺动脉漏斗部痉挛
- E. 肺静脉压突然升高

# 参考答案

## 实践能力

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	C	A	C	E	E	C	D	A	B
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	A	A	E	D	B	C	E	D	C
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
C	A	A	B	B	D	B	A	E	B
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
A	C	B	C	D	B	D	C	B	B
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
C	E	A	C	D	A	E	B	D	B
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
A	B	B	D	A	B	C	A	A	A
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
A	D	E	A	A	A	D	B	A	C
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
E	A	A	C	A	C	D	E	B	A
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
D	B	A	D	B	C	B	A	E	A
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
D	D	E	E	E	D	C	B	D	B
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
D	C	D	B	E	C	D	E	B	B
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
B	B	D	C	E	A	B	C	A	D