

2021 年 5 月临床执业医师月度考试（第三单元）

- 1、（A1 型选择题）下列临床表现与急性肾小球肾炎不符合的是
- A.链球菌感染后两周出现血尿、蛋白尿
 - B.病程中出现 C3 下降
 - C.高血压持续 2 个月以上
 - D.可并发心力衰竭
 - E.部分患者要有 ASO 水平升高
- 2、（A1 型选择题）疏松结缔组织的弥漫性化脓性炎症属于
- A.肉芽肿
 - B.浆液性炎
 - C.卡他性炎
 - D.蜂窝织炎
 - E.纤维素性炎
- 3、（A1 型选择题）体内脂肪大量动员时，肝内乙酰 CoA 主要生成的物质是
- A.胆固醇

B.酮体

C.葡萄糖

D.脂肪酸

E.二氧化碳和水

4、(A1 型选择题) 血中补体水平下降一般不见于

A.急进性肾小球肾炎

B.膜性肾病

C.系膜增生性肾小球肾炎

D.狼疮肾炎

E.急性肾小球肾炎

5、(A1 型选择题) 慢性肾衰竭失代偿期是指 GFR (肾小球滤过) 的范围

A. >25ml/分

B. 25~50ml/分

C. 50~60ml/分

D. 60~70ml/分

E. 70~80ml/分

6、（A1 型选择题）最常出现 ANCA（中性粒细胞胞浆抗体）阳性的肾病是

- A.急进性肾小球肾炎
- B.急性肾小球肾炎
- C.狼疮肾炎
- D.急性间质性肾炎
- E.急性肾小管坏死

7、（A1 型选择题）老年人无痛性肉眼血尿，首先应考虑为

- A.泌尿系肿瘤
- B.泌尿系畸形
- C.泌尿系感染
- D.泌尿系结石
- E.泌尿系结核

8、（A1 型选择题）口服铁剂治疗有效的缺铁性贫血者，下列化验最先上升的是

- A.网织红细胞
- B.血红蛋白

C.MCV

D.MCH

E.MCHC

9、（A1 型选择题）下列可出现原位溶血的疾病是

A.遗传性球形细胞增多症

B.G6PD 缺乏症

C.骨髓增生异常综合征

D.异常血红蛋白病

E.阵发性睡眠性血红蛋白尿

10、（A1 型选择题）高钾血症常见的临床表现是

A.心动过缓

B.肠蠕动消失

C.四肢肌张力增强

D.便秘

E.心动过速

11、（A1 型选择题）Felty 综合征引起的中性粒细胞减少的最可能机制是

- A.生成减少
- B.成熟障碍
- C.免疫性破坏过多
- D.非免疫性破坏过多
- E.分布异常

12、（A1 型选择题）鹿角形肾结石引起泌尿道的病理生理改变，最严重的后果是

- A.尿路梗阻
- B.尿路感染
- C.尿路上皮恶变
- D.肾积水
- E.尿毒症

13、（A1 型选择题）引起尖锐湿疣的病原体是

- A.人免疫缺陷病毒
- B.人乳头瘤病毒
- C.EB 病毒

D.水痘-带状疱疹病毒

E.巨细胞病毒

14、（A1 型选择题）血管紧张素转换酶抑制剂最适用的临床情况是

A.高血压伴主动脉瓣狭窄

B.妊娠期高血压

C.高血压伴左心室肥厚

D.高血压伴高血钾血症

E.高血压伴双侧肾动脉狭窄

15、（A1 型选择题）有关肛裂的描述，正确的是

A.老年人发病率高

B.常伴发大出血

C.最常见于膝胸位肛门 12 点处

D.应以手术治疗为主

E.多因慢性腹泻发生

16、（A1 型选择题）肾癌典型的临床表现是

A.消瘦、肿块和疼痛

B.高血压、肿块和疼痛

C.血尿、肿块和疼痛

D.发热、肿块和疼痛

E.水肿、肿块和疼痛

17、（A1 型选择题）急性肾小球肾炎的主要临床表现是

A.少尿，水肿，蛋白尿，低蛋白血症

B.血尿,蛋白尿，水肿，低蛋白血症

C.水肿，蛋白尿，血尿，高血压

D.血尿，少尿，水肿，尿白尿

E.水肿，少尿，蛋白尿，高血压

18、（A1 型选择题）急性肾功能衰竭少尿期结束的标志是指 24 小时尿量至少增加至

A.250ml

B.300ml

C.350ml

D.400ml

E.500ml

19、（A1 型选择题）肾病综合征最重要的诊断依据是

- A.24 小时尿蛋白>3.5g，血浆白蛋白
- B.血浆白蛋白
- C.24 小时尿蛋白>3.5g，双下肢凹陷性浮肿
- D.24 小时尿蛋白>3.5g，血胆固醇及甘油三酯升高
- E.血胆固醇及甘油三酯升高，双下肢凹陷性浮肿

20、（A1 型选择题）有关铁的描述，正确的是

- A.食物中的铁以二价铁为主
- B.肠黏膜吸收的铁为二价铁
- C.转铁蛋白结合的铁为二价铁
- D.体内铁蛋白中结合的铁为二价铁
- E.血红蛋白中为三价铁

21、（A1 型选择题）不支持慢性粒细胞白血病加速期的是

- A.外周血中原始粒细胞大于等于 5%
- B.骨髓中原始粒细胞大于等于 10%

C.外周血嗜碱性粒细胞大于 20%

D.不明原因的血小板进行性减少

E.不明原因的血小板进行性增加

22、（A1 型选择题）能同时启动内源和外源性凝血途径引起 DIC 的是

A.羊水栓塞

B.急性早幼粒细胞白血病

C.广泛创伤

D.大型手术

E.严重感染

23、（A1 型选择题）下列属于 T 细胞淋巴瘤的是

A.边缘区淋巴瘤

B.滤泡性淋巴瘤

C.套细胞淋巴瘤

D.间变大细胞淋巴瘤

E.Burkitt 淋巴瘤

24、（A1 型选择题）提示心包积液的体征是

A.Musset 征

B.脉短绌

C.Ewart 征

D.Roth 斑

E.Duroziez 征

25、（A1 型选择题）不属于湿啰音特点的是

A.断续

B.短暂

C.连续多个

D.性质不变

E.部位易变

26、（A1 型选择题）上肢血压增高，且高于下肢血压，最可能的病因是

A.肾实质病变

B.肾动脉狭窄

C.嗜铬细胞瘤

D.原发性醛固酮增多症

E.主动脉缩窄

27、（A1 型选择题）高血压伴低钾血症应首先考虑

A.皮质醇增多症

B.原发性醛固酮增多症

C.嗜铬细胞瘤

D.肾实质性高血压

E.肾动脉狭窄

28、（A1 型选择题）具有典型 Whipple 三联征的疾病是

A.胰岛素瘤

B.胃泌素瘤

C.肠肽瘤

D.高血糖瘤

E.生长抑素瘤

29、（A1 型选择题）胃癌淋巴结转移的常见部位是

A.右锁骨上

B.左锁骨上

C.右颈部

D.左颈部

E.左颌下

30、（A1 型选择题）鉴别室速与阵发性室上速最有力的证据是

A.QRS 波群宽大畸形的程度

B.是否存在房室分离

C.心室率的快慢

D.静脉应用普罗帕酮是否可终止

E.对迷走神经刺激的反应

31、（A1 型选择题）对高血压合并糖尿病患者，血压控制在

A.130/80mmHg

B.130/85mmHg

C.135/85mmHg

D.140/90mmHg

E.150/90mmHg

32、（A1 型选择题）胸骨右缘第二肋间触及收缩期震颤，最常见于

- A.三尖瓣狭窄
- B.肺动脉瓣狭窄
- C.二尖瓣狭窄
- D.室间隔缺损
- E.主动脉瓣狭窄

33、（A1 型选择题）Child 肝功能分级依据，不包括

- A.血胆红素清值
- B.血清白蛋白值
- C.食管静脉曲张程度
- D.是否存在腹水及其程度
- E.营养状态

34、（A1 型选择题）急诊肝衰竭实验室检查一般不会出现的结果是

- A.转氨酶增高
- B.胆红素增高
- C.凝血酶原时间缩短
- D.血肌酐增高

E.纤维蛋白原减少

35、（A1 型选择题）血红素合成障碍所致的贫血

A.再生障碍性贫血

B.缺铁性贫血

C.巨幼细胞贫血

D.海洋性贫血

E.自身免疫性溶血性贫血

36、（A1 型选择题）口服铁剂治疗有效的缺铁性贫血者，下列化验最先上升的是

A.网织红细胞

B.血红蛋白

C.MCV

D.MCH

E.MCHC

37、（A1 型选择题）在 ITP 的免疫抑制治疗中，最常用的免疫抑制剂是

A.阿糖胞苷

- B. 长春新碱
- C. 柔红霉素
- D. 左旋门冬酰氨酶
- E. 足叶乙甙

38、（A1 型选择题）心电图上 I 和 aVL 导联出现急性心肌梗死的特异性改变，其梗死部位是心脏的

- A. 下壁
- B. 前壁
- C. 后壁
- D. 高侧壁
- E. 前间壁

39、（A1 型选择题）急性心肌梗死发病后 12 天血清检查仍可能高于正常的指标是

- A. 肌酸磷酸激酶的同工酶 CK-MB
- B. 天门冬氨酸基转移酶
- C. 肌钙蛋白 I

D.肌酸磷酸激酶

E.肌钙蛋白 T

40、（A1 型选择题）合并急性左心衰竭的阵发性室上性心动过速，最佳治疗是

A.静脉注射维拉帕米

B.Valsalva 动作

C.直流电复律

D.置入起搏器

E.射频消融

41、（A1 型选择题）如果肠系膜上动脉起始部发生血栓栓塞，造成血运障碍的所有肠段为

A.十二指肠、空肠、回肠

B.全部小肠和全部结肠

C.全部小肠，盲肠和升结肠

D.升结肠和横结肠

E.降结肠、乙状结肠和直肠

42、（A1 型选择题）肝脏 Glisson 纤维鞘内包裹的管道有

- A.门静脉、肝静脉、肝胆管
- B.门静脉、肝动脉、胆总管
- C.门静脉、肝动脉、肝静脉
- D.门静脉、肝动脉、肝胆管
- E.肝静脉、肝胆管、肝动脉

43、（A1 型选择题）克罗恩病的手术指征不包括

- A.肠内瘘
- B.慢性肠穿孔
- C.发热、腹痛、体重下降
- D.肠管狭窄
- E.持续出血

44、（A1 型选择题）休克病人治疗过程中中心静脉压为 20cmH₂O，血压 120/80mmHg，处理原则为

- A.适当补液
- B.收缩血管

C.舒张血管

D.补液试验

E.充分补液

45、（A1 型选择题）感染性休克手术治疗时机

A.即刻手术

B.短期抗休克治疗后

C.抗休克治疗无效时

D.感染灶局限化以后

E.感染灶即将破溃前

46、（A1 型选择题）脑复苏治疗重点是

A.降低大脑耗氧量

B.防治脑水肿

C.促进脑细胞功能恢复

D.降低脑细胞能量消耗

E.维持血压，保证脑部血液供应

47、（A1 型选择题）外科救治感染性休克时不正确的做法是

A.应用抗菌药物

B.补充血容量

C.待休克好转后手术处理感染灶

D.使用糖皮质激素

E.采用血管扩张药物治疗

48、（A1 型选择题）诱发破伤风全身肌肉痉挛不常见的因素是

A.光线

B.温度

C.声音

D.震动

E.碰触

49、（A1 型选择题）提示胸腔手术后内出血的指征是引流管中每小时引流出血液量持续超过

A.150ml

B.100ml

C.200ml

D.300ml

E.250ml

50、（A1 型选择题）枕骨大孔疝的临床表现不包括

A.昏迷

B.呕吐

C.颈项强直

D.双侧瞳孔大小多变

E.尿崩

51、（A1 型选择题）癫痫用药应遵循的原则是

A.按类型用药，联合用药、早期用药、小量起始

B.个体化治疗、尽量单药、早期用药、足量起始

C.按类型用药、联合用药、早期用药、长期治疗

D.个体化治疗、联合用药、早期用药、长期治疗

E.按类型用药、尽量单药、个体化治疗、足量起始

52、（A1 型选择题）属于良性肿瘤的是

A.视网膜母细胞瘤

B.软骨母细胞瘤

C.肾母细胞瘤

D.神经母细胞瘤

E.髓母细胞瘤

53、（A1 型选择题）颅内肿瘤非定位症状的是

A.头痛、视乳头水肿

B.癫痫、幻嗅

C.肢体运动和感觉障碍

D.视力、视野障碍

E.眼睑下垂、眼球运动障碍

54、（A1 型选择题）烧伤患者在早期口渴，最适饮下列哪种液体

A.大量冷开水

B.大量糖水

C.少量多次淡盐水

D.大量茶水

E.大量橘子水

55、（A1 型选择题）对重型肝炎的判断下列最重要的是

- A. ALT \gt 500U/L
- B. 总胆红素 \gt 171mmol/L
- C. PTA
- D. 电解质紊乱
- E. WBC 15×10^9 /L

56、（A1 型选择题）有关甲状腺手术后导致呼吸困难的原因，不包括

- A. 伤口内出血、压迫气管
- B. 双侧喉上神经损伤
- C. 双侧喉返神经损伤
- D. 急性喉头水肿
- E. 气管软化、塌陷

57、（A1 型选择题）关于甲亢手术治疗的适应证，不正确的是

- A. 高功能腺瘤
- B. 中度以上原发甲亢
- C. 甲状腺肿大有压迫症状

D.青少年患者

E.抗甲状腺药物或放射性 ^{131}I 治疗无效者

58、（A1 型选择题）腹外疝最重要的发病原因是

A.慢性咳嗽

B.长期便秘

C.排尿困难

D.腹壁有薄弱点或腹壁缺损

E.经常从事腹内压增高的工作

59、（A1 型选择题）在腹股沟管的解剖结构中，下列错误的是

A.内口为内环，外口为皮下环

B.上壁为腹外斜肌的弓状下缘

C.下壁为腹股沟韧带和陷窝韧带

D.前壁为腹外斜肌腱膜

E.后壁为腹横筋膜和腹膜

60、（A1 型选择题）血栓闭塞性脉管炎早期最主要的临床表现是

A.患肢萎缩

- B.足部及小腿酸痛
- C.间歇性跛行
- D.持续性神经系统症状
- E.肢端青紫

61、（A1 型选择题）对便血患者强调要作直肠指诊，其主要目的是

- A.排除肛瘘
- B.排除肛窦炎
- C.排除肿瘤
- D.诊断外痔
- E.诊断内痔

62、（A1 型选择题）胸腔闭式引流管应插入液面下

- A.1~2cm
- B.3~4cm
- C.5~6cm
- D.7~8cm
- E.10cm 以上

63、（A1 型选择题）胰头癌晚期出现持续性剧烈腹痛，向腰背部放射，是因为

- A. 胰管梗阻致管腔内压增高
- B. 肿瘤压迫胆管梗阻所致
- C. 肿瘤累及周围其他脏器
- D. 肿瘤增大膨胀胰腺被膜
- E. 肿瘤侵及腹腔神经丛

64、（A1 型选择题）伴有黄疸，肝功能不全的急性胆囊炎、胆石症患者不应进行的检查是

- A. 肝功能检查
- B. B 超检查
- C. 胸腹透视
- D. 经皮肝穿刺造影
- E. MRCP

65、（A1 型选择题）下列不是膝关节前后交叉韧带的检查项目的是

- A. 抽屉试验

B.侧方应力试验

C.轴移试验

D.Lachman 试验

E.MRI

66、（A1 型选择题）手外伤一般争取在什么时间内清创

A.0~12 小时

B.12~16 小时

C.6~8 小时

D.16~20 小时

E.20~24 小时

67、（A2 型选择题）男，50 岁，因外伤造成腰压缩性骨折合并截瘫，有吸烟史。骨折后一周出现体温升高最可能的原因是

A.骨折后血肿吸收热

B.泌尿系或呼吸道感染引起的发热

C.脊髓损伤造成中枢调节功能减弱

D.自主神经功能紊乱

E.脊髓损伤造成排汗障碍

68、（A1 型选择题）脊柱结核合并截瘫，下列处理不当的是

A.抗结核药物治疗

B.行病灶清除术

C.石膏外固定

D.高蛋白饮食

E.绝对卧床，禁止翻身

69、（A1 型选择题）Colles 骨折远端的典型移位是

A.向尺侧及背侧移位

B.向桡侧及背侧移位

C.向尺侧及掌侧移位

D.向桡侧及掌侧移位

E.向背侧成角移位

70、（A1 型选择题）左腕掌侧切割伤，小指和环指尺侧半感觉消失，夹纸试验阳性，可能损伤的神经是

A.尺神经

- B.正中神经
- C.桡神经
- D.前臂内侧皮神经
- E.前臂骨间背神经

71、（A1 型选择题）脊柱结核与脊柱转移性肿瘤的区别主要是

- A.为持续性疼痛，肿瘤为夜间疼痛
- B.X 线片表现:脊柱结核椎间隙消失，而肿瘤椎间隙正常
- C.结核血沉增快
- D.结核活动受限
- E.病变发生于脊柱的部位、节段不同

72、（A1 型选择题）出现咽下困难最早的是哪型食管癌

- A.髓质型
- B.溃疡型
- C.蕈伞型
- D.缩窄型
- E.混合型

73、（A1 型选择题）Beck 三联征是指

- A. 静脉压降低，心音微弱，动脉压降低
- B. 静脉压升高，心音减弱，动脉压降低
- C. 静脉压降低，心音有力，动脉压升高
- D. 静脉压升高，心音有力，动脉压升高
- E. 静脉压正常，心音正常，动脉压正常

74、（A1 型选择题）右三叉神经病损表现为

- A. 右面部痛温觉障碍，张口下颌偏向右侧
- B. 右面部痛温觉障碍，张口下颌偏向左侧
- C. 右面部痛温觉障碍，右闭目不能
- D. 右面部痛温觉障碍，左闭目不能
- E. 左面部痛温觉障碍，张口下颌偏向右侧

75、（A1 型选择题）骨折功能复位的标准下列错误的是

- A. 成人下肢骨折缩短不超过 1cm
- B. 长骨干骺端骨折对位 3/4 以上
- C. 儿童下肢骨折缩短移位不超过 2cm

D.长骨干横行骨折对位 1/3 以上

E.可有轻度侧方成角移位

76、（A1 型选择题）骨筋膜室综合征的晚期并发症是

A.缺血性骨坏死

B.肾功能衰竭

C.缺血性肌痉挛

D.不明原因发热

E.慢性骨髓炎

77、（A1 型选择题）下列属于良性骨肿瘤的 X 线表现的是

A.边缘清楚，通常无骨膜反应

B.日光放射状阴影

C.边缘不清楚，有明显的骨膜反应

D.可见 Codman 三角

E.呈多处虫蛀状

78、（A2 型选择题）男性，50 岁。因胃癌伴重度贫血入院，既往体健，无输血史，术前化验 Hb56g/L，为纠正贫血。下列最合适的输血治疗是

- A.输全血
- B.输浓缩红细胞
- C.输洗涤红细胞
- D.输去白细胞的红细胞
- E.输冷冻红细胞

79、（A2 型选择题）男性,50 岁。右侧腹股沟斜疝嵌顿 8 小时入院急诊手术中发现嵌顿入疝囊的回肠有约 5cm 坏死，行坏死回肠切除、肠吻合术。对伤口进行彻底清洗后，无明显炎症表现。疝处理应首选

- A.单纯疝囊高位结扎术
- B.Ferguson 法疝修补术
- C.Bassini 法疝修补术
- D.Halsted 法疝修补术
- E.无张力疝修补术

80、（A2 型选择题）女，40 岁，体重 50kg，胃大部切除术后 2 天， HCO_3^- 316mmol/L，输液时应首选

- A.5%葡萄糖氯化钠溶液
- B.含 5%碳酸氢钠 50ml 的葡萄糖溶液

C.含 5%碳酸氢钠 100ml 的葡萄糖溶液

D.含 5%碳酸氢钠 150ml 的葡萄糖溶液

E.含 5%碳酸氢钠 200ml 的葡萄糖溶液

81、（A2 型选择题）男，35 岁。车祸后双侧股骨干骨折。

BP160/90mmHg，中心静脉压 8cmH₂O,首选的处理措施是

A.大量输血

B.强心药治疗

C.糖皮质激素治疗

D.应用肾上腺素

E.补液治疗

82、（A2 型选择题）男性，45 岁。查体发现肝硬化 5 年。3 天前与朋友聚餐时出现呕血，鲜红色，量约 1000ml。患者出现头晕、心慌、出冷汗等。经输血、补液和应用止血药物治疗后病情好转，血压和心率恢复正常。1 天前出现睡眠障碍。并出现幻听和言语不清。化验检查示:血氨 130 μ g/dl，血糖

5.6mmol/L，尿素氮 7.2mmol/L，该患者最可能的诊断是

A.尿毒症

B.肝性脑病

C.乙型脑炎

D.糖尿病酮症酸中毒

E.脑血管意外

83、（A2 型选择题）男，18 岁，因固定性右下腹痛，18 小时急诊行阑尾切除术。术中证实为化脓性阑尾炎伴局限性坏疽。术后 6 小时，患者仍感腹痛，躁动不安，未解小便，查体：体温 38.2℃，血压 80/60mmHg，面色稍苍白，皮肤湿冷，心率 108 次/分，较弱，腹部稍胀，脐周及下腹压痛，轻度肌紧张，肠鸣音变弱，该患者目前应考虑最可能的情况是

A.肠麻痹，肠梗阻

B.腹腔内感染

C.急性尿潴留

D.阑尾残端瘘

E.腹腔内出血

84、（A2 型选择题）男性，50 岁，安徽人。因反复腹泻腹胀 6 个月，呕血伴黑便 2 天就诊。体检：肝肋下 2cm，脾肋下 4cm。血常规示嗜酸性粒细胞增多，三系下降。肝脏 B 超提示网状分隔样纤维化。首先考虑的诊断是

A.血吸虫肝硬化并发上消化道出血

B.乙肝肝硬化并发上消化道出血

- C.肝细胞肝癌并发上消化道出血
- D.门脉性肝硬化并发上消化道出血
- E.急性出血性胃炎

85、（A2 型选择题）男，8 岁额部多发性疖肿，不慎碰伤额部，致使局部红肿扩大，弛张型高热、头痛、恶心、烦躁，4 天后臀部皮下又发现一肿块，疼痛、压痛明显，且有波动感。诊断应考虑为

- A.菌血症
- B.败血症
- C.毒血症
- D.脓毒血症
- E.冷脓肿

86、（A2 型选择题）男性，51 岁，有溃疡病史 7 年。半年来上腹隐痛，无规律，进食后加重，钡餐检查示胃黏膜增粗，胃窦部见 0.3cm×0.3cm 阴影，胃蠕动正常。下列诊断首先考虑的是

- A.胃溃疡
- B.复合性溃疡
- C.胃溃疡恶变

D.胃溃疡合并幽门梗阻

E.胃溃疡但不排除恶变

87、（A2 型选择题）女性，35 岁，中上腹疼痛 8 小时，伴寒战高热 4 小时，以往曾因胆石症而行胆囊切除术。体格检查：体温 39.2℃，巩膜可疑黄染，腹平，中上腹压痛明显，轻度肌紧张及反跳痛，肝区叩痛明显。拟诊为

A.急性出血性坏死性胰腺炎

B.急性坏疽性阑尾炎

C.急性绞窄性肠梗阻

D.急性梗阻性化脓性胆管炎

E.急性消化性溃疡穿孔

88、（A2 型选择题）男，18 岁，右小腿中段伤口反复流脓，有时排出碎骨块 7 年。近 2 周高热，伤口流脓周围红肿。X 线片示胫骨上段增粗，可见死骨块，周围有新生骨，目前最佳治疗是

A.死骨摘除术

B.病灶清除+肌瓣填塞术

C.病灶清除+植骨

D.抗炎治疗

E.穿刺抽脓，药物注入

89、（A2 型选择题）男，20 岁。因交通事故头顶部可见直径 10cm 血肿，意识清楚，恶心、呕吐，急救处置时不恰当的措施是

A.血压、脉搏、呼吸检测

B.注意意识状态

C.穿刺抽吸头皮下血肿

D.给予镇静剂

E.给予脱水剂

90、（A2 型选择题）男，60 岁。因肝硬化一次排放腹水 3000ml 而无尿，诊断应首先考虑为

A.急性肝衰竭

B.急性心力衰竭

C.肾前性肾衰竭

D.肾后性肾衰竭

E.肾性肾衰竭

91、（A2 型选择题）女，17 岁。颈部肿大 1 年，无怕热、多食、易激动。查体：脉率、血压正常，甲状腺弥漫性肿大，质地柔软，未触及结节，表面光

滑。采用的最佳治疗措施是

- A. 多吃含碘丰富的食物
- B. 小剂量甲状腺素治疗
- C. 口服甲基硫氧嘧啶治疗
- D. 注射 ^{131}I 治疗
- E. 甲状腺大部切除术

92、（A2 型选择题）女，16 岁，四肢关节痛 6 个月，近 2 个月出现面颊部对称性红斑，有口腔溃疡反复发作，检查 WBC: $2.3 \times 10^9/\text{L}$ ，血沉：46mm/h，该患者的最可能诊断是

- A. 类风湿关节炎
- B. 系统性红斑狼疮
- C. 重叠综合征
- D. 白塞病
- E. 风湿性关节炎

93、（A2 型选择题）男，70 岁。右腹股沟区肿块 3 年，平卧消失。查体：右耻骨结节外上方有一半球形肿块，未进入阴囊，可用手回纳，压住腹股沟韧带中点上方咳嗽时仍可见肿块突出。最可能的诊断是

- A.股疝
- B.腹股沟斜疝
- C.腹股沟直疝
- D.精索鞘膜积液
- E.交通性鞘膜积液

94、（A2 型选择题）男，4 岁。近 3 个月发现右侧腹部有一肿物，增长迅速,行经腹肾切除术，病理为肾母细胞瘤。术后首选的辅助治疗方法是

- A.化学治疗
- B.放射治疗
- C.生物治疗
- D.基因、治疗
- E.中医药治疗

95、（A2 型选择题）男，35 岁。右下肢疼痛 1 年。让其抬高右下肢 80 度，1 分钟后下肢皮肤苍白，再让其下肢垂于床沿，大约 1 分钟后下肢皮肤颜色方恢复正常。该检查结果提示

- A.Buerger 试验阳性
- B.下肢静脉通畅度（Trendelenburg）试验阳性

C.大隐静脉瓣膜和小腿交通支静脉瓣膜功能（Perthes）试验阳性

D.Pratt 试验阳性

E.Lasegue 试验阳性

96、（A2 型选择题）男,60 岁。发现皮肤黄染、尿色变深伴皮肤瘙痒两周。查体:皮肤巩膜黄染,右上腹可触及无痛性圆形肿块,随呼吸上下活动。该肿块是

A.胆总管囊肿

B.肝脏囊肿

C.肿大胆囊

D.胰头癌

E.胆管癌

97、（A2 型选择题）女,40 岁,因宫颈癌接受化疗。近 3 天来常发生牙龈出血,血小板计数 $20 \times 10^9/L$ 。遂给予血小板输注,输注后 20 分钟,患者突然寒战、发热、恶心,体温 39.5°C ,血压正常,尿色正常。该患者很可能发生输血不良反应是

A.非溶血性发热性输血反应

B.溶血性输血反应

C.过敏反应

D.细菌污染反应

E.循环超负荷

98、（A2型选择题）男，46岁，因双眼睑及四肢无力入院。入院诊断：重症肌无力。决定给予血浆置换治疗。在血浆置换过程中，患者出现面部瘙痒、潮红，胸部及四肢出现少量荨麻疹。体检：体温 37.6°C ，血压 $115/65\text{mmHg}$ ，该患者可能出现的输血反应为

A.非溶血性发热性输血反应

B.细菌污染反应

C.过敏反应

D.溶血性输血反应

E.循环超负荷

99、（A2型选择题）男，35岁，因发热，咳嗽、头痛、腰痛4天，体温在 $39\sim 40^{\circ}\text{C}$ 之间。查体：面部潮红，眼球结膜水肿，软腭有网状充血和出血点。化验：血常规 $\text{WBC}12\times 10^9/\text{L}$ ，中性89%，血小板 $50\times 10^9/\text{L}$ ，尿常规除蛋白（+++）外余无异常。医生首先考虑的诊断是

A.急性上呼吸道感染

B.流行性感冒

- C.急性肾炎
- D.流行性出血热
- E.急性支气管炎

100、（A2 型选择题）30 岁女性，骑摩托车撞伤右髌部，经 X 线摄片确诊为右股骨颈头下型骨折，严重移位，闭合复位未成功，故行切开复位内固定术。发生哪种并发症的可能性最大

- A.脂肪栓塞
- B.坠积性肺炎
- C.急性骨萎缩
- D.关节强直
- E.缺血性骨坏死

101、（A2 型选择题）男性,40 岁，发热伴慢性腹泻 40 天，大便 3~5 次/日，暗红色，略带腥臭味，伴近 2 周来觉右上腹痛，体检:体温 39.5°C,消瘦，肝肋下 2cm，右腋前线第 7、8 肋间有明显压痛。外周血象：血红蛋白 100g/L，白细胞总数 $12 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞 0.86。胸部 X 线透视:右膈上升伴活动受限。超声波检查肝右叶外上方有一 3cm×4.5cm 大的液平段。肝穿刺抽出灰褐色脓液，细菌培养为革兰阴性杆菌。诊断最可能为

- A.细菌性肝脓肿

- B.阿米巴肝脓肿
- C.阿米巴肝脓肿继发细菌感染
- D.肝癌
- E.肝炎并发化脓性胆管炎

102、（A2 型选择题）患者 65 岁，晨起说话不流利，只能讲一两个简单的字，但能理解别人言语，也能理解书写的东西，然读出来有困难，病变应在优势半球

- A.颞上回后部
- B.颞中回后部
- C.顶叶角回
- D.额下回后部
- E.颞中及颞下回后部

103、（A2 型选择题）女性，30 岁，颈前肿块多年，近 1 个月来，肿块生长迅速，并出现声音嘶哑，颈前可触及 2cm×3cm 肿块，质地较硬，表面欠光滑。诊断首先考虑

- A.甲状舌骨囊肿
- B.结节性甲状腺肿单发结节

C. 甲状腺腺瘤囊内出血

D. 甲状腺癌

E. 慢性甲状腺炎

104、（A2 型选择题）男性,75 岁, 腹痛、腹胀、呕吐、肛门停止排便排气 2 天。全腹压痛明显, 腹部平片示肠管可见多处液平面。首先考虑为

A. 急性阑尾炎

B. 胃溃疡穿孔

C. 急性肠梗阻

D. 急性胰腺炎

E. 急性胆囊炎

105、（A2 型选择题）女, 45 岁, 疑胆总管结石行 ERCP 检查, 4 小时后剑突下出现持续性疼痛伴呕吐, 体检: 体温 38°C, 剑突下压痛, 无反跳痛及肌紧张, 最可能的诊断是

A. 急性十二指肠炎

B. 急性胆管炎

C. 急性胆囊炎

D. 急性胰腺炎

E.急性胃炎

106、（A2 型选择题）女性，10 岁，背痛、低热、盗汗 6 个月。查体：轻度贫血貌，胸腰部后凸畸形，棘突叩痛（+），拾物试验（+）。首选检查是

A.血沉

B.碱性磷酸酶

C.摄胸腰段脊柱 X 线片

D.血常规

E.肿瘤系列

107、（B1 型选择题）癫痫的复杂部分性发作的病损在

A.中央前回

B.锥体外系统

C.小脑

D.枕叶

E.颞叶

108、（B1 型选择题）帕金森病损在

A.中央前回

B.锥体外系统

C.小脑

D.枕叶

E.颞叶

109、（B1 型选择题）急进性肾小球肾炎病理类型

A.微小病变肾病

B.新月体性肾小球肾炎

C.硬化性肾小球肾炎

D.系膜增生性肾小球肾炎

E.毛细血管内增生性肾小球肾炎

110、（B1 型选择题）急性肾小球肾炎的病理类型

A.微小病变肾病

B.新月体性肾小球肾炎

C.硬化性肾小球肾炎

D.系膜增生性肾小球肾炎

E.毛细血管内增生性肾小球肾炎

111、（B1 型选择题）初发劳累性心绞痛是

- A. 劳累性心绞痛病程在 1 个月以内
- B. 劳累性心绞痛临床特点 1 个月以上无变化
- C. 同等程度劳累所诱发的胸痛发作次数增加、严重程度加重及持续时间延长
- D. 劳累性心绞痛病程在 3 个月以内
- E. 劳累性心绞痛临床特点 3 个月以上无变化根据 ISFC/WHO 对缺血性心脏病的分类

112、（B1 型选择题）恶化型劳累性心绞痛是

- A. 劳累性心绞痛病程在 1 个月以内
- B. 劳累性心绞痛临床特点 1 个月以上无变化
- C. 同等程度劳累所诱发的胸痛发作次数增加、严重程度加重及持续时间延长
- D. 劳累性心绞痛病程在 3 个月以内
- E. 劳累性心绞痛临床特点 3 个月以上无变化根据 ISFC/WHO 对缺血性心脏病的分类

113、（B1 型选择题）属于抗凝异常的实验室检查是

A.血 vWF 测定

B.PF3 有效性测定

C.血栓素 B2 测定

D.血 PC 测定

E.血 D-二聚体测定

114、（B1 型选择题）属于纤溶异常的实验室检查是

A.血 vWF 测定

B.PF3 有效性测定

C.血栓素 B2 测定

D.血 PC 测定

E.血 D-二聚体测定

115、（B1 型选择题）急性心肌梗死,肺部有湿啰音,但啰音范围小于 1/2 肺野,判断为

A.Killip I 级

B.Killip II 级

C.Killip III 级

D.NYHAⅡ级

E.NYHAⅣ级

116、（B1 型选择题）风湿性心脏病，休息时有心悸，呼吸困难或心绞痛，任何活动均可加重上述症状。判断为

A.KillipⅠ级

B.KillipⅡ级

C.KillipⅢ级

D.NYHAⅡ级

E.NYHAⅣ级

117、（B1 型选择题）与病毒性心肌炎有关的是

A.无正确选项

B.柯萨奇病毒 A 型

C.柯萨奇病毒 B 型

D.单纯疱疹病毒

E.人类疱疹病毒 6 型

118、（B1 型选择题）幼儿急诊的病原为

A.无正确选项

B.柯萨奇病毒 A 型

C.柯萨奇病毒 B 型

D.单纯疱疹病毒

E.人类疱疹病毒 6 型

119、（B1 型选择题）容易引起Ⅱ型呼吸衰竭加重的药物是

A.呼吸兴奋剂

B.袪利尿剂

C.强心剂

D.镇静剂

E.血管扩张剂

120、（B1 型选择题）在肺源性心脏病治疗中可引起碱中毒的药物是

A.呼吸兴奋剂

B.袪利尿剂

C.强心剂

D.镇静剂

E.血管扩张剂

121、（B1 型选择题）孕妇感染生殖道沙眼衣原体首选的治疗药物是

A.克林霉素

B.头孢曲松

C.青霉素

D.氧氟沙星

E.红霉素

122、（B1 型选择题）孕妇感染苍白密螺旋体首选的治疗药物是

A.克林霉素

B.头孢曲松

C.青霉素

D.氧氟沙星

E.红霉素

123、（B1 型选择题）B 细胞发育成熟的场所是

A.骨髓

B.淋巴结

C.脾

D.外周免疫器官

E.胸腺

124、（B1 型选择题）免疫应答发生的场所是

A.骨髓

B.淋巴结

C.脾

D.外周免疫器官

E.胸腺

125、（B1 型选择题）可发现局部黏膜早期食管癌的是

A.脱落细胞检查

B.内镜检查

C.超声波断层检查

D.甲胎蛋白定量测定

E.选择性动脉造影

126、（B1 型选择题）判断肝癌的疗效及预后应进行

- A.脱落细胞检查
- B.内镜检查
- C.超声波断层检查
- D.甲胎蛋白定量测定
- E.选择性动脉造影

127、（A3/A4 型选择题）男,39 岁。精神分裂病史 18 年，第 3 次入院,入院后给予氟哌啶醇治疗，3 天后加至 30mg/d，第 6 天出现肌肉僵硬、震颤、吞咽困难。T39.8℃，意识不清，大小便失禁，双手颤抖，静止性震颤。该患者出现的情况最可能是

- A.迟发性运动障碍
- B.急性肌张力障碍
- C.恶性综合征
- D.5-羟色胺综合征
- E.药源性帕金森综合征

128、（A3/A4 型选择题）男,39 岁。精神分裂病史 18 年，第 3 次入院,入院后给予氟哌啶醇治疗，3 天后加至 30mg/d，第 6 天出现肌肉僵硬、震颤、吞咽困难。T39.8℃，意识不清，大小便失禁，双手颤抖，静止性震颤。该患者首要的处理方法是

A.换用非典型抗精神病药治疗

B.降温、抗感染

C.盐酸苯海索治疗

D.立即给予电抽搐治疗

E.即刻停用氟哌啶醇

129、（A3/A4 型选择题）男,39 岁。精神分裂病史 18 年，第 3 次入院,入院后给予氟哌啶醇治疗，3 天后加至 30mg/d，第 6 天出现肌肉僵硬、震颤、吞咽困难。T39.8℃，意识不清，大小便失禁，双手颤抖，静止性震颤。针对该患者的情况，有效的治疗药物是

A.α 受体阻断剂

B.多巴胺受体激动剂

C.广谱抗生素

D.苯二氮类药物

E.抗胆碱能药物

130、（A3/A4 型选择题）男，11 岁。1 个月前无明显诱因出现左胫骨近端肿痛，逐渐加重，皮肤表面静脉怒张，皮温增高。X 线片见左肢骨近端呈溶骨性破坏，伴有骨膜日光放射表现。确诊该病的检查方法是

- A.CT
- B.MRI
- C.组织活检
- D.B 超
- E.核素扫描

131、（A3/A4 型选择题）男，11 岁。1 个月前无明显诱因出现左胫骨近端肿痛，逐渐加重，皮肤表面静脉怒张，皮温增高。X 线片见左肢骨近端呈溶骨性破坏，伴有骨膜日光放射表现。最可能的诊断是

- A.骨囊肿
- B.骨巨细胞瘤
- C.骨髓炎
- D.骨肉瘤
- E.骨结核

132、（A3/A4 型选择题）男，11 岁。1 个月前无明显诱因出现左胫骨近端肿痛，逐渐加重，皮肤表面静脉怒张，皮温增高。X 线片见左肢骨近端呈溶骨性破坏，伴有骨膜日光放射表现。最适宜的治疗方法是

- A.放疗

- B.对症治疗
- C.刮除植骨
- D.单纯截肢术
- E.放疗+保肢治疗

133、（A3/A4 型选择题）男,60 岁。因胃溃疡合并多次大出血，行胃大部切除术。该病人术后 4 天出现胃出血，最可能的原因是

- A.术中止血不确切
- B.吻合口缝线感染
- C.吻合口部分粘膜坏死脱落
- D.应激性溃疡
- E.术后胃内残余血

134、（A3/A4 型选择题）男,60 岁。因胃溃疡合并多次大出血，行胃大部切除术。该病人术后可能出现的营养性并发症不包括

- A.体重减轻
- B.低血糖综合征
- C.缺铁性贫血

D.骨质疏松

E.隐性骨质软化

135、（A3/A4 型选择题）男,60 岁。因胃溃疡合并多次大出血,行胃大部切除术。如果病人发生残胃癌,时间至少超过术后

A.1 年

B.2 年

C.3 年

D.4 年

E.5 年

136、（A3/A4 型选择题）男,28 岁。枕部着地,昏迷 5 分钟后清醒,并自己回到家中,其后出现头痛并逐渐加重伴呕吐,1 小时后不省人事,急送医院。查体:BP160/90mmHg,脉率 65 次/分,呼吸 15 次/分。浅昏迷,右枕部头皮挫伤,左侧瞳孔 4mm,对光反应消失;右侧瞳孔 2.5mm,对光反射存在。最可能的诊断是

A.颅脑肿瘤

B.颅内血肿

C.脑栓塞

D.蛛网膜下腔出血

E.脑挫伤

137、（A3/A4 型选择题）男,28 岁。枕部着地,昏迷 5 分钟后清醒,并自己回到家中,其后出现头痛并逐渐加重伴呕吐,1 小时后不省人事,急送医院。查体:BP160/90mmHg,脉率 65 次/分,呼吸 15 次/分。浅昏迷,右枕部头皮挫伤,左侧瞳孔 4mm,对光反应消失;右侧瞳孔 2.5mm,对光反射应存在。最适当的检查方法是

A.头颅超声

B.脑电图

C.头颅 MRI

D.头颅 X 线片

E.头颅 CT

138、（A3/A4 型选择题）男,28 岁。枕部着地,昏迷 5 分钟后清醒,并自己回到家中,其后出现头痛并逐渐加重伴呕吐,1 小时后不省人事,急送医院。查体:BP160/90mmHg,脉率 65 次/分,呼吸 15 次/分。浅昏迷,右枕部头皮挫伤,左侧瞳孔 4mm,对光反应消失;右侧瞳孔 2.5mm,对光反射应存在。引起病人浅昏迷、左侧瞳孔散大最可能原因是

A.小脑幕切迹疝

- B.枕骨大孔疝
- C.动眼神经麻痹
- D.右侧视神经损害
- E.颈髓损伤

139、（A3/A4 型选择题）女性，48 岁。发作性剑突下及右下腹绞痛 3 天，伴有寒战，半年前有过类似发作史。查体:体温 39°C，脉搏 110 次/分，血压 140/85mmHg，血常规检查:WBC $12 \times 10^9/L$ ，N80%，神志清楚，皮肤、巩膜轻度黄染，右肋缘下扪及肿大的胆囊、触痛。该病人最可能的诊断是

- A.细菌性肝脓肿
- B.肝外胆管结石并胆管炎
- C.急性化脓性胆囊炎
- D.肝内胆管结石并胆管炎
- E.急性梗阻性化脓性胆管炎

140、（A3/A4 型选择题）女性，48 岁。发作性剑突下及右下腹绞痛 3 天，伴有寒战，半年前有过类似发作史。查体:体温 39°C，脉搏 110 次/分，血压 140/85mmHg，血常规检查:WBC $12 \times 10^9/L$ ，N80%，神志清楚，皮肤、巩膜轻度黄染，右肋缘下扪及肿大的胆囊、触痛。首选的检查方法是

- A.腹部 B 超

B.MRCP

C.ERCP

D.PTC

E.腹部 CT

141、（A3/A4 型选择题）女性，48 岁。发作性剑突下及右下腹绞痛 3 天，伴有寒战，半年前有过类似发作史。查体:体温 39°C，脉搏 110 次/分，血压 140/85mmHg，血常规检查:WBC $12\times 10^9/L$ ，N80%，神志清楚，皮肤、巩膜轻度黄染，右肋缘下扪及肿大的胆囊、触痛。该病人皮肤、巩膜黄染加重，体温升高至 40°C，脉搏 130 次/分，血压 90/60mmHg,神志不清。此时最可能的诊断为

A.细菌性肝脓肿破裂

B.肝外胆管结石并胆管炎

C.急性化脓性胆囊炎穿孔

D.肝内胆管结石并胆管炎

E.急性梗阻性化脓性胆管炎

142、（A3/A4 型选择题）女性，48 岁。发作性剑突下及右下腹绞痛 3 天，伴有寒战，半年前有过类似发作史。查体:体温 39°C，脉搏 110 次/分，血压 140/85mmHg，血常规检查:WBC $12\times 10^9/L$ ，N80%，神志清楚，皮肤、巩膜轻度黄染，右肋缘下扪及肿大的胆囊、触痛。该病人此时最有效的治疗是

A.胆总管切开减压、T管引流

B.联合使用大剂量抗生素

C.补液、恢复血容量

D.给予糖皮质激素

E.物理降温，支持治疗

143、（A3/A4型选择题）男，56岁。上腹不适、纳差3年。体重减轻、乏力半年。查体：贫血貌，上腹部轻压痛。Hb88g/L，MCV115fl。胃镜检查示胃体皱襞稀疏，黏膜血管透见。应首先考虑的诊断是

A.胃癌

B.Menetrier病

C.慢性萎缩性胃炎

D.慢性淋巴细胞性胃炎

E.慢性浅表性胃炎

144、（A3/A4型选择题）男，56岁。上腹不适、纳差3年。体重减轻、乏力半年。查体：贫血貌，上腹部轻压痛。Hb88g/L，MCV115fl。胃镜检查示胃体皱襞稀疏，黏膜血管透见。对诊断最有意义的辅助检查是

A.血癌胚抗原

- B.血胃蛋白酶原
- C.血抗线粒体抗体 M2 亚型
- D.血壁细胞抗体
- E.血促胃液素

145、（A3/A4 型选择题）男，56 岁。上腹不适、纳差 3 年。体重减轻、乏力半年。查体:贫血貌，上腹部轻压痛。Hb88g/L，MCV115fl。胃镜检查示胃体皱襞稀疏，黏膜血管透见。该患者发生贫血最可能的机是

- A.铁利用障碍
- B.慢性消化道失血
- C.蛋白质吸收障碍
- D.维生素 C 缺乏
- E.内因子缺乏

146、（A3/A4 型选择题）男，32 岁。反复腰部胀痛 1 年余。B 超见右肾盂结石，大小 1.5cm×1.0cm;左肾积水，左输尿管上段结石，大小 1.0cm×0.7cm。尿常规:RBC5~10/HP，WBC16~20/HP。总肾功能正常要了解该患者肾功能，首选的检查方法是

- A.IVU

B.MRI

C.KUB

D.复查 B 超

E.CT 平扫

147、（A3/A4 型选择题）男，32 岁。反复腰部胀痛 1 年余。B 超见右肾盂结石，大小 1.5cm×1.0cm；左肾积水，左输尿管上段结石，大小 1.0cm×0.7cm。尿常规：RBC5~10/HP，WBC16~20/HP。总肾功能正常首选的治疗方法是

A.右肾盂结石体外冲击波碎石

B.左输尿管切开取石

C.药物排石

D.右肾盂切开取石

E.左输尿管结石体外冲击波碎石

148、（A3/A4 型选择题）女，3 岁，身高 73cm。智力低下，鼻梁低平，舌体宽厚，常伸出口外，腹轻胀，便秘，有脐疝。最可能的诊断是

A.先天性巨结肠

B.先天性甲状腺功能低下

C.21-三体综合征

D.骨软骨发育不良

E.黏多糖病

149、（A3/A4 型选择题）女，3 岁，身高 73cm。智力低下，鼻梁低平，舌体宽厚，常伸出口外，腹轻胀，便秘，有脐疝。为明确诊断，首选的检查是

A.骨龄测定

B.尿黏多糖测定

C.染色体核型分析

D.血 T3、T4、TSH

E.B 超检查肛管测压

150、（A3/A4 型选择题）女，3 岁，身高 73cm。智力低下，鼻梁低平，舌体宽厚，常伸出口外，腹轻胀，便秘，有脐疝。最佳的治疗方案是

A.补充碘剂

B.补充生长激素

C.无需特殊治疗

D.补充甲状腺激素

E.补充多种维生素



1、正确答案：C

答案解析：

2、正确答案：D

答案解析：解析：蜂窝织炎是指疏松结缔组织的弥漫性化脓性炎症,主要由溶血性链球菌引起。

3、正确答案：B

答案解析：体内脂肪大量动员时，生成乙酰 CoA 氧化供能，但脑组织不能利用脂肪酸，酮体溶于水，分子小，可通过血脑屏障，故此时肝中合成酮体增加，转运至脑为其供能。

4、正确答案：A

答案解析：急进性肾小球肾炎血清补体水平正常，常伴有冷球蛋白血症。急性肾小球肾炎病程早期血总补体及 C3 均明显下降，6~8 周后恢复正常，此规律性变化为本症的典型表现。血补体下降程度与急性肾炎病情轻重无明显相关，但低补体血症持续 8 周以上，应考虑有其他类型肾炎之可能，如膜增生性肾炎、冷球蛋白血症或狼疮肾炎等。所以血中补体水平下降一般不见于急进性

肾小球肾炎。所以本题选 A。

5、正确答案：B

答案解析：记忆

6、正确答案：A

答案解析：记忆

7、正确答案：A

答案解析：解析:老年人无痛性肉眼血尿,首先考虑泌尿系肿瘤。

8、正确答案：A

答案解析：用药 3~4d 后，网织红细胞开始上升，7~10d 达高峰，1~2 周后 Hb 逐渐上升，通常于治疗 3~4 周达到正常。一般在血红蛋白恢复正常后再继续用药 6~8 周，以增加铁储存。

9、正确答案：C

答案解析：

10、正确答案：A

答案解析：

11、正确答案：C

答案解析：解析：成人慢性类风湿关节炎合并粒细胞减少及脾大为 Felty 综合征三大主征。本病病因不明，发病机制可能是免疫系统异常，免疫破坏过多导致中性粒细胞减少，故选 C。

12、正确答案：E

答案解析：

13、正确答案：B

答案解析：

14、正确答案：C

答案解析：

15、正确答案：C

答案解析：

16、正确答案：C

答案解析：

17、正确答案：C

答案解析：

18、正确答案：D

答案解析：

19、正确答案：A

答案解析：

20、正确答案：B

答案解析：

21、正确答案：A

答案解析：

22、正确答案：E

答案解析： 解析：肿瘤溶解、严重或广泛创伤、大型手术等因素导致组织因子或组织因子类物质释放入血，激活外源性凝血途径。故 A、B、C、D 不选。感染、炎症及变态反应、缺氧引起血管内皮损伤，导致 FXII 的激活和组织因子的释放，可启动内源性和外源性凝血系统，故选 E。

23、正确答案：D

答案解析：

24、正确答案：C

答案解析：

25、正确答案：E

答案解析：

26、正确答案：E

答案解析：

27、正确答案：B

答案解析：

28、正确答案：A

答案解析：Whipple 三联征为典型的胰岛素瘤表现。①自发性周期性发作低血糖症状、昏迷及其精神神经症状，每天空腹或劳动后发作者；②发作时血糖低于 2.8mmol/L；③口服或静脉注射葡萄糖后，症状可立即消失。

29、正确答案：B

答案解析：记忆

30、正确答案：E

答案解析：

31、正确答案：A

答案解析：解析：对于高血压合并糖尿病的患者，须将血压控制在 130/80mmHg 以下，能维持主要脏器的灌注压即可，这样可加强抗肾病的疗效。

32、正确答案：E

答案解析：解析:胸骨右缘第二肋间为主动脉听诊区,触及收缩期震颤,为主动脉瓣狭窄。

33、正确答案：C

答案解析：

34、正确答案：C

答案解析：

35、正确答案：B

答案解析：缺血性贫血是由于体内贮存铁减少，不能满足正常红细胞生成的需要，引起血红素合成障碍而导致的贫血。故选 B。

36、正确答案：A

答案解析：用药 3~4d 后，网织红细胞开始上升，7~10d 达高峰，1~2 周后 Hb 逐渐上升，通常于治疗 3~4 周达到正常。一般在血红蛋白恢复正常后再继续用药 6~8 周，以增加铁储存。

37、正确答案：B

答案解析：记忆题

38、正确答案：D

答案解析：解析：心电图上 V 和 V 导联出现急性心肌梗死的特异性改变，其梗死部位是心脏的正后壁。常用的梗死部位对应的心梗有：Ⅱ、Ⅲ、aVF 导联——下壁；V~V 导联——广泛前壁；I、aVL 导联——高侧壁；v~V 导联——前壁；V~V 导联——前间壁；V、V——正后壁

39、正确答案：E

答案解析：

40、正确答案：C

答案解析：解析：合并急性左心衰竭的阵发性室上速，最佳治疗是电复律。阵发性室上速发作时，其频率可达 150~250 次/分，显著加重左心衰，甚至出现心脏猝死。应立即给予同步直流电复律。

41、正确答案：C

答案解析：

42、正确答案：D

答案解析：肝脏 Glisson 纤维鞘内包裹的管道有：门静脉、肝动脉和肝胆管。

43、正确答案：C

答案解析：解析：克罗恩病的手术指征主要是对于药物治疗无效、合并消化道梗阻、穿孔、消化道瘘、腹腔脓肿、难以控制的消化道出血的病人来说，

应选用手术治疗，其中主要的手术指征为疑有癌变。

44、正确答案：C

答案解析：

45、正确答案：B

答案解析：

46、正确答案：B

答案解析：

47、正确答案：C

答案解析：外科感染性休克，原发感染灶的存在是发生休克的主要原因，应尽早处理，才能纠正休克和巩固疗效。

48、正确答案：B

答案解析：

49、正确答案：B

答案解析：解析：胸腔手术后，从胸腔引流管内每小时引流出血液量持续超过 100ml，提示有内出血。故选 B。

50、正确答案：E

答案解析：

51、正确答案：E

答案解析：癫痫用药需遵循的原则：1、逐量增加，从少量开始增加至可以控制癫痫病症状发作为止；2、用药品种不过多，尽量单一用药，不建议超过3种；3、服药要有规律，不随意更改服药时间；4、不轻易换药；5、治疗时间需要长期，不要断断续续；6、一旦控制住病情发作开始逐渐减量；7、注意不良反应；8、生活习惯要规律，改掉不良嗜好；9、多做运动，保持心情舒畅放松

52、正确答案：B

答案解析：解析：有些肿瘤的形态类似发育过程中的某种幼稚细胞或组织，称为“母细胞瘤”其中大部分为恶性肿瘤，如视网膜母细胞瘤、神经母细胞瘤、髓母细胞瘤、肾母细胞瘤和肝母细胞瘤等。也有一部分是良性肿瘤，如肌母细胞瘤、骨母细胞瘤、软骨母细胞瘤和脂肪母细胞瘤等。

53、正确答案：A

答案解析：记忆

54、正确答案：C

答案解析：较严重的烧伤病人常有口渴的感觉。这是由于皮肤大面积烧伤后，体液从伤面大量外渗，致使体内血容量下降，水分减少所致。伤员口渴感越重，常表示伤情越重。按医学要求，烧伤后口渴时不能给伤员饮白开水。因在烧伤后，体液丢失的同时，体液中的钠盐也跟着一起丧失，如果单纯给病人

喝白开水，可导致血液内氯化钠浓度进一步下降，细胞外液渗透压降低，引起细胞内水肿，出现脑水肿或肺水肿，形成所谓的水中毒，可危及伤员生命。因此，最适饮少量多次淡盐水

55、正确答案：C

答案解析：解析：重型肝炎才会出现凝血酶原活动度（PTA）低于40%，其他选项在急性肝炎或肝硬化等类型时也可出现。

56、正确答案：B

答案解析：解析：术后呼吸困难和窒息是术后最危急的并发症，多发生在术后48小时内，常见原因为：①出血及血肿压迫；②喉头水肿；③气管塌陷；④双侧喉返神经损伤。双侧喉上神经损伤的临床表现是不能发高音，声音单调。故选B。

57、正确答案：D

答案解析：解析：甲亢的手术适应证：继发性甲亢或高功能腺瘤；中度以上的原发性甲亢；较大引起压迫症状的，或胸骨后的；抗甲状腺药物或放射性碘治疗无效者或不能坚持治疗者；青少年、症状较轻、不能耐受手术者是其禁忌证。

58、正确答案：D

答案解析：解析：腹外疝发病主要原因是腹壁强度减弱、腹内压升高，其中腹壁强度减弱是主要因素。腹壁强度减弱包括腹壁有缺损和腹壁力量减

弱。

59、正确答案：B

答案解析：上壁为腹内斜肌、腹横肌的弓状下缘。

60、正确答案：C

答案解析：典型症状有间歇性跛行，伴患肢怕冷、麻木、刺痛。足趾有持续性疼痛，尤其在夜间卧床时加剧。肢体无缘由地怕冷、感觉异常、疼痛是这个病的早期表现。

61、正确答案：C

答案解析：对便血患者强调要作直肠指诊主要为了排除肿瘤，据统计 75% 直肠癌可在直肠指检时被发现。

62、正确答案：B

答案解析：胸腔闭式引流管的长玻璃管应插入水面 3~4cm，至少 2cm，以免气体漏入。

63、正确答案：E

答案解析：解析：疼痛是胰头癌最常见的症状之一，早期因胰管梗阻出现上腹不适，或隐痛、钝痛、胀痛，常位于中上腹深处略偏右。中晚期肿瘤侵及腹腔神经丛，出现持续性剧烈腹痛，可向腰背部放射，夜间或仰卧时加重，影响睡眠和饮食。

64、正确答案：D

答案解析：

65、正确答案：B

答案解析：

66、正确答案：C

答案解析：手外伤清创的原则为：争取在伤后6~8小时进行，清创越早，感染机会越少，疗效越好。

67、正确答案：D

答案解析：

68、正确答案：E

答案解析：

69、正确答案：B

答案解析：典型的移位是桡骨远端向背侧桡侧移位

70、正确答案：A

答案解析：解析:夹纸试验阳性及尺侧半感觉消失提示尺神经损伤；。

71、正确答案：B

答案解析：理解记忆

72、正确答案：D

答案解析：理解记忆

73、正确答案：B

答案解析：解析：贝克三联征（Beck 三联征）：在心包积液、心包积血或缩窄性心包炎等心脏扩张受限时，出现心室舒张的障碍，出现以下体征：①心音遥远，心搏动减弱；②颈静脉怒张；③低血压。

74、正确答案：A

答案解析：记忆

75、正确答案：E

答案解析：功能复位的标准是：1)骨折部位的旋转移位、分离移位必须完全矫正。2)缩短移位：在成人下肢骨折不超过 1cm；儿童若无骨骺损伤，下肢缩短在 2cm 以内，在生长发育过程中可自行矫正。3)成角移位：下肢骨折轻微地向前或向后成角，与关节活动方向一致，日后可在骨痂改造期内自行矫正。向侧方成角移位，与关节活动方向垂直，日后不能矫正，必须完全复位。否则关节内、外侧负重不平衡，易引起创伤性关节炎。上肢骨折要求也不一致，肱骨干稍有畸形，对功能影响不大；前臂双骨折则要求对位、对线均好，否则影响前臂旋转功能。4)长骨干横形骨折，骨折端对位至少达 1/3 左右，干骺端骨折至少应对位 3/4 左右。

76、正确答案：C

答案解析：记忆

77、正确答案：A

答案解析：排除法

78、正确答案：B

答案解析：

79、正确答案：A

答案解析：解析：疝囊高位结扎术：显露疝囊颈，予以高位结扎，贯穿缝扎或荷包缝合，然后切去疝囊。所谓高位，解剖上应达内环口，术中以腹膜外脂肪为标志。结扎偏低只是把一个较大的疝囊转化为一个较小的疝囊，达不到治疗目的。婴幼儿的腹肌在发育中可逐渐强壮而使腹壁加强，单纯疝囊高位结扎常能获得满意的疗效，不需施行修补术。绞窄性斜疝因肠坏死而局部有严重感染，通常也采取单纯疝囊高位结扎，避免施行修补术，因感染常使修补失败，腹壁的缺损应在以后另做择期手术加强之。

80、正确答案：A

答案解析：析：较轻的代谢性酸中毒（血浆 HCO_3^- 16~18mmol/L），常可自行矫正，不必应用碱性药物。

81、正确答案：E

答案解析：

82、正确答案：B

答案解析：

83、正确答案：E

答案解析：

84、正确答案：A

答案解析：

85、正确答案：D

答案解析：

86、正确答案：E

答案解析：

87、正确答案：D

答案解析：

88、正确答案：D

答案解析：

89、正确答案：C

答案解析：【解析】穿刺吸取头皮下血肿，压力骤减，很有可能造成脑疝。

90、正确答案：C

答案解析：解析：该患者因一次排放腹水量过大，引起腹腔内压力骤减，血管扩张，导致肾血流低灌注，出现了肾前性肾衰竭。肾性急性肾衰竭主要因肾实质损伤所致。肾后性急性肾衰竭主要因急性尿路梗阻所致。

91、正确答案：B

答案解析：

92、正确答案：B

答案解析：四肢关节痛、面颊部对称性红斑、口腔溃疡反复发作，诊断为系统性红斑狼疮。

93、正确答案：C

答案解析：根据年龄，突出位置及特点诊断为C

94、正确答案：B

答案解析：解析：肾母细胞瘤的治疗：①肾切除术：早期可经腹行患肾切除。②综合治疗：应用手术、化疗、放疗等效果较好。由于儿童肾母细胞瘤对放疗较敏感，故肾切除术后常辅以放疗。因此本题选B。

95、正确答案：A

答案解析：

96、正确答案：C

答案解析：

97、正确答案：A

答案解析：

98、正确答案：C

答案解析：患者出现面部瘙痒、潮红，胸部及四肢出现少量荨麻疹，为输血引起的过敏反应。

99、正确答案：D

答案解析：

100、正确答案：E

答案解析：

101、正确答案：C

答案解析：

102、正确答案：D

答案解析：

103、正确答案：D

答案解析：

104、正确答案：C

答案解析：

105、正确答案：D

答案解析：

106、正确答案：C

答案解析：

107、正确答案：E

答案解析：

108、正确答案：B

答案解析：

109、正确答案：B

答案解析：

110、正确答案：E

答案解析：

111、正确答案：A

答案解析：

112、正确答案：C

答案解析：

113、正确答案：D

答案解析：

114、正确答案：E

答案解析：

115、正确答案：B

答案解析：

116、正确答案：E

答案解析：

117、正确答案：B

答案解析：

118、正确答案：E

答案解析：

119、正确答案：D

答案解析：

120、正确答案：B

答案解析：

121、正确答案：E

答案解析：

122、正确答案：C

答案解析：

123、正确答案：A

答案解析：

124、正确答案：D

答案解析：

125、正确答案：A

答案解析：

126、正确答案：D

答案解析：

127、正确答案：C

答案解析：

128、正确答案：E

答案解析：

129、正确答案：B

答案解析：

130、正确答案：C

答案解析：

131、正确答案：D

答案解析：

132、正确答案：E

答案解析：

133、正确答案：C

答案解析：

134、正确答案：B

答案解析：

135、正确答案：E

答案解析：

136、正确答案：B

答案解析：

137、正确答案：E

答案解析：

138、正确答案：A

答案解析：

139、正确答案：C

答案解析：

140、正确答案：A

答案解析：

141、正确答案：E

答案解析：

142、正确答案：A

答案解析：

143、正确答案：C

答案解析：

144、正确答案：D

答案解析：

145、正确答案：E

答案解析：

146、正确答案：A

答案解析：

147、正确答案：E

答案解析：

148、正确答案：B

答案解析：

149、正确答案：D

答案解析：

150、正确答案：D

答案解析：



金英杰医学
JINYINGJIE.COM



金英杰医学
JINYINGJIE.COM

金英杰直播学院