

2018 临床执业助理医师考试第一单元

A1 型选择题(1-50 题)

1. 胫骨中下段粉碎性骨折，行切开复位钢板内固定达到解剖复位，半年后骨折仍未愈合，最可能原因是(B)

- A. 内固定强度不足
- B. 骨折处血液循环差
- C. 未到愈合时间
- D. 未配合药物治疗
- E. 功能锻炼不够

2. 下列不符合 1 型糖尿病特点的是(B)

- A. 容易发生酮症酸中毒
- B. 常伴有胰岛素抵抗
- C. 罕见高渗性非酮症性昏迷
- D. 血浆胰岛素水平明显减低
- E. 对胰岛素敏感

3. 预防乙型肝炎最有效的措施是(D)

- A. 严格管理血制品
- B. 应用一次性医疗器械
- C. 饮食饮水卫生
- D. 接种疫苗
- E. 注射两种球蛋白

4. 下列不属于抗甲状腺药物副作用的是(A)

- A. 乳酸酸中毒
- B. 血管炎
- C. 粒细胞缺乏症
- D. 皮疹
- E. 中毒性肝病

5. 关于早期流产临床表现的描述，正确的是(B)

- A. 稽留流产子宫大小与停经周数相符
- B. 完全流产宫口关闭，子宫接近正常大小
- C. 早期流产先有腹痛后有阴道出血
- D. 难免流产的宫颈口尚未扩张
- E. 不全流产子宫大小与停经周数相符

6. 早期确诊先天性甲状腺功能减退症的实验室检查是(E)

- A. 甲状腺抗体测定

B. TRH 兴奋试验

C. 骨龄测定

D. 甲状腺扫描

E. 血清 T3、T4、TSH 测定

7. 引起子宫收缩乏力的原因不包括(C)

- A. 子宫局部因素
- B. 内分泌失调
- C. 有急产史
- D. 胎位异常
- E. 精神因素

8. 引起子宫脱垂的最常见原因是(A)

- A. 分娩损伤
- B. 长期重体力劳动
- C. 肥胖体型
- D. 慢性咳嗽
- E. 习惯性便秘

9. 类风湿关节炎的基本病理改变是(B)

- A. 血管炎
- B. 滑膜炎
- C. 骨髓炎
- D. 肌腱鞘炎
- E. 软骨炎

10. 不属于缓解哮喘急性发作药物的是(E)

- A. 静脉用糖皮质激素
- B. 抗胆碱能药物
- C. 短效茶碱
- D. 速效  $\beta_2$  受体激动剂
- E. 白三烯调节剂

11. 透光试验用于诊断的主要疾病是(A)

- A. 睾丸鞘膜积液
- B. 腹股沟病
- C. 睾丸肿瘤
- D. 精索静脉曲张
- E. 附睾炎

12. 判断早期成人股骨头缺血性坏死最敏感的无创检查是(A)

- A. MRI

B.血管造影

C. B 超

D.X 线片

E. CT

13.常以肌无力为最早表现的电解质紊乱是(D)

A.低钙血症

B.高钙血症

C.高磷血症

D.低钾血症

E.高钾血症

14.广泛性焦虑障碍中, 较少出现的症状是《E》

A.心慌

B.运动性不安

C.莫名担忧

D.尿频

E.濒死感

15.细菌性阴道病首选的治疗药物是(A)

A.抗厌氧菌药物

B.抗病毒药物

C.抗革兰阴性菌药物

D.抗革兰阳性菌药物

E.抗真菌药物

16.引起以泌尿生殖系统化脓性感染为主要表现的性传播疾病病原体是(B)

A.人乳头病病毒

B.淋病奈瑟菌

C.苍白密螺旋体

D.金黄色葡萄球菌

E.沙眼衣原体

17.与宫颈上皮内病变 III 级(CIN III)发病关系最密的是(E)

A. HIV

B. HSV

C. HCV

D. HBV

E. HPV

18.尿路感染最常见的感染途径是(D)

A.血液感染

B.淋巴道感染

C.下行感染

D.上行感染

E.直接感染

19.最容易发生缺血性骨坏死的是(B)

A.股骨干骨折

B.股骨颈骨折

C.耻骨干骨折

D.桡骨远端骨折

E.肱骨髁上骨折

20.常用的急救技术不包括《D》

A.止血, 包扎

B.心肺复苏

C.骨折固定

D.内脏脱出复位

E.气管插管

21.急性面神经炎的临床表现(A)

A.偏侧面部全部表情肌瘫痪

B.偏侧面部疼痛

C.偏侧面下部表情肌瘫痪

D.偏侧面部全部表情肌抽搐

E.偏侧面上部表情肌瘫痪

22.非重型再生障碍性贫血最常见的感染部位是(D)

A.皮肤软组织

B.泌尿系统

C.肠道

D.上呼吸道

E.血液

23.丹毒最常见的病原菌是(E)

A.金黄色葡萄球菌

B.大肠埃希菌

C.铜绿假单胞菌

D.肺炎链球菌

E.乙型溶血性链球菌

24.高颈段急性髓炎休克期与吉兰巴雷综合征急性期的主要区别是(A)

- A.严重尿潴留
- B.弛缓性瘫痪
- C.肌张力降低
- D.呼吸肌麻痹
- E.腱反射消失

25.猩红热的病原是(D)

- A.草绿色链球菌
- B.金黄色葡萄球菌
- C.B组 $\alpha$ 溶血性链球菌
- D.A组 $\beta$ 溶血性链球菌
- E.B组 $\beta$ 溶血性链球菌

26.以下需要限期手术的疾病是(E)

- A.外伤性肠破裂
- B.急性阑尾炎
- C.脂肪瘤
- D.腹股沟疝
- E.胃癌

27.足月新生儿的原始反射不包括(B)

- A.觅食反射
- B.腹壁反射
- C.握持反射
- D.拥抱反射
- E.吸吮反射

28.正常小儿出生后头围与胸围相等的月龄是(D)

- A.6个月
- B.15个月
- C.18个月
- D.12个月
- E.9个月

29.对精神分裂症诊断特异性较高的症状是(A)

- A.被害妄想
- B.夸大妄想
- C.疑病妄想
- D.钟情妄想
- E.虚无妄想

30.地方性甲状腺肿的主要原因是(E)

- A.遗传
- B.海产品摄入过多
- C.精神刺激
- D.感染
- E.缺碘

31.骑跨伤导致尿道断裂时,最有效的治疗方法是(D)

- A.导尿
- B.耻骨上膀胱造瘘
- C.消除会阴部血肿
- D.经会阴尿道修补
- E.保守观察、抗炎治疗

32.小儿体格的两次生长高峰是(C)

- A.学龄期、青春期
- B.新生儿期、婴儿期
- C.婴儿期、青春期
- D.新生儿期、幼儿期
- E.幼儿期、学龄前期

33.糖尿病的基本发病机制是(E)

- A.糖原分解过多
- B.靶细胞膜胰岛素受体减少
- C.糖异生增强
- D.胰岛素拮抗激素异常增多
- E.胰岛素分泌绝对或相对不足,可伴胰岛素抵抗

34.多数小儿萌出第一颗磨牙的年龄是(E)

- A.12岁
- B.10岁
- C.14岁
- D.8岁
- E.6岁

35.下列不属特定恐惧症的恐惧对象是(B)

- A.雷电
- B.社交场合
- C.动物
- D.尖锐物品
- E.鲜血

36.颅内压增高时不正确的处理是(E)

- A.应用脱水剂
- B.液体摄入量限制在每日 1500-2000ml
- C.密切观察生命体征
- D.轻泻剂疏通大便
- E.高位灌肠

37.急性脑综合症临床上最常见的表现是(B)

- A.嗜睡
- B.谵妄状态
- C.昏迷
- D.意识混浊
- E.昏睡

38.正中神经损伤的临床表现是(B)

- A.垂腕畸形
- B.拇指对掌障碍
- C.手指内收、外展障碍
- D.拇指背伸障碍
- E.爪形手畸形

39.4 岁儿童必须复种的疫苗是(A)

- A.脊髓灰质炎疫苗
- B.乙脑疫苗
- 乙百白破疫苗
- D.麻疹疫苗
- E.卡介苗

40.对确诊苯丙酮尿症最具意义的检查是(E)

- A.尿三氯化铁试验
- B.尿蝶呤分析
- C.尿 2,4-二硝基苯并试验
- D.Guthrie 细菌生长抑制试验
- E.血液苯丙氨酸浓度测定

41.左肱骨干上 1/3 骨折,近折端向前、向内以为,远折端向外、向近端移位。造成这种骨折移位的最主要因素是(A)

- A.肌肉的牵拉力
- B.暴力的大小
- C.搬运固定不当
- D.暴力的性质
- E.肢体的重量

42.关于受精卵形成的描述,正确的是(D)

- A.卵子在输卵管间质部与精子结合
- B.受精发生在排卵 24 小时后
- C.精子进入卵子引发第一次减数分裂
- D.精子顶体反应帮助精子进入卵子
- E.透明带反应保证多个精子受精顺利完成

43.下列异位妊娠的临床表现中错误的是(A)

- A.有停经但小于 8 周
- B.多有不同程度的腹痛
- C.可以出现腹部包块
- D.多有阴道流血
- E.可导致失血性休克

44.下列诊断中属于开放性颅脑损伤的是(B)

- A.颅内血肿
- B.脑脊液鼻漏
- C.头皮血肿
- D.脑挫裂伤
- E.头皮血肿合并颅骨骨折

45.流行性脑脊髓膜炎的典型临床表现是(E)

- A.发热、皮疹、视物模糊
- B.头痛、呕吐、皮疹、昏睡
- C.发热、头痛、呕吐、腹泻
- D.发热、抽搐、呕吐、昏迷
- E.发热、头痛、皮疹、呕吐

46.最常见的卵巢恶性肿瘤是(C)

- A.生殖细胞肿瘤
- B.性索间质肿瘤
- C.上皮性肿瘤
- D.非特异性间质肿瘤
- E.转移瘤

47.中暑的病因不包括(C)

- A.汗腺功能障碍
- B.散热障碍
- C.饮水过多
- D.人体产热增加
- E.环境温度过高

48.以下关于全身性外科感染治疗的描述,

正确的是(B)

- A.均需应用抗真菌药物
- B.尽早处理感染原发灶
- C.等待培养结果再选用抗生素
- D.尽量选用窄谱抗生素
- E.首要的措施是加强抗生素的应用

49.小儿风湿热的典型关节表现是(B)

- A.关节疼痛为主
- B.游走性多关节炎
- C.多关节功能障碍
- D.大关节畸形
- E.全身关节红肿

50.老年男性发生尿潴留，首先考虑的疾病是(A)

- A.良性前列腺增生
- B.膀胱颈挛缩
- C.糖尿病
- D.前列腺癌
- E.膀胱肿痛

51.女，65岁。左膝关节严重疼痛，步行距离少于500米。查体：左膝屈曲挛缩形，活动受限，负重位膝关节正位X线片显示左膝内侧关节间隙消失，骨质硬化，边缘骨赘增生，最可能的诊断是(A)

- A.骨关节炎
- B.痛风关节炎
- C.化脓性关节炎
- D.骨关节结核
- E.风湿性关节炎

52.女，28岁，初产妇。妊娠28周，阵发性腹痛，伴有少许阴道流血1天。查体T36.5°，规律宫缩1次/5分钟，持续40秒宫颈扩张3cm。最可能的诊断是(D)

- A.早产临产
- B.不全流产
- C.难免流产
- D.先兆早产
- E.先兆流产

53.女，22岁，咽痛、发热伴咳嗽2周，颜面水肿3天。查体BP150/100mmHg，全身皮肤无皮疹。尿常规：蛋白(++)。尿沉渣镜检：RBC 20-30/HP。血肌酐115 $\mu$ mol/L，补体C3降低，ASO升高，下列治疗不适宜的是(C)

- A.抗生素
- B.休息
- C.应用激素
- D.利尿
- E.控制血压

54.女，50岁，畏寒、消瘦、食欲减退、毛发脱落10年余。有产后大出血史，查体：水肿，皮肤粗糙，反应迟钝，心率56次/分，律齐。实验室检查血FT3 $\downarrow$ ，FT4 $\downarrow$ ，TSH升高，考虑主要诊断为(D)

- A.原发性甲状腺功能减退症
- B.垂体瘤
- C.甲状腺肿瘤
- D.Sheehan综合征
- E.原发性慢性肾上腺皮质功能减退症

55.女，28岁，已婚不孕1年，月经量增多、经期延长2年。近1个月出现不规则阴道流血。妇科检查：宫体增大如2个月妊娠大小。血Hb 85g/L。B超检查子宫前壁探及3.5cm $\times$ 1.5cm大小的肌瘤，完全凸向宫腔，首选的治疗方案是(E)

- A.米非司酮药物治疗
- B.开腹行肌瘤切除术
- C.GnRH-a药物治疗
- D.射频消融术
- E.宫腔镜肌瘤切除术

56.女孩，2岁。不会走路和说话。查体：身高65cm，眼裂小，眼距宽，鼻梁低，全身皮肤细腻，胸骨左缘3-4肋间可闻3/6级收缩期杂音。为明确诊断，首选的检查是(E)

- A.心电图
- B.尿液有机酸分析
- C.血清T3、T4、TSH测定
- D.胸部X线片

E.染色体核型分析

57.女,56岁,绝经2年,阴道不规则流血1个月,妇科检查:外阴正常,阴道内少量暗红色血,宫颈光滑,宫体大小正常,双侧附件区未触及异常,B超检查:子宫5Cm×4Cm×3Cm,子宫内膜厚10mm,回声不均。对确定诊断最有价值的处理是(B)

- A.凝血功能检查
- B.诊断性刮宫
- C.血常规检查
- D.尿妊娠试验
- E.宫颈细胞学检查

58.男,50岁,反复发作第一跖趾关节红肿热痛2年。常于饮酒后出现,每次持续1周左右。既往,双肾结石3年,高脂血症5年。实验室检查:血尿酸630 $\mu$ mol/L,血肌酐96 $\mu$ mol/L。不宜使用的药物是(B)

- A.布洛芬
- B.苯溴马隆
- C.糖皮质激素
- D.别嘌醇
- E.秋水仙碱

59.女,56岁,间断水肿8年,加重伴头痛、恶心10天,查体T36.5 $^{\circ}$ ,P110次/分,BP100/70mmHg,贫血貌,双中下肺可闻及湿罗音,双下肢中度凹陷性水肿,尿常规:蛋白《+++》,尿沉渣镜检RBC10~15/HP,血红蛋白68g/L。血肌酐892 $\mu$ mol/L,钾6.2mmol/L,二氧化碳结合力10mmol/L。该患者最重要的治疗为(B)

- A.降压
- B.血液透析
- C.碳酸氢钠
- D.利尿
- E.输血

60.男婴。6天。不吃、不哭、体温不升3天。查体:反应差,皮肤黄染,脐部有分泌物,双肺可闻及湿回音,肝肋下3Cm,脾肋下1Cm。最主要的诊断是(D)

- A.新生儿脐炎

B.新生儿低血糖

- C.新生儿寒冷损伤综合征
- D.新生儿败血症
- E.新生儿肺炎

61.女,22岁,妊娠30周。外阴灰白色疣状物伴瘙痒、灼痛不适半个月。外阴皮损病理组织学检查见挖空细胞,最可能的(B)

- A.梅毒
- B.尖锐湿疣
- C.淋病
- D.细菌性阴道病
- E.滴虫阴道炎

62.男,65岁。睡醒后发现右侧肢体无力,伴言语不利1小时。有高血压病史10年,未规律服药治疗。否认有糖尿病及血脂异常史,神经系统查体:神志清楚,运动性失语,右侧肢体肌力0级,两侧痛、温觉对称,右侧Babinski征(+)。头颅CT检查未见异常。最可能的诊断是(B)

- A.蛛网膜下腔出血
- B.缺血性卒中
- C.脑肿瘤
- D.脑出血
- E.脑炎

63.男,22岁。因外伤性脾破裂,低血容量性休克行手术治疗。术中输血1500ml。术后第1天神志清,P95次/分,BP90/60mmHg,血K+6.5mmol/L。在以下治疗中,错误的是(A)

- A.立即减慢正在输入的含钾溶液流速
- B.口服阳离子交换树脂
- C.静脉注射10%葡萄糖酸钙溶液20ml
- D.静脉滴注5%碳酸氢钠溶液200ml
- E.血液透析

64.女,1岁,诊断为蛋白质-能量营养不良。患儿突然发生面色灰白,神志不清,脉搏减慢,呼吸暂停,应首先考虑(B)

- A.低钠血症
- B.自发性低血糖
- C.继发感染

- D.心力衰竭  
E.低钙血症

65.女, 35岁, GSP0。停经5个月, 患风湿性心脏病20年, 心功能III级, 曾因风湿性心脏病行人工流产术3次。B超示中期妊娠, 拟行剖宫取胎术。该患者最佳的避孕方法是(E)

- A.紧急避孕药  
B.长效避孕针  
C.宫内节育器  
D.短效口服复方避孕药  
E.输卵管绝育术

66.女, 31岁, 妊娠28周, 阴道脓性分泌物增多3天, 诊断为淋病。首选的治疗是(B)

- A.头孢两丁加用红霉素  
B.头孢曲松钠单次肌肉注射  
C.头孢曲松钠加用四环素  
D.头孢西丁单次给药  
E.头孢曲松钠加用喹诺酮类药物

67.男婴。3个月。出生体重2.8kg, 母乳喂养, 未添加辅食, 食欲好。自出生至今大便6~8次/日, 为黄色软便, 无特殊味, 经治疗无好转。现体重5.5kg, 体格检查无异常, 最可能的诊断是(C)

- A.慢性细菌性痢疾  
B.肠结核  
C.生理性腹泻  
D.真菌性肠炎  
E.迁延型腹泻

68.女, 65岁。绝经15年, 阴道不规则流血10余天。高血压, 糖尿病病史10年, 妇科检查宫颈光滑, 宫体如8周妊娠大小, 质软, 双附件未见异常。应首先考虑的疾病是(A)

- A.子宫内膜癌  
B.子宫内膜炎  
C.子宫腺肌病  
D.子宫内膜息肉  
E.子宫肌瘤

69.女, 28岁, 尿急, 尿频, 尿痛2天, 查

体: T36.5°, 双肾区无叩痛, 尿沉渣镜检: RBC 5~10/HP, WBC 20~30/HP, 最可能的诊断为(A)

- A.急性膀胱炎  
B.急性肾小球肾炎  
C.急性间质性肾炎  
D.急性肾小管肾炎  
E.急性肾盂肾炎

70.女, 31岁。产后2个月出现怕脏, 担心宝宝被细菌感染, 因而反复洗手、反复清洗奶瓶。丈夫下班回来, 要求其必须换洗所有衣物。有时出现把宝宝扔出窗外的冲动, 但从未真的实施, 患者明知这些想法和行为不合理, 也试图控制, 但没有效果, 内心非常痛苦, 该患者最可能的诊断为(E)

- A.抑郁症  
B.恐惧症  
C.疑病障碍  
D.精神分裂症  
E.强迫障碍

71.男, 50岁。干农活时刺伤右足10天, 当时未就医, 伤口已愈合良好, 伤口内无异物残留, 感张口困难2天, 颈项紧, 饮水可诱发手足痉挛, 病情逐渐加重, 抽搐频繁, 用药未控制, 呼吸道分泌物较多, 有窒息的危险, 为保持呼吸道的通畅, 最有效的措施是(D)

- A.协助拍背咳痰咳  
B.环甲膜穿刺  
C.气管插管  
D.气管切开  
E.吸痰、吸氧

72.男, 65岁, 进行性排尿困难2年, 不能自行排尿2小时, 膀胱膨隆, 轻压痛, 首选的治疗方法应是(A)

- A.导尿并保留导尿管  
B.药物治疗  
C.耻骨上膀胱穿刺  
D.耻骨上膀胱造瘘  
E.针灸

73.女婴, 10 个月, 反应呆滞伴面色发黄 2 个月。生后母乳喂养, 一直未添加辅食, 查体: 精神萎靡, 面色黄白, 舌有震颤, 腹软, 肝肋下 3Cm, 腱反射亢进, 踝阵挛阳性, 最佳的治疗药物是(B)

- A.铁剂
- B.维生素B12
- C.维生素D
- D.亚叶酸钙
- E.维生素C

74.女, 56 岁。全身麻醉下行右乳癌改良根治术术后 24 小时。查体: T36.9°, P85 次/分, R21 次/分, BP130/80mmHP, 意识清醒。此时需采取的体位是(E)

- A.斜坡卧位
- B.仰卧位
- C.头低脚高位
- D.侧卧位
- E.高半坐位卧式

75.女, 35 岁, 因下腹痛伴发热 2 天来急诊, 查体: T38.9°C, 急性病容。下腹部有压痛、反跳痛及肌紧张。妇科检查可见脓性阴道分泌物, 宫颈有举痛, 双侧附件区增厚, 有压痛, 最可能的诊断是(C)

- A.卵囊肿破裂
- B.急性宫颈炎
- C.卵巢囊肿蒂扭转
- D.卵巢囊肿继发感染

76.女, 40 岁, 双腕、双肘和足趾关节肿胀、疼痛 6 个月, 晨僵大于 1 小时, 活动后减轻, 不作发热、脱发、皮疹及光过敏等。实验室检查血沉 39mm/h, 抗环瓜氨酸肽抗体阳性, 最可能的诊断是(E)

- A.骨关节炎
- B.强直性脊柱炎
- C.风湿性关节炎
- D.痛风关节炎
- E.类风湿关节炎

77.男孩, 10 岁。反复低热伴头痛 3 月余, 头痛加剧伴视力障碍 1 周。眼科检查发现视

神经乳头水肿。脑脊液沉渣涂片墨汁染色见厚荚膜发亮圆形菌体。最可能的诊断是(C)

- A.结核性脑膜炎
- B.病毒性脑炎
- C.隐球菌性脑膜炎
- D.化脓性脑膜炎
- E.中毒性脑病

78.女, 35 岁, 左手示指末节肿胀、疼痛 3 天。3 天前洗鱼时被鱼刺扎伤左手示指末节, 起病时指尖有针刺样疼痛, 轻度肿胀, 继而肿胀明显加重, 有剧烈的跳痛。查体 T 37.9°, 左示指末节肿胀明显, 指腹张力明显增高, 触痛明显。血常规 WBC13.0×10<sup>9</sup>/L,N0.89.如行手术治疗, 正确的操作是(A)

- A.脓腔较大可做对口引流
- B.在末节指腹正中作纵切口
- C.切口远侧应超过甲沟的 1/2
- D.切口近侧应超过指节横纹
- E.切口要作成鱼口形

79.女, 45 岁。发热、腹痛、腹泻 2 小时, 大便 10 余次, 为脓血便, 5 小时前曾在小餐馆进食。实验室检查血 WBC 13.0 × 10<sup>9</sup>/L,N0.85,L0.15。镜检 WBC80/HP, RBC 10/HP, 最可能的诊断是(D)

- A.急性胃肠炎
- B.急性阑尾炎
- C.急性病毒性腹泻
- D.急性细菌性痢疾
- E.食物中毒

80.男, 28 岁。车祸后急诊入院。查体, BP70/50mmHg。神志清楚, 面色苍白, 左侧肢体不敢活动, 明显肿胀和压痛。X 线片示左侧肱骨、股骨和胫腓骨骨折。最可能的并发症是(A)

- A.休克
- B.骨髓炎
- C.神经损伤
- D.坠积性肺炎
- E.缺血性骨坏死

81.男孩, 2岁, 血常规 Hb45g/L,RBC $2.0 \times 10^{12}$ L., 该患儿的贫血程度是(A)

- A.重度贫血
- B.正常血象
- C.轻度贫血
- D.中度贫血
- E.极重度贫血

82.男, 45岁, 发热、腹泻2个月, 咳嗽4天, T $37.6^{\circ} \sim 38.8^{\circ}$ , 腹泻4~6次/天水样便, 体重下降5kg, 有静脉药史, 实验室检查血: 血CD4+T淋巴细胞减少, 最可能的诊断是(B)

- A.慢性细菌性痢疾
- B.艾滋病
- C.肺结核
- D.细菌性肺炎
- E.溃疡性结肠炎

83.女, 22岁。停经40天, 阴道少量流血1周, 月经规律, 周期为28天, 有性生活史, 曾行人工流产2次, 妇科检查: 子宫稍大, 宫颈举痛(+), 左侧附件区可触及5Cm $\times$ 5Cm大小包块, 质中, 压痛(+)为明确诊断, 首选的常用辅助检查是(D)

- A.腹腔穿刺
- B.诊断性刮宫
- C.宫腔镜检查
- D.超声检查
- E.腹腔镜检查

84.男, 35岁, B超发现右输尿管上段结石, 大小1.2Cm $\times$ 0.8Cm, 合并轻度右肾积水。发热, 静脉尿路造影(IVU)显示右输尿管上段结石, 右肾轻度积水, 输尿管显影, 首选的治疗方法是(A)

- A.体外冲击波碎石
- B.输尿管镜碎石取石
- C.经皮肾镜碎石取石
- D.开放输尿管切开取石
- E.腹腔镜输尿管切开取石

85.男, 35岁。3小时前进餐时无诱因突然

出现剧烈头痛, 以枕部为著, 伴频繁呕吐、面色苍白, 随即出现意识丧失10余分钟。查体精神差, 颈强直。CT示脑沟及脑池密度增高。正确的诊断是(A)

- A.蛛网膜下腔出血
- B.脑血管痉挛
- C.脑栓塞
- D.急性脑梗死
- E.急性脑膜炎

86.女, 22岁, 乏力、纳差、尿黄10天。近1个月经常在外进餐。既往无肝炎病史, 无服用损肝药物史。查体: 神志清楚, 巩膜轻度黄染, 肝掌(-)。腹软, 肝区叩痛(+), 肝脾肋下未触及。实验室检查: ALT 2300U/L, AST 410U/L, TBIL 60 $\mu$ mol/L, DBil 40 $\mu$ mol/L。最可能的诊断是(B)

- A.自身免疫性肝炎
- B.急性病毒性肝炎
- C.脂肪肝
- D.慢性肝炎急性发作
- E.药物性肝炎

87.女。22岁, 初产妇。妊娠38周, 规律宫缩7小时。检查: 宫口开大5Cm, S=0, 枕左前位, 胎心148次/分, 预估胎儿体重2800kg。目前应采取的处理是(A)

- A.严密观察产程进展
- B.静脉推注地西洋
- C.人工破膜
- D.人工灌肠
- E.静脉滴注缩宫素

88.女婴, 5个月。3天内抽搐4次, 发作时意识不持续2分钟, 自行缓解, 醒后活泼如常, 不伴发热。实验室检查血钙1.73mmol/L, 血镁1.00mmol/L, 血糖3.9mmol/L, 一最可能的诊断是(E)

- A.维生素D依赖性佝偻病
- B.低镁血症
- C.低血糖症
- D.婴儿痉挛症
- E.维生素D缺乏性手足搐搦症

89. 男, 56 岁, 长期大量饮酒 30 年。因母亲去世忙于料理后事而停止饮酒, 2 天后出现不识家人, 不知自己身在何处, 听见死去的亲人与他说话, 看见房间里有很多蛤蟆。体温  $39.5^{\circ}$ , 四肢相大震颇, 表情惊恐, 患者最可能的诊断是 (E)

- A. 急性应激障碍
- B. 酒精性幻觉症
- C. 精神分裂症
- D. 早老性痴呆
- E. 震颤谵妄

90 女, 40 岁。1 小时前服敌百虫 200ml, 查体: 躁动, 瞳孔缩小, 四肢强直、肺部可闻及湿啰音。下列处理措施不恰当的是(E)

- A. 药物导泻
- B. 清洗呕吐物污染的皮肤
- C. 静脉应用阿托品
- D. 应用解磷定
- E. 2%碳酸氢钠溶液洗胃

91. 女。40 岁, 10 年来常出现畏寒、少汗、乏力、纳差, 月经不调、便秘, 少讲少动, 表情淡漠, 近半年来出现面色苍白, 眼睑颈部水肿, 反应迟钝, 有一过性幻视。患者最可能的诊断是(D)

- A. 肾上腺皮质功能减退所致精神障碍
- B. 肾上腺皮质功能亢进所致精神障碍
- C. 精神分裂症
- D. 甲状腺功能低下所致精神障碍
- E. 甲状腺功能亢进所致精神障碍

92. 男, 65 岁, 右侧肢体运动障碍、失语 12 小时, 但能听懂他人的讲话内容, 能按指示做相应的动作, 既往糖尿病病史 10 年, 血糖控制好, 高血压病史 15 年, 规则服药治疗, 血压控制在 130/80mmHg 左右。对诊断最有价值的辅助检查是(B)

- A. 颈动脉 B 超
- B. 头颅 CT
- C. 超声心动图
- D. 经颅多普勒超声
- E. 脑电图

93. 女, 22 岁, 头晕、乏力 1 年, 实验室检查血 Hb 70g/L, RBC  $3.0 \times 10^{12}/L$ , WBC  $4.1 \times 10^9/L$ , Plt  $200 \times 10^9/L$ , 血清铁蛋白 4 $\mu$ B/L, 最可能的诊断是 (E)

- A. 地中海贫血
- B. 慢性病性贫血
- C. 巨幼细胞贫血
- D. 骨髓增生异常综合征
- E. 缺铁性贫血

94. 男, 45 岁, 农民。发热 5 天, 呕吐腹泻你少尿 1 天, 查体神志清楚, 结膜充血, 双腋下可见“搔抓样”出血点, 实验室检查: WBC  $25 \times 10^9/L$ , Plt  $30 \times 10^9/L$ , ALT 80U/L, TBil 45 $\mu$ mol/L, 尿蛋白 (3 +)。最可能的诊断是 (B)

- A. 急性细菌性痢疾
- B. 肾综合征出血热
- C. 钩端螺旋体病
- D. 急性黄疸型肝炎
- E. 疟疾

95. 男孩, 5 岁, 颜面、四肢水肿半个月。查体, BP120/80mmHg, 尿常规: 蛋白(3 +)。尿沉渣镜检 RBC 20/HP, 血总蛋白 40g/L, 白蛋白 25g/L 一最可能诊断是 (D)

- A. 急性肾炎
- B. 急进性肾炎
- C. 慢性肾炎
- D. 肾炎型肾病综合征
- E. 单纯性肾病综合征

96. 女, 3 岁, 右手中指疼痛 1 个月。查体: 中指屈曲, 不能伸直, 拿指关节掌侧处可触及 0.3mX0.3Cm 大小硬结, 压痛, 可随屈肌腱上下活动, 首选的治疗方法是 (B)

- A. 局部封闭治疗
- B. 手术治疗
- C. 口服非甾体抗炎药
- D. 局部制动
- E. 物理治疗

97.男, 45 岁。发现血尿、蛋白尿 8 年, 查体 BP150/90mmHg。实验室检查尿蛋白定量 1.2-1.8g/d。血肌酐 110 umol/L, 临床诊断是(E)

- A.急性肾小球肾炎
- B.肾病综合征
- C.隐匿性肾小球肾炎
- D.高血压肾损害
- E.慢性肾小球肾炎

98.女, 31 岁, 初孕妇, 妊娠 36 周, 患糖尿病 2 年, 正规使用胰岛素, 血糖控制良好。胎动正常。超声检查胃胎儿双顶径 92mm, 胎盘羊水正常, 胎心率 136 次/分, 进一步应采取的处理措施为(B)

- A.剖宫产
- B.严密监护下继续妊娠
- C.前列腺素引产
- D.人工破膜
- E.静脉滴注催产素引产

99.女, 35 岁, 外阴瘙痒、分泌物增多、性交痛 2 周。妇科检查: 阴道黏膜充血、宫颈充血, 阴道内多量白带, 呈灰黄色、稀薄泡沫状, 臭味, 最可能的诊断是(B)

- A.外阴阴道假丝酵母菌病
- B.滴虫阴道炎
- C.细菌性阴道病
- D.萎缩性阴道炎
- E.非特异性外阴炎

100.女, 28 岁, 工人, 扎辫。下作时不慎致头皮撕脱, 查体痛苦面容, 半侧颅骨(仅存骨膜)裸露, 创面及撕脱的头皮清洁, 其最理想的处理方法是(D)

- A.在颅骨上钻孔、待肉芽生长后植皮
- B.将头皮血管吻合再植
- C.将撕脱的头皮直接缝回
- D.将脱的头皮做成全厚皮片植回
- E.将撕脱的头皮做成中厚皮片植回

101.男, 18 岁, 进行性全身水肿 1 周, 无发热、皮疹及关节痛。查体 BP 110/70mmHg。面及双下肢重度凹陷性水肿, 移动性浊音(+).

尿沉渣镜检 RBCO~2/HP.尿蛋白定量 5.6g/d, 血肌酐 68 umol/L, 白蛋白 21g/L。乙型肝炎病毒标志物阴性, 该患者最可能的肾脏病理诊断为 (D)

- A.膜增生性肾小球肾炎
- B.毛细血管内增生性肾炎
- C.膜性肾病
- D.微小病变型肾病
- E.IgA 肾病

102.女, 28 岁, G2P1。停经 2 月余, 阴道少量流血 10 天。妇科检查宫体如 4 个月妊娠大小。B 超显示宫腔内充满落雪状光点, 未测到胎体和胎盘回声, 双附件区探及直径 5Cm, 大小无回声包块, 初步诊断是(D)

- A.双侧卵巢肿瘤
- B.稽留流产
- C.羊水过多
- D.葡萄胎
- E.绒癌

103.女, 22 岁。面色苍白 1 年余, 既往月经量多 2 年。血常规 Hb 75g/L, WBC 6.7X10<sup>9</sup>/L, Plt 220X10<sup>9</sup>/L.骨髓细胞学检管: 增生活跃, 红系增生为主, 中、晚幼红比值增高, 成熟红细胞大小不均, 以小细胞为主, 中心淡染区扩大。首选的治疗是(A)

- A.口服铁剂
- B.补充维生素 B12、叶酸
- C.口服雄性激素
- D.口服泼尼松
- E.输注红细胞

104.女, 65 岁, 反复腹痛伴停止排气排便 5 天, 少尿 2 天。查体 T37.8°, P111 次/分。R22 次/分, BP80/50mmHg, 全腹膜隆, 全腹无压痛、反跳痛, 未触及包块, 肠鸣音减弱。电 解 质 K+2.35mmo1/L, Na+137mmoL, Cl-106mmo1/L。以下治疗决策中正确的是(B)

- A.静脉少量补充氯化钾溶液
- B.见尿后补钾
- C.静脉大量补氢氧化钾溶液
- D.利尿后补钾

E.口服补钾

105.女,35岁。心悸、消瘦6个月,高热、腹泻、瞻妄1天。查体T40.2°,BP 90/60mmHg,大汗,甲状腺Ⅱ度肿大,可闻及血管杂音,双肺未闻及干湿性啰音,心率200次/分,心律绝对不齐,应首先考虑的诊断是(A)

- A.甲状腺危象
- B.感染性休克
- C.甲状腺功能亢进症合并肠炎
- D.甲亢性心脏病
- E.急抗甲状腺炎

106.男婴,8个月,发热3小时,体温39.3°,就诊过程中突然双眼上翻,肢体强直。持续半分钟后缓解。查体:充血,肺、心、腹及神经系统无异常。2个月前曾有同样发作,其表现考虑为(B)

- A.病毒性脑炎
- B.热性惊厥
- C.癫痫
- D.结核性脑膜炎
- E.中毒性脑病

107.男,65岁,左腹股沟可复性斜疝,拟于硬膜外麻醉下手术治疗。自服阿司匹林1年,术前需停用阿司匹林的时间至少是(C)

- A.2天
- B.3天
- C.7天
- D.5天
- E.10天

108.女孩。3岁,发热、咳和气促1周,查体:精神不振,面色苍白,呼吸急促,皮肤可见荨麻疹样皮疹,双肺可闻及细湿啰音。胸部X线片示双肺多发性小脓肿。最可能的诊断是(B)

- A.肺炎支原体肺炎
- B.金黄色葡萄球菌肺炎
- C.流感血杆菌肺炎
- D.呼吸道合胞病毒肺炎
- E.腺病毒肺炎

109.女,65岁。间歇全程肉眼血尿2个月,尿呈洗肉水样。无尿频、尿急、尿痛,间断出现,近日血尿加重,配偶吸烟,最可能的疾病是(A)

- A.膀胱癌
- B.膀胱炎
- C.肾盂肾炎
- D.尿路结石
- E.肾癌

(110-111题共用题干)女,28岁,停经45天,右下腹剧烈疼痛1小时伴晕厥,平素月经规律。

110.首先考虑的诊断是(A)

- A.输卵管妊娠破裂
- B.急性阑尾炎
- C.卵巢囊肿带扭转
- D.不全流产
- E.急性输卵管炎

111.对该患者采取的处理措施不正确的是(D)

- A.剖腹检查术
- B.立即补液
- C.腹腔镜手术
- D.继续观察
- E.立即配血

(112~114题共用题干)

女,71岁,3小时前不慎摔伤左髌部。既往体健、查体左下肢短缩2cm,外旋50°畸形,左髌部肿胀不明显,轴向叩痛(+),

112.最可能的诊断是(B)

- A.髌关节前脱位
- B.股骨颈骨折
- C.髌关节后脱位
- D.髌部软组织损伤
- E.段骨转子间骨折

113.为明确诊断首先要进行的检查是(C)

- A.B超
- B.MR]
- C.X线片

D. CT

E.核素扫描

114.首选的治疗方法是(E)

A.左下肢骨牵引

B.药物治疗

C.左下肢皮牵引

D.髋部石膏固定

E.尽早手术治疗

(115~117 题共用题干)

女, 28 岁, 初孕妇, 妊娠 35 周, 双下肢水肿 20 天, 持续性头痛 2 天, 既往血压正常。查体 BP160/100mmHg, 尿蛋白(++).

115.最可能的诊断是(B)

A.子痫

B.子痫前期重度

C.妊娠期高血压

D.子痫前期轻度

E.慢性高血压合并妊娠

116. 次日, 孕妇突发持续性腹痛、恶心呕吐伴阴道少量流血, BP120/60mmHg, 宫底剑突下, 子宫硬如板状, 胎位触不清, 宫口未开, 此时最可能发生的情况是(A)

A.胎盘早剥

B.临产

C.急性胃肠炎

D.先兆流产

E.前置胎盘

117.应采取的处理措施是(E)

A.缩宫素静脉滴注

B.前列腺素促宫颈成熟

C.人工破膜引产

D.地西泮静脉推注

E.尽快剖宫产

(118-119 题共用题干)

男, 11 岁, 发作性“发呆”1 年。发作时手中持物掉落。不伴跌倒, 每次约数秒钟, 清醒后对发作无记忆, 足月顺产。既往无脑外伤史, 智力发育正常。神经系统查体未见

阳性体征, 头颅 CT 检查未见异常。

118.最可能的诊断是(C)

A.短暂性脑缺血发作

B.假性痫性发作

C.癫痫失神发件

D.晕厥

E.癫痫简单部分性发作

119.对诊断最有价值的检查是(B)

A.心电图

B.脑电图

C.头颅 MRT

D.经颅多普勒

E.头颅 CT

(120-121 越共用题干)

女, 17 岁。间断关节痛 1 个月, 伴面部红斑, 脱发和口腔溃疡, 既往有日晒后皮肤瘙痒 1 年余。实验室检查 血 Hb 101g/L, WBC 3.54X 10<sup>9</sup>/L, P1t 163X 10<sup>9</sup>/L, 尿常规(-), ESR42mm/h, ANA(+), 抗 SSA 抗体(+), 血清 C3 降低。

120.最可能的诊断是(A)

A.系统性红斑狼疮

B.类风湿关节炎

C.白塞病

D.皮炎炎

E.干燥综合征

121.该患者的基础治疗药物是(A)

A.硫酸羟氯喹

B.环磷酰胺

C.甲氨蝶呤

D.头孢曲松

E.扑尔敏

(122-123 题共用想干)

男, 22 岁。乏力、消瘦、腹胀 4 个月, 查体肝肋下 ICm, 实验室检查血 Hb110g/L.W8C 96.0×10<sup>9</sup>L, Plt 196×10<sup>9</sup>/L。骨髓细胞 Ph 染色体阳性。

122. 该患者最可能的诊断是(E)

- A. 慢性淋巴细胞白血病
- B. 急性淋巴细胞白血病
- C. 肝硬化, 门静脉高压症
- D. 急性粒细胞白血病
- E. 慢性粒细胞白血病

123. 下列治疗措施中应前途(E)

- A. 口服苯丁酸银芥
- B. 长春新碱和泼尼松治疗
- C. 柔红霉素和阿糖胞苷治疗
- D. 脾切除
- E. 口服羟基脲

(124-126 a 共用题干)

女孩, 2岁。发热伴咳嗽、咳痰4天, 查体 T38.8°C,

P132次/分。R42次/分, 轻度鼻扇, 双肺闻及中细湿啰

音, 腹稍胀, 肝肋下2Cm, 胸部X线片见双下肺模糊图

片状影。实验室检查, 血 WBC 13.5X10<sup>9</sup>/L, N 0.72, L0.28.

124. 最可能的诊断是(B)

- A. 支气管炎
- B. 支气管肺炎
- C. 间质性肺炎
- D. 毛细支气管炎
- E. 大叶性肺炎

125. 首选的治疗药物是(D)

- A. 阿奇霉素
- B. 万古霉素
- C. 苯唑西林钠
- D. 阿莫西林
- E. 利巴韦林

126. 治疗中患儿呼吸困难加重, 呕吐少许咖啡样物, 查体, P140次/分, R46次/分, 严重腹胀, 听诊肠鸣音消失, 考虑患儿最可能发生{ (A)

A. 中毒性肠麻痹

B. 感染性休克

C. 脑性低钠血症

D. 中毒性脑病

E. 心力衰竭

《127~128 题共用题干)

男, 45岁。近10年间断出现情绪低落, 高兴不起来。话少, 兴趣减退, 对既往喜欢的事情也不愿去做, 脑子反应迟钝, 记忆力下降记不清东西工作效率低下降, 记不住事情, 工作效率低, 伴有躯体不适, 感觉浑身无力、头痛; 胃不舒服, 食欲减退, 睡眠差, 主要为早醒; 存在悲观厌世, 觉得活着没意思; 曾多次自杀未遂, 每次发作持续1~3个月; 缓解期生活、工作如常; 近一个月复发, 症状表现如既往发作, 但更严重。

127. 该患者首先要考虑的诊断是(B)

- A. 恶劣心境
- B. 复发性抑郁障碍
- C. 双相障碍抑郁发作
- D. 躯体形式障碍
- E. 脑衰弱综合征

128. 针对该患者, 首选的治疗是(B)

- A. 大剂量抗精神病药治疗
- B. 电抽搐治疗
- C. 大剂量苯二氮草类药物治疗
- D. 大剂量抗抑郁药治疗
- E. 心理治疗

(129~131 题共用题干)

女, 45岁, G2P2。痛经进行性加重伴经量增多6年, 妇科检查宫体均匀增大如3个月妊娠大小, 质硬, 压痛(+). 血 Hb 64g/L.

129. 该患者最可能的诊断是(B)

- A. 子宫肉瘤
- B. 子宫腺肌病
- C. 子宫内膜癌
- D. 子宫肌瘤
- E. 功能失调性子宫出血

130. 该患者首选的辅助检查是(A)

- A.B 超检查
- B. MRI
- C.PET-CT 检查
- D.宫腔镜
- E.诊断性刮宫

**B1 型选择题(131-150 题)**

(131-132 题共用备选答案)

- A.TSH 受体抗体(TRAB)
- E.游离甲状腺素(FT4)
- C.促甲状腺素(TSH)
- D.碘 131 摄取率
- E.游高三碘甲腺原氨酸(FT3)

131.反映甲状腺功能变化最早期敏感指标是 (C)

132.诊断弥漫性毒性甲状腺肿 (GD), 预测 GD 复发的重要指标是(A)

(133-134 题共用备选答案)

- A.思维贫乏
- B.病理性赘述
- C.思维迟缓
- D.思维散漫
- E.思维破裂

133.病人在回答问题时需要医生反复提醒才能勉强回答, 且语速慢, 语量少, 声音低微。该症状是(A)

134.病人在途述一件事时思路曲折, 加入许多不必要的细节, 坚持定要按他原来的方式讲完, 最终才回到主题上来, 该症状是(B)

(135-136 题共用备选答案)

- A.骨关节炎
- B.强直性脊柱炎
- C.暂缺

(141-142 题共用备选答案)

- A.房间隔缺损

- B.室间隔缺损
- C.动脉导管未闭
- D.法洛三联症
- E.主动脉缩窄

141.肺动脉瓣区第一心音(P2)亢进、固定分裂见于(A)

142.肺动脉瓣区第二音(P2)减低见于(D)

(143-144 题共用备选答案)

- A.膀胱根治切除术
- B.姑息性放疗
- C.经尿道膀胱肿瘤电切术
- D.膀胱部分切除术
- E.经尿道膀胱肿瘤电切+膀胱灌注化疗

143.单发 Ta 期膀胱尿路上皮癌。首选的治疗方法是(E)

144.T3 期膀胱尿路上皮癌, 首选的治疗方(A)

(145-146 题共用备选答案)

- A.头面部
- B.下肢
- C.胸腹部
- D.项背部
- E.臀部

145.痈的好发部位是(D)

146.丹毒的好发部位是(B)

(147-148 题共用备选答案)

- A.格列美脲
- B.阿卡波糖
- C.二甲双胍
- D.吡格列酮
- E.瑞格列奈

147.促进早期胰岛素分泌的口服降糖药是 (E)

148.主要减少肝糖输出的口服降糖药是(C)

(149-150 题共用备选答案)

- 
- A.肾前性急性肾损伤
  - B.急性肾小管坏死
  - C.急性间质性肾炎
  - D.急进性肾小球肾炎
  - E.肾后性急性肾损伤

149.因"急性肠炎"静脉输注庆大霉素 1 周后出现少尿，尿钠 $>40\text{mmol/L}$ 。少尿最可能的原因是（B）

150.肝硬化伴大量腹水，进行性尿量减少 1 周，尿比重 1.030，尿红细胞(-)，蛋白(-)，少尿最可能的原因是(A)

