

# 2022年临床医师资格助理押题

## 第一单元

### A1型题

#### 答题说明

每一道题下面有A、B、C、D、E五个备选答案,请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

- 下列哪项为诊断慢性阻塞性肺疾病(COPD)的必要条件是  
A.胸部X线片示肺纹理增粗紊乱  
B.肺功能检查示阻塞性通气功能障碍  
C.高分辨CT示肺气肿改变  
D.长期大量吸烟史  
E.慢性咳嗽、咳痰病史
- 下列哪项是急性肺源性心脏病最常见的病因  
A.重症肺结核  
B.支气管哮喘  
C.肺血栓栓塞  
D.过敏性肺炎  
E.慢性阻塞性肺疾病
- 下列关于支气管哮喘的肺功能异常,主要表现在  
A.肺活量减少  
B.最大通气量增加  
C.第一秒用力呼气容积减少  
D.弥散量减少  
E.功能残气量减少
- 下列哪项是典型支气管哮喘发作时最主要的临床表现  
A.吸气性呼吸困难,双肺哮鸣音  
B.呼气性呼吸困难,双肺哮鸣音  
C.端坐呼吸,双肺密布中小水泡音  
D.呼气性呼吸困难,双肺散在干、湿啰音  
E.进行性呼吸困难,肺部局限性哮鸣
- 痰呈铁锈色最常见于下列  
A.肺炎链球菌肺炎  
B.肺炎支原体肺炎  
C.葡萄球菌肺炎  
D.肺炎克雷伯杆菌肺炎  
E.病毒性肺炎
- 下列哪项是由胰岛A细胞分泌的激素  
A.胰高糖素  
B.胰岛素  
C.促胃液素  
D.胰多肽  
E.生长抑素
- 库欣综合征常见的面容是  
A.惊恐面容  
B.丑陋面容  
C.苦笑面容  
D.满月脸  
E.黏液水肿面容
- 下列哪项检查可发现局限黏膜的早期食管癌  
A.内镜检查  
B.脱落细胞检查  
C.超声波断层检查  
D.甲胎蛋白定量测定  
E.选择性动脉造影
- 应激性溃疡发病基础不包括下列  
A.重度烧伤  
B.慢性胃炎  
C.颅内手术  
D.重度创伤  
E.脓毒血症
- 下列对肝硬化门静脉高压诊断最有价值的是  
A.超声示肝脏回声不均匀  
B.蜘蛛痣  
C.肝功能异常  
D.钡餐示食管下段有蚯蚓样充盈缺损  
E.脾大
- 下列不属于胃大部切除术后远期营养性并发症的是  
A.巨幼红细胞性贫血  
B.骨质疏松  
C.脂肪泻  
D.低血糖  
E.骨质软化
- 下列考虑为胃癌的临床表现是  
A.进行性吞咽困难  
B.餐后上腹部胀痛伴暖气

- C. 反复反酸、烧心伴胸痛  
D. 腹痛伴体重减轻  
E. 频发恶心呕吐
13. 引起左心室后负荷增高的主要因素是  
A. 回心血量增加  
B. 体循环高压  
C. 主动脉瓣关闭不全  
D. 肺循环高压  
E. 血细胞比容增大
14. 心力衰竭最常见最重要的诱因是  
A. 心房颤动  
B. 呼吸道感染  
C. 血容量增加  
D. 过度疲劳  
E. 甲亢
15. 下列心律失常, 表现为心律不整齐的是  
A. 室性期前收缩  
B. 一度房室传导阻滞  
C. 窦性心动过速  
D. 窦性心动过缓  
E. 阵发性室速
16. 下列哪项不属于支气管扩张并发症  
A. 肺部感染  
B. 肺脓肿  
C. 肺源性心脏病  
D. 气胸  
E. 肺梗塞
17. 下列哪项不属于支气管哮喘并发症  
A. 气胸  
B. 纵隔气肿  
C. 肺不张  
D. 慢性支气管炎  
E. 支气管扩张
18. 下列可引起胸壁反常运动的损伤是  
A. 自发性气胸  
B. 开放性气胸  
C. 闭合性气胸  
D. 张力性气胸  
E. 多发肋骨骨折
19. 下列选项中, 不是感染性血胸征象的是  
A. 畏寒、高热  
B. 胸腔积液混浊、絮状  
C. 胸水红、白细胞比例达 500: 1  
D. 涂片、培养发现致病菌有助于诊断  
E. 超声检查胸腔内液性暗区
20. 下列情形中, 通过氧疗最难纠正的呼吸衰竭是  
A. 弥散功能障碍  
B. 肺通气不足  
C. 通气/血流比例失衡  
D. 严重功能性分流  
E. 发热、氧耗量增加
21. 下列不符合慢性硬膜下血肿的诊断是  
A. 好发于40岁以下  
B. 有慢性颅内压增高症状  
C. 血肿压迫所致的局灶症状  
D. 精神失常  
E. 视乳头水肿
22. 不属于思维内容障碍的是  
A. 思维散漫  
B. 被监视感  
C. 被洞悉感  
D. 被控制感  
E. 罪恶妄想
23. 缺铁性贫血早期最可靠的依据是  
A. 血清铁减少  
B. 血清铁蛋白降低  
C. 血清总铁结合力增高  
D. 运铁蛋白饱和度降低  
E. 红细胞减少
24. 慢性再生障碍性贫血病人最常见的感染是  
A. 败血症  
B. 肠道感染  
C. 尿路感染  
D. 上呼吸道感染  
E. 皮肤感染
25. 血小板输注禁忌证  
A. 化疗导致的血小板减少  
B. 血小板功能障碍  
C. 大量输注悬浮红细胞稀释血小板减少  
D. 血栓性血小板减少性紫癜  
E. 放疗导致的血小板减少
26. 成人无移位的锁骨骨折的治疗  
A. 三角巾悬吊患肢  
B. 小夹板固定  
C. 牵引固定  
D. 横8字绷带固定  
E. 切开复位内固定
27. 治疗骨关节炎的首选药物  
A. 对乙酰氨基酚  
B. 非甾体抗炎药

- C. 糖皮质激素  
D. 氨基葡萄糖  
E. 透明质酸钠
28. 急性痛风性关节炎的主要临床特点不包括  
A. 秋水仙碱治疗可迅速缓解关节炎症状  
B. 常伴高尿酸血症  
C. 单侧第一掌指关节肿痛最为常见  
D. 在偏振光显微镜下, 关节液内发现呈双折光的针形尿酸结晶  
E. 多在午夜或清晨突然起病
29. 系统性红斑狼疮的心血管损害中最多见  
A. 心肌炎  
B. 心内膜炎  
C. 心包炎  
D. 心功能不全  
E. 心瓣膜
30. 关于脂肪肝的影像学表现下列错误的是  
A. CT平扫表现为肝脏密度普遍高于脾脏  
B. B超表现为肝区近场弥漫性点状高回声  
C. B超可表现肝脏轻度或中度肿大, 肝前缘变钝  
D. CT平扫肝脏密度可以呈负值  
E. B超可表现为肝内管道结构显示不清
31. 下列对细菌性肝脓肿描述错误的是  
A. 起病急骤, 常伴有全身脓毒血症  
B. 肝穿刺可为黄白色脓液  
C. 右肋缘下常可触及肿大肝脏  
D. B超常表现为孤立巨大脓肿  
E. 寒战高热为最初症状
32. 下列不符合急性胰腺炎腹痛特点的是  
A. 腹痛多位于中上腹  
B. 常发生在暴饮暴食之后  
C. 口服654-2效果差  
D. 通常在呕吐后症状缓解  
E. 应用吗啡类镇痛药物可能导致腹痛加剧
33. 嵌顿疝与绞窄疝的鉴别要点是  
A. 深(内) 环口的大小  
B. 有无休克  
C. 疝气的位置  
D. 有无肠梗阻  
E. 有无血液循环障碍
34. 腹部外伤伴有内出血休克, 最有价值的处理原则是  
A. 补充液体  
B. 给予镇静剂  
C. 使用血管活性物质  
D. 控制感染  
E. 抗休克同时手术探查
35. 治疗社区获得性肺炎时, 可覆盖非典型病原体的抗生素是  
A. 头孢菌素类  
B. 糖肽类  
C. 青霉素类  
D. 大环内酯类  
E. 氨基糖苷类
36. 在我国, 当前结核病疫情仍很严峻, 以下哪一项不是疫情表现  
A. 高感染率及高患病率  
B. 高耐药率  
C. 死亡人数多  
D. 中青年患病多  
E. 地区患病差别不大
37. 预后最差的肺癌类型是  
A. 鳞状细胞癌  
B. 小细胞肺癌  
C. 腺癌  
D. 大细胞癌  
E. 细支气管肺泡癌
38. 进行性血胸征象下列错误的是  
A. 持续脉搏加快、血压降低  
B. 虽然补充血容量血压仍不稳定; 或血压升高后又下降  
C. 血红蛋白量、红细胞计数和血细胞比容进行性降低  
D. 闭式胸腔引流量每小时超过200ml, 不连续流出3小时以上  
E. 由于血液凝固, 虽然胸穿或引流均无液体流出, 但是X线检查胸腔积液影继续增大
39. 关于纵隔肿瘤叙述错误的是  
A. 神经源性肿瘤多位于后纵隔脊柱旁肋脊区  
B. 畸胎瘤与皮样囊肿多位于前纵隔  
C. 胸腺瘤多位于后上纵隔  
D. 支气管囊肿因胚胎发育过程中部分胚细胞异位而引起, 属良性  
E. 胸骨后甲状腺肿多位于前纵隔
40. 高血压患者的治疗, 错误的是  
A. 饮酒量每日不超过相当于50g乙醇的量  
B. 每人每日食盐量不应超过6g  
C. 低或中度强度的运动  
D. 体重指数BMI控制在30 以下  
E. 膳食中脂肪量控制在总量的25%以下
41. 血管紧张素转换酶抑制剂最适用的临床情况是  
A. 高血压伴主动脉瓣狭窄  
B. 妊娠期高血压

- C. 高血压伴左心室肥厚  
 D. 高血压伴高血钾血症  
 E. 高血压伴双侧肾动脉狭窄
42. 变异型心绞痛的治疗宜选用  
 A. 普罗帕酮  
 B. 地尔硫草  
 C. 美托洛尔  
 D. 普萘洛尔  
 E. 胺碘酮
43. 扩张型心肌病典型的超声心动图改变是  
 A. 收缩期心尖部向外膨出  
 B. 瓣膜增厚、钙化、僵硬、瓣口开放受限  
 C. 心腔扩大, 室壁运动弥漫减弱, 瓣口开放小  
 D. 舒张期室间隔厚度与左室后壁之比大于等于1.3  
 E. 收缩期二尖瓣前叶向前运动
44. Pratt 实验的目的是  
 A. 深静脉是否通畅  
 B. 检测交通静脉功能  
 C. 检测血供是否充足  
 D. 检测桡骨茎突是否骨折  
 B. 检测大隐静脉与深静脉交通瓣功能
45. 肺心病患者失代偿期典型的体征是  
 A. 明显发绀  
 B. 球结膜充血水肿  
 C. 皮肤潮红  
 D. 肝界下移  
 E. 肝颈静脉回流征阳性
46. 慢性阻塞性肺疾病常见的并发症不包括  
 A. 慢性肺源性心脏病  
 B. 自发性气胸  
 C. 右心功能不全  
 D. 肺梗塞  
 E. 慢性呼吸衰竭
47. 关于支气管扩张诱因不正确的是  
 A. 婴幼儿期麻疹  
 B. 支气管感染病史  
 C.  $\alpha$ -1-抗胰蛋白酶缺乏  
 D. 支气管哮喘  
 E. 软骨缺陷
48. 下列与结核性胸腔积液不相符的是  
 A. 胸水密度为1.019  
 B. 胸水蛋白含量为32g/L  
 C. 胸水腺苷脱氨酶为35U/L  
 D. 胸水乳酸脱氢酶水平/血清水平为70%  
 E. 胸水细胞数为 $600 \times 10^6/L$
49. 肺癌的病理分型中较常见的是  
 A. 小细胞癌  
 B. 大细胞癌  
 C. 混合型癌  
 D. 腺癌  
 E. 几率均等

## A2型题

### 答题说明

每一道题下面有A、B、C、D、E五个备选答案,请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

50. 男,35岁.不慎跌倒摔伤左肩,以右手托左肘部来诊.头向左倾,查体见左肩下沉,左上肢功能障碍.胸骨柄至左肩峰连线中点隆起,并有压痛,其可能的诊断是  
 A. 肱骨外科颈骨折  
 B. 锁骨骨折  
 C. 肩关节脱位  
 D. 肩胛骨骨折  
 E. 锁骨脱位
51. 男,25岁,车祸致伤.查体见肋骨挤压分离试验阳性,下腹压痛,腹肌紧张.对腹腔脏器损伤诊断最有价值的检查方法  
 A. 腹部B超  
 B. 腹部X线片  
 C. 腹部CT  
 D. 腹部MRI  
 E. 腹腔穿刺
52. 男,44岁.男,60岁.颈肩痛2个月,向左上肢放射.左上肢肌力下降,手指动作不灵活,无走路不稳、头痛、视力下降及眩晕、猝倒症状。检查发现颈肩部压痛,神经牵拉试验及压头试验阳性,最可能的诊断是  
 A. 交感神经型颈椎病  
 B. 脊髓型颈椎病  
 C. 椎动脉型颈椎病  
 D. 神经根型颈椎病  
 E. 混合型颈椎病

53. 男性, 60岁. 近两个月来常有吞咽困难, 伴隐痛, 但可进半流质饮食, 自感体力不支, 逐渐消瘦. 经检查见食管病变位于胸廓入口到主动脉弓平面, 该部位是食管解剖分段的

- A. 颈段
- B. 胸上段
- C. 胸中段
- D. 胸下段
- E. 腹段

54. 男性, 35岁. 突发上腹刀割样剧痛2小时来诊, 查体: 体温38.2, 脉搏120次/分, 血压90/70mmHg, 腹平坦, 左上腹肌略紧张, 局部压痛, 全腹有反跳痛, 有移动性浊音(+), 肝浊音界消失, 听诊未闻及肠鸣音. 首选的检查是

- A. 立位X线腹部透视
- B. 腹部B部
- C. 腹部 CT
- D. 无创钡剂造影
- E. 诊断性腹穿

55. 52岁, 肝硬化病史7年, 大量放腹腔积液后出现睡眠障碍, 扑翼样震颤, 脑电异常最可能的诊断是

- A. 肝性脑病1期
- B. 肝性脑病2期
- C. 肝性脑病3期
- D. 肝性脑病4期
- E. 亚临床肝性脑病

56. 男性, 44岁, 既往乙肝病史10年, 水肿、乏力、腹胀3个月, 查体: 全身水肿, 腹壁静脉曲张, 移动性浊音(+), 下列哪项与该患者腹腔积液形成无关

- A. 钠与水的潴留
- B. 毛细血管滤过压增高
- C. 血管通透性增加
- D. 血浆胶体渗透压降低
- E. 淋巴液生成过多

57. 男, 27岁. 肛门持续剧痛20小时. 查体: T36.6, P83次/分, BP 121/80mmHg, 双肺呼吸音清, 未闻及干湿性啰音, 心律齐, 腹软, 无压痛, 未触及包块, 肛门口有直径1.0cm的肿物. 呈暗紫色、质硬, 触痛明显. 最可能的诊断是

- A. 内痔脱出
- B. 肛周脓肿
- C. 肛裂
- D. 直肠息肉
- E. 血栓性外痔

58. 女, 38岁. 紧箍样头痛3天. 无恶心、畏光、畏声. 常在焦虑时发生. 最可能的诊断是

- A. 紧张型偏头痛
- B. 血管性头痛
- C. 无先兆偏头痛
- D. 有先兆偏头痛
- E. 颈椎病

59. 男, 13岁, 小学勉强毕业, 现读初一. 学习成绩差不合群, 且经常遭班里同学欺负, 不愿去上学. 精神检查发现患儿抽象思维能力、计算力、判断力均较差, 言语表达词汇贫乏. IQ 60. 该患儿的诊断是

- A. 儿童孤独症
- B. 边缘智力
- C. 中度精神发育迟滞
- D. 儿童厌学症
- E. 轻度精神发育迟滞

60. 男, 45岁. 低热, 头痛, 思睡, 说在墙壁上看到了妖怪, 有人要害他, 感觉被监视、被隔离. 表现为昼轻夜重. 该患者属于

- A. 妄想状态
- B. 关系妄想
- C. 意识障碍
- D. 蒙胧状态
- E. 谵妄状态

61. 男, 35岁. 4个月来工作较累, 近4周出现心情不好、兴趣缺乏、易疲劳、言语少、动作迟缓, 自觉脑子笨、没有以前聪明, 早醒、食欲减退、腹胀、便秘、全身酸痛, 有时感心慌气紧. 总觉得自己患了不治之症, 给家庭带来许多麻烦. 你认为该患者最可能的诊断是

- A. 焦虑症
- B. 神经衰弱
- C. 疑病症
- D. 抑郁症
- E. 甲状腺功能下降

62. 男, 40岁. 因工作压力大, 多年来经常反复出现心烦、心跳过速、胸部不适、出汗, 经心电图、血压、血脂、心脏多普勒检查均正常. 该患者有可能为

- A. 躯体疾病
- B. 心身障碍
- C. 心理症状
- D. 神经衰弱
- E. 帕金森病早期

63. 女, 72岁. 12年前因心肌梗死住院, 5年前出现活动后气短, 夜间憋醒, 近1年双下肢水肿, 少尿. 查体: BP 140/90mmHg, 颈静脉怒张, 双下肺可闻及细湿啰音,

心界向两侧扩大,心率110次/分,肝肋下3cm,质中,压痛(+),双下肢水肿.该患者可能的诊断是

- A.左心衰竭
- B.全心衰竭
- C.心肌梗死
- D.右心衰竭
- E.心包积液

64.男,65岁,阵发性心悸1年,加重1周.既往有高血压糖尿病病史.查体:心率120次/分,律不齐,第一心音强弱不等,心尖部可闻及舒张期隆隆样杂音,超声心动图示左房内径60mm,该患者最适宜的抗栓治疗药物

- A.潘生丁
- B.氯吡格雷
- C.华法林
- D.普通肝素
- E.阿司匹林

65.女,19岁.活动后胸闷,气短3天.3周前曾咳嗽、持续发热1周.既往体健.查体:面色苍白、双肺呼吸音清,心界向左下扩大,心率120次/分,频发早搏,第一心音减弱,P<sub>2</sub>>A<sub>2</sub>,心尖区可闻见2/6级收缩期杂音.实验室检查:血肌钙蛋白增高.该患者最可能的诊断是

- A.病毒性心肌炎
- B.急性心肌梗死
- C.急性肺栓塞
- D.慢性心力衰竭
- E.感染性心内膜炎

66.男,41岁.3年来经常夜间上腹不适,2日前进油腻食物,突然右上腹部阵发性绞痛伴恶心,入院时体温38,巩膜轻度黄染,有上腹肌紧张,压痛明显,肠鸣音弱,WBC $16 \times 10^9/L$ ,血清淀粉酶为128温氏单位,应首先考虑诊断的疾病是

- A.急性阑尾炎
- B.急性胰腺炎
- C.溃疡穿孔
- D.急性化脓性胆囊炎
- E.胆道蛔虫症

67.女,46岁.阵发性腹痛7天,伴呕吐3天入院,无发热.体格检查:腹膨隆,见肠型,肠鸣音亢进,有气过水声,腹部平片见有多个液平,阶梯状.可能的诊断是

- A.高位小肠梗阻
- B.低位小肠梗阻
- C.结肠梗阻
- D.坏死性小肠炎
- E.结肠癌

68.男,28岁.低热、腹痛、腹泻伴腹胀2个月.查体:腹壁揉面感,腹部移动性浊音阳性.腹水为渗出液.为明确诊断,下列检查最有价值的是

- A.血培养
- B.结核菌素试验
- C.腹膜活检
- D.腹水细菌培养
- E.CT

69.男,50岁.烦躁、昼睡夜醒2天.肝炎肝硬化病史5年.对明确意识障碍病因最有意义的实验室检查是

- A.血糖
- B.ALT/AST
- C.血清蛋白电泳
- D.血氨
- E.血电解质

70.女患,50岁.皮肤、巩膜黄染3个月.大便颜色变浅,无腹痛及发热.查体:皮肤、巩膜黄染,,右上腹触及囊性包块,,无压痛.腹部B超示:胆总管扩张,胆囊大,胰腺显示不清.该患者最可能的诊断是

- A.胆总管结石
- B.胆囊癌
- C.慢性胆囊炎
- D.慢性胰腺炎
- E.壶腹周围癌

71.女,32岁.表现紧张恐惧,坐立不安,有大祸临头之感,惶惶不可终日,说不出具体原因,属于

- A.焦虑
- B.恐惧
- C.情感暴发
- D.易激惹
- E.情感不稳

72.女,28岁.突发剧烈头痛、呕吐5小时.查体:神志清楚,躁动,颈项强直,深反射亢进,克氏征阳性.头颅CT示侧裂池、环池内高密度影.首先考虑的诊断是

- A.硬脑膜下血肿
- B.脑积水
- C.蛛网膜下腔出血
- D.脑膜炎
- E.脑炎

73.男,55岁.有长期饮酒史,近期出现严重的记忆力障碍,遗忘、错构、虚构和定向力障碍,此为

- A.Wernicke脑病
- B.科萨科夫综合征
- C.精神发育迟滞
- D.老年性痴呆

## 临床医师资格笔试各单元考试科目及分值

### 西医执业医师资格考试内容(仅供参考)

第一单元	基础100、少部分其他临床部分
第二单元	循环45、泌尿35、血液25、运动20、内分泌20、风湿5
第三单元	消化80、呼吸40、其他15、传染15
第四单元	妇产70、儿科50、精神30

### 西医助理医师资格考试内容(仅供参考)

第一单元	消化40、循环23、精神22、呼吸20、 运动15、血液13、内分泌12、风湿5
第二单元	基础60、妇产30、儿科25、泌尿15、其他10、传染10

E. Ganser 综合征

74. 男, 17岁, 高三学生. 既往学习成绩一贯优良, 品德良好. 据父母反映该生近半年来, 可能因为学习任务太重, 高考压力太大, 出现学习成绩明显下降, 且变得孤僻不与人交往, 对父母态度冷漠又粗暴, 失眠, 有时自语自笑. 精神检查时, 该学生回答问题词语单调, 对上述表现回答说压力太大、脑子变得空白、听不进老师讲课、记忆力变差, 回答时面无表情. 该学生最可能的诊断是

- A. 焦虑症
- B. 抑郁症
- C. 精神分裂症
- D. 神经衰弱
- E. 帕金森病

75. 男, 26岁. 近1个月来兴高采烈, 话多, 自觉脑子聪明, 无疲倦感. 其主要表现为

- A. 焦虑症状
- B. 不协调性精神运动兴奋
- C. 协调性精神运动兴奋
- D. 强迫症状
- E. 思维内容障碍

76. 女, 35岁. 发现左颈部前一无痛性肿块一年, 约1cm大小, 近一个月来出现声音嘶哑. 查体: 甲状腺左下极质硬结节, 随吞咽活动, 颈部未触及肿大淋巴结. 最可能诊断

- A. 甲状腺囊肿
- B. 甲状腺舌骨囊肿
- C. 甲状腺癌
- D. 甲状腺腺瘤
- E. 结节性甲状腺肿

77. 男, 30岁. 反复剑突下疼痛3年, 呕吐10天. 呕吐物有隔夜宿食, 该患者可能存在的主要电解质和酸碱平衡失调紊乱是

- A. 低血钾, 代谢性碱中毒
- B. 低血钾, 代谢性酸中毒
- C. 低氯性酸中毒
- D. 高血钾, 代谢性酸中毒
- E. 高血钾, 代谢性碱中毒

78. 男, 55岁. 3个月来乏力、面色苍白, 体重下降6kg. 腹部时有隐痛. 化验检查: Hb60g/L, RBC $3.1 \times 10^{12}/L$ , WBC  $8.2 \times 10^9/L$ , Plt  $310 \times 10^9/L$ , 外周血涂片见红细胞中心淡染区扩大. 为寻找贫血的原因, 首选的检查

- A. 骨髓检查
- B. 血清铁蛋白

C. 尿常规

D. 大便潜血试验

E. 红细胞游离原卟啉

79. 女, 25岁. 面色苍白、乏力、心悸1周. 实验室检查: Hb 60g/L, WBC  $9.4 \times 10^9/L$ , PLT  $212 \times 10^9/L$ , 网织红细胞0.12, Coombs 试验阳性. 该患者首选的治疗措施是

- A. 输注红细胞
- B. 应用环孢素A
- C. 应用硫唑嘌呤
- D. 脾切除
- E. 应用糖皮质激素

80. 女, 25岁, 发热伴下肢和腹部皮肤瘀斑5天, 查体: 双下肢和腹部皮肤有多处瘀斑, 双侧颈部、腋窝和腹股沟可触及淋巴结肿大, 活动无压痛, 最大者为2cm × 2.5cm, 胸骨压痛(+), 腹软, 肝肋下1.5cm, 脾肋下2cm, 化验: Hb78g/L, WBC $18 \times 10^9/L$ , 分类可见原始和幼稚细胞, PLT  $25 \times 10^9/L$ , 网织红细胞0.002.

- A. 急性淋巴细胞白血病
- B. 非霍奇金淋巴瘤
- C. 急性粒细胞白血病
- D. 霍奇金淋巴瘤
- E. 系统性红斑狼疮

81. 女, 40岁. 乏力疲倦3月. 体检: 双下肢皮肤散在出血点, 浅表淋巴结无肿大. 血常规: Hb80g/L, WBC $3.0 \times 10^9/L$ , 中性粒细胞 45%, 淋巴细胞 46%, 单核细胞9%, PLT $39 \times 10^9/L$ . 骨髓穿刺检查提示: 骨髓明显增生活跃, 原始粒细胞15%, 未见巨核细胞. 本例最可能的诊断是

- A. 特发性血小板减少性紫癜
- B. 再生障碍性贫血三系均减少
- C. 阵发性睡眠性血红蛋白尿
- D. 慢性失血性贫血
- E. 骨髓增生异常综合征

82. 男, 38岁. 因胃癌行胃大部切除术, 术前查Hb110g/L, 术中失血约800ml, 已输入平衡盐溶液2000ml, 术后第1天感胸闷、气促. 查体: T37.0, BP100/60mmHg, 实验室检查: Hb80g/L. 最好应给患者输注

- A. 悬浮红细胞
- B. 浓缩血小板
- C. 全血
- D. 生理盐水
- E. 新鲜冰冻血浆

## A3型题

### 答题说明

每一道题下面有A、B、C、D、E五个备选答案,请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(83~86题共用题干)

女,30岁.反复双手近端指间关节、双膝关节痛伴晨僵3年,肘部伸侧可触及皮下结节,质硬、无触痛.影像学检查:多关节炎、心包炎.实验室检查:血RF1:40(+),ESR 100mm/1h末.

83.最有可能的诊断是

- A. 风湿性关节炎
- B. 类风湿关节炎
- C. 系统性红斑狼疮
- D. 骨性关节炎
- E. 关节结核

84.该病最有助于确定诊断的辅助检查是

- A. 血常规
- B. 血沉
- C. 血C反应蛋白
- D. 抗环瓜氨酸肽
- E. 血抗链球菌溶血"O"测定

85.该患者基本病变的基本特征是

- A. 血管炎
- B. 软骨炎
- C. 滑膜炎
- D. 附着点炎
- E. 韧带炎

86.确诊后,控制和缓解疾病进展首选

- A. 泼尼松
- B. 阿司匹林
- C. 青霉胺
- D. 雷公藤
- E. 甲氨蝶呤

(87~89题共用题干)

女,60岁.干农活时突然出现头痛、眩晕伴恶心、呕吐、行走不稳前来就诊.既往有高血压10年,查体:BP 180/100mmHg,心率78次/分,右手指鼻不稳.

87.该患者可能的诊断是

- A. 基底节出血
- B. 脑桥出血
- C. 小脑出血
- D. 小脑梗死
- E. 脑梗死

88.为明确诊断应采取的措施是

- A. CTA
- B. 脑电图
- C. 头颅CT
- D. 脑脊液检查
- E. 头颅MRI

89.首先采取的处理措施是

- A. 降血压
- B. 镇静
- C. 手术
- D. 止血
- E. 降低颅内压

(90~92题共用题干)

男,50岁.运动迟缓伴手部震颤半年.查体:面具脸,四肢肌力正常,肌张力增高呈铅管样强直.头颅CT未见异常.

90.该患者最可能的诊断是

- A. 帕金森病
- B. TIA
- C. 脑血栓形成
- D. 癫痫
- E. 脊髓空洞

91.该病发病的主要原因是

- A. 丘脑底核受损
- B. 纹状体受损
- C. 大脑皮层运动区受损
- D. 大脑皮层-纹状体通路受损
- E. 黑质-纹状体多巴胺通路受损

92.结合该患者应避免使用的药物是

- A. 多巴胺受体激动剂
- B. 单胺氧化酶制剂
- C. 金刚烷胺
- D. 抗胆碱药物
- E. 左旋多巴

(93~95题共用题干)

男,70岁,反复反酸,暖气伴黑便2个月余,自诉既往有胃病史,查体:体形消瘦,眼睑苍白,杵状指.

93.为明确诊断首选哪种检查

- A. 上消化道造影

- B. 腹部B超
- C. 上腹CT
- D. PET
- E. 胃镜

94. 患者入院后查血常规提示,血红蛋白70g/L,白细胞 $11.2 \times 10^9/L$ ,最可能的疾病是

- A. 慢性胃炎急性发作
- B. 消化道溃疡
- C. 肠结核
- D. 胃癌
- E. 应激性溃疡

95. 入院后应给予何种治疗

- A. 积极术前准备,若无手术禁忌行手术治疗
- B. 暂行保守治疗,密切观察病情变化
- C. 应先行放疗后再行手术治疗
- D. 应先行化疗后再行手术治疗
- E. 应先给予抗炎治疗

(96~98题共用题干)

男,60岁.突发呕血3小时入院.查体: 脉搏120次/分,血压85/50mmHg.意识模糊,营养状况差.巩膜明显黄染,腹壁可见静脉曲张,肝肋下可触及,质地较硬,边缘较钝,脾肋下8cm,移动性浊音阳性,肠鸣音弱.

96. 呕血最可能的原因是

- A. 胃癌合并出血
- B. 应激性溃疡出血
- C. 急性胃黏膜病变出血
- D. 食管胃底静脉曲张破裂
- E. 胆石症所致出血

97. 首选的检查是

- A. MRCP
- B. 腹部CT
- C. 上消化道钡餐造影
- D. 腹腔动脉造影
- E. 腹部B超

98. 此时不宜采取的处理措施是

- A. 抗休克同时立即行手术治疗
- B. 快速输血、输液
- C. 静脉注射垂体后叶素
- D. 内镜下止血治疗
- E. 试用三腔管压迫止血

(99~101题共用题干)

女,30岁.体检发现胆囊结石2年.近期诉进食油腻食物后持续上腹痛,向右肩部放射,伴恶心、呕吐,休息后可自行缓解,症状反复发作.查体: 上腹明显压痛,Murphy征可疑阳性,肋脊角无压痛、叩痛.

99. 诊断首先考虑为

- A. 胆囊炎
- B. 肾结石
- C. 胃溃疡
- D. 肠梗阻
- E. 慢性胰腺炎急性发作

100. 为明确诊断,首选的检查方法是

- A. MRI
- B. 尿常规
- C. 腹部B超
- D. 血淀粉酶
- E. X线钡餐检查

101. 若患者确诊为该疾病,诊疗方案是

- A. 禁食水,持续胃肠减压,给予生长抑素持续泵入
- B. 体外超声波碎石
- C. 给予抗酸,抗炎治疗
- D. 腹腔镜胆囊切除术
- E. 通便灌肠

(102~104题共用题干)

女,42岁.出现进行性背痛、下肢无力、低热1月.查体: 腰部叩痛阳性,拾物试验阳性.腰椎X线片示3、4腰椎间隙狭窄,可见椎旁软组织阴影

102. 首先应考虑的诊断是

- A. 骨髓炎
- B. 腰椎结核
- C. 骨巨细胞瘤
- D. 转移性骨肿瘤
- E. 类风湿关节

103. 对确诊最有价值的检查

- A. X线片
- B. CT
- C. MRI
- D. 活检
- E. 血常规

104. 目前最适宜的治疗方法

- A. 药物治疗
- B. 休息牵引
- C. 康复理疗
- D. 手术治疗
- E. 石膏固定

(105~106题共用题干)

女,38岁.右膝内侧逐渐隆起伴隐痛半年.X线片示: 右胫骨干骺端有一破坏区,边缘呈膨胀性改变,中央有肥皂泡样阴影.

105. 该患者的诊断首先考虑

- A. 骨软骨瘤
- B. 骨巨细胞瘤
- C. 骨肉瘤
- D. 骨转移性癌
- E. 骨折

106. 最佳治疗方案为

- A. 化疗
- B. 放疗
- C. 手术治疗
- D. 化疗+手术
- E. 放疗+手术

(107~110题共用题干)

女, 80岁. 陈旧性广泛下壁心肌梗死6年, 活动后胸闷、心悸、气短2年, 近2周出现夜间阵发性呼吸困难. 体检: 端坐呼吸, 血压165/90mmHg, 脉搏118次/分. P2亢进, 心脏各瓣膜区未闻及杂音. 双肺底可闻及细湿啰音, 双肺散在哮鸣音. 腹平软, 肝脾肋下未触及, 双下肢无水肿. 空腹血糖5.2mmol/L. 心电图: 导联ST段压低 0.05—0.1mV, 血清肌钙蛋白正常.

107. 该患者目前最可能的诊断是

- A. 气道梗阻
- B. 肺动脉栓塞
- C. 心绞痛
- D. 急性心肌梗死
- E. 急性左心衰竭

108. 该患者暂不宜立即使用的药物是

- A. 西地兰
- B. 卡维地洛
- C. 氨茶碱
- D. 硝酸甘油
- E. 呋塞米

109. 该患者心功能分级为

- A. Killip分级 Ⅰ级
- B. Killip分级 Ⅱ级
- C. Killip分级 Ⅲ级
- D. NYHA分级 Ⅰ级
- E. NYHA分级 Ⅱ级

110. 该患者血压控制目标至少是

- A. 160/90mmHg
- B. 120/80mmHg
- C. 140/90mmHg
- D. 130/80mmHg
- E. 100/70mmHg

(11~115题共用题干)

患者, 男性, 50岁, 阵发性胸闷10年, 持续胸痛8小时收入院. 入院时血压为160/90mmHg, 心率: 80次/分, 行心电图及相关检查诊断为急性前壁心肌梗死。

11. 支持诊断的心电图改变为

- A. I、aVL、aVF出现异常Q波, 伴ST段弓背向上抬高
- B. V3-V5出现异常Q波伴ST段弓背向上抬高
- C. I、aVL出现肺性P波
- D. 频发室性期前收缩
- E. Ⅱ度房室传导阻滞

112. 此时最具特征性的实验室改变是

- A. 血清LDH上升
- B. 血清GOT上升
- C. 血清 GPT上升
- D. 血清CK-MB上升
- E. 血清肌红蛋白下降

113. 上述患者出现频发室性期前收缩, 伴随阵发性室性心动过速, 此时最恰当的处理是

- A. 静推毛花苷丙
- B. 口服美西律
- C. 静脉注射利多卡因
- D. 口服普鲁卡因胺
- E. 口服妥卡尼

114. 住院第二日患者出现胸闷、大汗、面色苍白. 体检心率136次/分, 律齐, 双肺未闻及干湿性啰音, 血压90/50mmHg, 考虑合并心源性休克. 此时不宜使用

- A. 主动脉内气囊反搏术
- B. 静注呋塞米
- C. 静滴多巴胺
- D. 静滴多巴酚丁胺
- E. 皮下注射低分子肝素

115. 起病4周后, 病人反复低热, 左肺底有湿性啰音, 心前区闻及心包摩擦音, 此时应考虑并发

- A. 肺结核
- B. 尿毒症
- C. 感染性心内膜炎
- D. 心肌梗死后综合征
- E. 肺栓塞

(116~118题共用题干)

男, 25岁. 乏力、消瘦、腹胀2月. 查体: 心肺未见异常, 肝肋下1cm, 脾肋下8cm. 化验: 血红蛋白138g/L, 白细胞 $96 \times 10^9/L$ , 血小板 $385 \times 10^9/L$ . 分子生物学检查可见 BCR/ABL.

16. 该患者的诊断是

- A. 急性早幼粒细胞白血病
- B. 急性淋巴细胞白血病

- C. M1型白血病
- D. 慢性粒细胞白血病
- E. 急性单核细胞性白血病

117. 该患者应出现的染色体异常

- A. t(9;11)
- B. t(15;17)
- C. t(9;22)
- D. t(8;21)
- E. t(8;14)

118. 该患者首选的治疗是

- A. DA方案
- B. 全反式维甲酸
- C. 羟基脲
- D. VP方案
- E. 口服伊马替尼

(119~120题共用题干)

男,45岁.脾切除、小肠切除吻合术后第4天,已排气,头痛、恶心、腹胀,随后出现寒战、四肢发绀.体温39.6,脉搏108次/分,血压135/85mmHg,近24小时尿量650ml.轻度腹胀,腹软,全腹轻压痛,无反跳痛、肌紧张.肠鸣音3次/分。

119. 最有可能出现异常的是

- A. 白细胞计数
- B. 尿常规检查
- C. 立位腹部透视
- D. 腹部超声检查

- E. 血清钾离子
120. 最可能的原因为

- A. 小肠吻合口瘘
- B. 手术后创面出血
- C. 急性肾衰竭
- D. 革兰阴性杆菌感染
- E. 吻合口梗阻

(121~122题共用题干)

男,50岁.大量饮酒后出现上腹部剧烈疼痛,伴呕吐,呕吐后腹痛不缓解.保守治疗3天,病情持续恶化,并出现休克.查体: 体温38.9,脐周及背部可见大片青紫瘀斑,上腹腹肌紧张,压痛、反跳痛明显,肠鸣音减弱。

121. 首先考虑的诊断是

- A. 十二指肠乳头肿瘤
- B. 消化性溃疡并穿孔
- C. 急性肝脓肿
- D. 重症急性胰腺炎
- E. 结肠癌

122. 最重要的治疗措施是

- A. 抗休克治疗
- B. 保守治疗
- C. 择期手术
- D. 纠正休克后急诊手术
- E. 应用广谱抗生素

## B型题

### 答题说明

以下提供若干组考题,每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案.请从中选择一个与问题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号相应字母所属的方框涂黑,每个备选答案可能被选择一次、多次或者不被选择。

(123~125题共用备选选项)

- A. 放射碘治疗
- B. 丙硫氧嘧啶
- C. 甲硫氧嘧啶
- D. 普萘洛尔
- E. 手术

123. 支气管哮喘病史的原发性甲亢患者禁用

124. 治疗甲状腺危象时首选

125. 妊娠甲亢的治疗首选

(126~129题共用备选选项)

- A. 磺脲类
- B. 双胍类
- C.  $\alpha$ -葡萄糖苷酶抑制剂
- D. 格列酮类
- E. 胰岛素

126. 抑制小肠黏膜对葡萄糖吸收而降血糖的是

127. 增强靶细胞对胰岛素敏感性而降血糖的是

128. 促进残存胰岛 细胞释放胰岛素而降低血糖的药物是

129. 通过促进外周组织利用葡萄糖、抑制肝葡萄糖输出而降血糖的药物是

(130~133题共用备选选项)

- A.  $\alpha$ 受体阻滞剂
- B. 受体阻滞剂
- C. 钙通道阻滞剂
- D. 血管紧张素 受体阻滞剂
- E. 交感神经抑制剂

130. 高血压患者伴支气管哮喘禁用

131. 合并糖尿病、尿蛋白阳性的高血压患者,降压治疗宜首选

132. 高血压合并心动过缓的患者, 降压治疗不宜首选  
133. 无合并症的老年收缩期高血压患者降压治疗宜首选

(134~137题共用备选选项)

- A. 便血量多而鲜红
- B. 便血少而疼痛
- C. 便血污秽而腥臭
- D. 便血量多而色黑
- E. 便污血而疼痛

134. 肛裂

135. 内痔

136. 血栓性外痔

137. 直肠癌

(138~139题共用备选选项)

- A. 三腔两囊管压迫
- B. 胃大部切除
- C. 服甲氧咪呱
- D. 肝动脉结扎
- E. 高选择迷走神经切除

138. 胃溃疡大出血

139. 应激性溃疡出血

(140~141题共用备选选项)

- A. 桥静脉
- B. 脑膜中动脉
- C. 大脑中动脉
- D. 椎动脉
- E. 大脑下静脉

140. 硬脑膜外血肿最常见的出血来源是

141. 单纯型硬脑膜下血肿的出血来源是

(142~143题共用备选选项)

- A. 额叶
- B. 颞叶
- C. 对侧中央前回
- D. 同侧中央前回
- E. 中央后回

142. 杰克逊性癫痫病损的部位是

143. 精神运动性癫痫病损的部位是

(144~146题共用备选选项)

- A. 爪型手
  - B. 垂腕
  - C. 银叉畸形
  - D. 猿手
  - E. 骨筋膜室综合征
144. 伸直型肱骨髁上骨折易导致  
145. 肱骨中下1/3骨折易导致  
146. Colles 骨折易导致

(147~148题共用备选选项)

- A. 骨囊肿
  - B. 骨巨细胞瘤
  - C. 骨软骨瘤
  - D. 骨肉瘤
  - E. 尤文肉瘤
147. X线显示日光放射状骨膜反应的疾病是  
148. X线呈葱皮现象的疾病是

(149~150题共用备选选项)

- A. 非特异性酯酶染色阳性, 可被NaF抑制
  - B. 中性粒细胞碱性磷酸酶积分增高
  - C. Ph染色体阳性
  - D. Ph染色体阴性
  - E. 骨髓细胞内可见 Auer 小体
149. 慢性粒细胞性白血病可见  
150. 类白血病样反应可见

