

2022年临床医师资格助理押题

第二单元

A1型题

答题说明

每一道题下面有A、B、C、D、E五个备选答案，请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 下列关于子宫峡部形态学特征,正确的是

- A. 属于宫颈的一部分
- B. 峡部下端为解剖学内口
- C. 非孕时子宫峡部长度约为1cm
- D. 妊娠期峡部变软不明显
- E. 临产后形成子宫下段达平脐

2. 下列哪项为维系DNA双链间碱基配对的化学键是

- A. 氢键
- B. 磷酸二酯键
- C. 肽键
- D. 疏水键
- E. 糖苷键

3. 下列对急性肾小球肾炎诊断有意义的尿常规检查是

- A. 上皮细胞管型
- B. 白细胞管型
- C. 颗粒管型
- D. 红细胞管型
- E. 脂肪管型

4. 一般不需要全身使用抗生素的是

- A. 疖
- B. 痈
- C. 丹毒
- D. 急性化脓性腱鞘炎
- E. 气性坏疽

5. 围生期(围产期) 国内采用的定义是指下列

- A. 胎龄满27周至出生后7足天
- B. 胎龄满27周至出生后15足天
- C. 胎龄满28周至出生后7足天
- D. 胎龄满28周至出生后15足天
- E. 胎龄满29周至出生后15足天

6. 小儿脊柱出现胸椎后凸在

- A. 出生后2个月
- B. 出生后3个月
- C. 出生后6个月
- D. 出生后8个月

E. 出生后10个月

7. 疱疹性咽峡炎的病原体为

- A. 流感病毒
- B. 副流感病毒
- C. 柯萨奇病毒
- D. 单纯疱疹病毒
- E. 腺病毒

8. 静息电位接近于下列

- A. 钠平衡电位
- B. 钾平衡电位
- C. 钠平衡电位与钾平衡电位之和
- D. 钠平衡电位与钾平衡电位之差
- E. 锋电位与超射之差

9. 在底物足量时,生理条件下决定酶促反应速度的是

- A. 酶含量
- B. 钠离子浓度
- C. 温度
- D. 酸碱度
- E. 辅酶含量

10. 下列哪种氨基酸是生酮氨基酸

- A. 谷氨酸
- B. 谷丙氨酸
- C. 亮氨酸
- D. 甘氨酸
- E. 蛋氨酸

11. 高血压时,细动脉硬化的病理改变是

- A. 动脉壁纤维化
- B. 动脉壁纤维素样坏死
- C. 动脉壁玻璃样变性
- D. 细胞水肿
- E. 动脉壁脂质沉着

12. 阿托品对下列有机磷酸酯类中毒症状无效的是

- A. 瞳孔缩小
- B. 流涎流汗

- C. 腹痛腹泻
D. 小便失禁
E. 骨骼肌震颤
13. 心理活动或意识对一定对象的指向或集中的现象称为
A. 注意
B. 人格
C. 记忆
D. 情感
E. 想象
14. 心理冲突的类型不包括
A. 双避冲突
B. 双趋冲突
C. 趋避冲突
D. 多重趋避冲突
E. 矛盾冲突
15. 下列不属于心理治疗原则的是
A. "中立"原则
B. 正义原则
C. 真诚原则
D. 保密原则
E. 回避原则
16. 关于血尿描述正确的是
A. 尿沉渣高倍镜下视野红细胞>3个
B. 尿沉渣高倍镜下视野红细胞>5个
C. 尿沉渣低倍镜下视野红细胞>3个
D. 尿沉渣低倍镜下视野白细胞>5个
E. 1000ml 尿液含有20ml 血方可表现为肉眼血尿
17. 肾病综合征常见的并发症是
A. 感染和电解质紊乱
B. 肾静脉栓塞
C. 心力衰竭
D. 肾衰竭
E. 高血压脑病
18. 下列不属于胎盘功能的是
A. 气体交换
B. 营养物质供应
C. 排出胎儿代谢产物
D. 防御功能
E. 造血功能
19. 异位妊娠最常见的病因是
A. 输卵管炎症
B. 输卵管发育不良
C. 避孕失败
D. 绝育术
E. 卵巢肿瘤
20. 宫颈癌好发于宫颈
A. 柱状上皮与鳞状上皮交接处
B. 柱状上皮
C. 鳞状上皮
D. 扁平上皮
E. 复层上皮
21. 背部手术术后应几天拆线
A. 4~5天
B. 6~7天
C. 7~9天
D. 10~12天
E. 大于14天
22. 肠内营养并发症由于输注太快引起的是
A. 感染
B. 肠炎
C. 误吸
D. 腹胀、腹泻
E. 糖代谢异常
23. 孕妇患沙眼衣原体感染首选的药物是
A. 青霉素
B. 头孢曲松
C. 左氧氟沙星
D. 阿奇霉素
E. 红霉素
24. 具有典型细胞核和完整细胞器的微生物是
A. 真菌
B. 衣原体
C. 支原体
D. 病毒
E. 立克次体
25. 导致新生儿化脓性脑膜炎的病原菌是
A. 溶血性链球菌
B. 大肠杆菌
C. 流感嗜血杆菌
D. 肺炎链球菌
E. 脑膜炎双球菌
26. 末梢血中性粒细胞和淋巴细胞的比例大致相等的时间是
A. 4~6周和4~6岁
B. 4~6天和4~6岁
C. 1~3周和1~3岁
D. 1~3天和1~3岁
E. 7~9天和7~9岁
27. 猩红热皮疹特点不正确的是
A. 皮疹粗糙, 砂纸样
B. 常在24小时内遍及全身

- C. 在腋窝、腹股沟等皮肤皱褶处皮疹稀疏
D. 疹间皮肤亦呈红色
E. 常有散在糠屑样脱皮
28. 下列毒物中,属于窒息性气体的是
A. 苯
B. 氨气
C. 氢氰酸
D. 一氧化氮
E. 氯乙烯
29. 卫生服务组织不包括
A. 医疗机构
B. 群众性卫生组织
C. 疾病预防控制中心
D. 医疗保险公司
E. 预防保健机构
30. 医疗机构对有能能力诊治的危重患者,应当立即采取的处理措施是
A. 请示卫生行政部门
B. 办理住院手续
C. 请示医院领导
D. 抢救
E. 转诊
31. 对精神障碍患者实施住院治疗须经监护人同意的情形是
A. 医疗费用需要自理
B. 没有办理住院手续能力
C. 发生伤害自身行为
D. 患者家属提出医学鉴定要求
E. 有伤害他人的安全危险
32. 医患关系的本质特征是
A. 具有互利性质的经济关系
B. 具有买卖性质的依附关系
C. 具有协作性质的买卖关系
D. 具有依附性质的非平等关系
E. 具有契约性质的信托关系
33. 卫生领域中的公平性是指生存机会的
A. 以社会阶层为导向
B. 以支付能力为导向
C. 以需要为导向
D. 以市场经济规律为导向
E. 患者年龄为导向
34. 老年男性发生尿潴留,首先考虑的疾病是
A. 良性前列腺增生
B. 膀胱颈挛缩
C. 糖尿病
D. 前列腺癌
E. 膀胱肿瘤
35. 足月新生儿的原始反射不包括
A. 觅食反射
B. 腹壁反射
C. 握持反射
D. 拥抱反射
E. 吸吮反射
36. 常用的急救技术不包括
A. 止血,包扎
B. 心肺复苏
C. 骨折固定
D. 内脏脱出复位
E. 气管插管
37. 引起子宫收缩乏力的原因不包括
A. 子宫局部因素
B. 内分泌失调
C. 有急产史
D. 胎位异常
E. 精神因素
38. 与宫颈上皮内癌变 级(CIN I) 发病关系最密切的是
A. HIV
B. HSV
C. HCV
D. HBV
E. HPV
39. 尿路感染最常见的感染途径是
A. 血液感染
B. 淋巴道感染
C. 下行感染
D. 上行感染
E. 直接感染
40. 下列对于长期慢性病人,宜采取的医患模式是
A. 主动-被动型
B. 被动-主动型
C. 指导-合作型
D. 共同参与型
E. 合作-指导型
41. 出血性梗死常发生于
A. 脾、肾
B. 心、脑
C. 胰腺、肺
D. 心、肾
E. 肺、肠
42. 因毛细血管通透性增加而致胸腔积液的疾病是
A. 肾病综合征

- B.肝硬化
C.类风湿关节炎
D.左心衰竭
E.缩窄性心包炎
- 43.下述疾病中最可能引起金黄色葡萄球菌肺脓肿的是
A.鼻窦炎
B.皮肤疖肿
C.牙周脓肿
D.食管穿孔
E.膈下脓肿
- 44.反映均数抽样误差大小的指标是
A.变异系数
B.标准误
C.均数
D.标准差
E.全距
- 45.下列物品中毒抢救时,禁忌洗胃的是
A.有机磷农药
B.碳酸钡
C.杀鼠剂
D.安眠药
E.浓硫酸
- 46.术后24小时内发热的最常见于
A.感染
B.低血压
C.肺不张
D.输血反应
E.非感染性发热
- 47.婴儿生理性贫血的时间是出生后
A.2~3周
B.2~3个月
C.5~6个月
D.8~10个月
E.10~12个月
- 48.关于苯丙酮尿症的遗传形式正确的是
A.常染色体显性遗传
B.常染色体隐性遗传
C.X连锁显性遗传
D.X连锁隐性遗传
E.X连锁不完全显性遗传
- 49.D/G易位型21-三体综合征最常见的核型是
A.46,XY(或XX),-21,+t(21q21q)
B.46,XY(或XX),-14,+t(14q21q)
C.46,XY(或XX),-13,+t(13q21q)
D.46.XY(或XX),-15,+t(15q21q)
E.46,XY(或XX),-22,+t(21q22q)
- 50.能量的需要,为小儿特有的所需是
A.基础代谢
B.活动
C.食物的特殊动力作用
D.排泄损失能量
E.生长发育
- 51.关于放置宫内节育器的时间不恰当的是
A.剖宫产后半年放置
B.剖宫产后1年放置
C.月经干净后3~7日无性交
D.人工流产后可立即放置
E.含孕激素IUD在月经第3日放置.
- 52.关于胎盘早剥的并发症错误的是
A.DIC
B.过期妊娠
C.羊水栓塞
D.出血
E.急性肾衰
- 53.主动-被动型的医患关系主要用于
A.焦虑障碍患者
B.康复期治疗患者
C.严重昏迷的患者
D.慢性感染患者
E.急性感染期患者
- 54.个体自我意识发展的开始时期是在
A.胎儿期
B.婴儿期
C.幼儿期
D.学龄期
E.青春意识
- 55.卫生服务需求的正确描述是
A.由需要转化而来的需求和没有需要的利用
B.由需要转化而来的利用和没有需要的需求
C.由需要转化而来的利用和没有需要的利用
D.由需要转化而来的需求和没有需要的需求
E.由需要转化而来的利用和没有利用的需求
- 56.体格检查的伦理要求是
A.平等相待,廉洁奉公
B.积极进取,保证安全
C.精诚团结,密切协作
D.耐心倾听,正确引导
E.关心体贴,减少痛苦
- 57.下列选项中仅属于医师的道德义务不属于法律义务的是
A.努力钻研业务,提高专业技术水平

- B. 关心、爱护、尊重患者,保护患者隐私
- C. 宣传卫生保健知识,对患者进行健康教育
- D. 遵守法律、法规,遵守技术规范
- E. 积极开展义诊,尽力满足患者的健康需求

58. 在孕妇腹壁上听诊,与胎心率一致的是

- A. 子宫杂音
- B. 腹主动脉音
- C. 脐带杂音
- D. 胎心音
- E. 肠蠕动音

59. 在胎儿电子监护中提示胎儿缺氧的是

- A. 早期减速

- B. 变异减速
- C. 变异缺失
- D. 胎心率加速
- E. 宫缩后晚期减速

60. 下列可以进行人工流产吸宫术的是

- A. 妊娠10周以内
- B. 急性生殖道炎症
- C. 各种慢性疾病的急性期
- D. 手术当天体温两次超过37.5
- E. 心功能不全

A2型题

答题说明

每一道题下面有A、B、C、D、E五个备选答案,请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

61. 女,28岁,初产妇.妊娠28周,阵发性腹痛,伴有少许阴道流血1天.查体: T36.5,规律宫缩1次/5分钟,持续40秒,宫颈扩张 3cm.最可能的诊断是

- A. 早产临产
- B. 不全流产
- C. 难免流产
- D. 先兆早产
- E. 先兆流产

62. 女孩,2岁.不会走路和说话.查体: 身高65cm,眼裂小,眼距宽,鼻梁低,全身皮肤细腻,胸骨左缘3-4肋间可闻3/6级收缩期杂音.为明确诊断,首选的检查是

- A. 心电图
- B. 尿液有机酸分析
- C. 血清 T3、T4、TSH测定
- D. 胸部X线片
- E. 染色体核型分析

63. 女,56岁,绝经2年,阴道不规则流血1个月.妇科检查: 外阴正常,阴道内少量暗红色血,宫颈光滑.宫体大小正常,双侧附件区未触及异常.B超检查: 子宫 5cm × 4cm × 3cm,子宫内膜厚10mm,回声不均.对确定诊断最有价值的处理是

- A. 凝血功能检查
- B. 诊断性刮宫
- C. 血常规检查
- D. 尿妊娠试验
- E. 宫颈细胞学检查

64. 男婴,6天,不吃、不哭、体温不升3天,查体: 反应差,皮肤黄染,脐部有分泌物,双肺可闻及湿啰音,肝肋下3cm,脾肋下1cm,最主要的诊断是

- A. 新生儿脐炎
- B. 新生儿低血糖
- C. 新生儿寒冷损伤综合征
- D. 新生儿败血症
- E. 新生儿肺炎

65. 女,35岁,误服敌百虫中毒,家人立即送往医院给以洗胃,治疗禁用

- A. 1: 5000高锰酸钾
- B. 2%碳酸氢钠
- C. 0.3%过氧化氢
- D. 0.3%氧化镁
- E. 5%碳酸钠

66. 男,24岁.8天前出现上唇部红肿,可见脓头,自行挤压排脓液,后出现发热,畏寒,体查体: T: 38.9, P20次/分,寒战,头痛剧烈,神志不清,其最可能的并发症是

- A. 颌下淋巴结炎
- B. 眼眶内感染
- C. 化脓性上颌窦炎
- D. 面部蜂窝织炎
- E. 海绵状静脉窦炎

67. 淋病的病原体是

- A. 沙眼衣原体
- B. 人乳头瘤病毒

- C. 疱疹病毒
- D. 淋病奈瑟菌
- E. 巨细胞病毒

68. 肠内营养最严重的并发症

- A. 吸入性肺炎
- B. 胆汁淤积
- C. 胆石形成
- D. 肠源性感染
- E. 肝损害

69. 女, 28岁. 近2年, 月经前出现双乳房胀痛, 自己可触及乳房周围不规则肿块, 月经后缓解. 其诊断可能是

- A. 乳腺皮下脂肪瘤
- B. 乳房纤维腺瘤
- C. 皮脂腺囊肿
- D. 乳腺增生
- E. 乳腺囊性增生病

70. 女, 28岁. 在心理咨询中谈到所交的两个男朋友她都很喜欢, 不知道该与哪个继续相处, 难以做出抉择, 希望得到帮助, 而根据心理治疗的原则, 心理咨询师没有替她作出决定. 该咨询师遵循的原则是

- A. 灵活原则
- B. 综合原则
- C. 中立原则
- D. 耐心原则
- E. 回避原则

71. 男, 16岁, 再一次考试中成绩很差, 使他很受打击, 情绪低落, 老师告诉他没关系, 这次考试只是一次阶段性考试, 还可以通过复习将不会的知识点搞清楚, 该生的情绪因此得到很大改善, 导致其情绪改善的主要原因是

- A. 改变了认知
- B. 调整了防御方式
- C. 改变了环境
- D. 改变了意志
- E. 学会了放松

72. 某心理咨询师的母亲出现了心理问题, 其妹妹想让其进行心理治疗, 但他却把母亲转给其他心理咨询师治疗, 该心理咨询师遵循的原则是

- A. 保密原则
- B. 真诚原则
- C. 中立原则
- D. 回避原则
- E. 系统原则

73. 在医疗实践活动中分配医疗收益与平衡时, 类似的个案适用相同的准则, 不同的个案适合不同的准则, 这所体现的医学伦理基本原则是

- A. 尊重原则
- B. 不伤害原则
- C. 公正原则
- D. 有利原则
- E. 公益原则

74. 某大型企业计划在自然疫源地兴建旅游建设项目, 在征询意见时, 有专家提醒, 根据《传染病防治法》规定应当事先由法定单位对该项目施工环境进行卫生调查。

该法定单位是

- A. 省级以上旅游主管部门
- B. 省级以上疾病预防控制机构
- C. 国务院卫生行政主管部门
- D. 省级以上环境保护主管部门
- E. 省级以上环境监测评价机构

75. 某学者对某社区进行有关吸烟和肺癌的关系, 对该社区中吸烟和不吸烟进行分组跟踪观察其肺癌的发生率, 则该研究方法属于

- A. 病例对照研究
- B. 前瞻性研究
- C. 历史性研究
- D. 创新性研究
- E. 队列研究

76. 某地区在1个月内对居民进行了是否有糖尿病的普查, 可计算当地居民糖尿病的

- A. 二代发病率
- B. 死亡率
- C. 罹患率
- D. 患病率
- E. 发病率

77. 女, 20岁, 下腹部疼痛1月, 盆腔B超检查子宫大小正常, 右侧宫旁探及8cm × 6cm × 6cm大小肿物, 血AFP 100ug/L, 最可能的诊断是

- A. 畸胎瘤
- B. 胚胎性癌
- C. 无性细胞瘤
- D. 绒毛膜癌
- E. 内胚窦瘤

78. 女22岁, 产后一周, 下腹痛伴发热, 查体: 体温39℃, 心率90次/分, 脓血性恶露, 血常规 $15.0 \times 10^9/L$, 可能的诊断是

- A. 晚期产后出血
- B. 急性膀胱炎

- C.产褥感染
- D.急性阴道炎
- E.急性外阴炎

79. 24岁,初产妇,妊娠38周,规律宫缩7小时,血压10/70mmHg,骨盆不小,预测胎儿体重为2800g,枕左前位,胎心良,肛诊宫口开大4cm,S=0.本例正确处置应是

- A.不需干涉产程进展
- B.人工破膜
- C.静脉缓注25%硫酸镁16ml
- D.静脉滴注宫缩素
- E.静脉推注地西洋10mg

80. 男性20岁,被手榴弹炸伤右侧大腿5小时来院.查体:一般情况好,生命体征平稳,伤口面积约5cm×3cm伤口,深达深筋膜表面,无活动性出血,检查无弹片残留,正确的处理是

- A.彻底清创后,缝合伤口
- B.彻底清创,切开深筋膜减压
- C.清洗伤口,加压包扎
- D.彻底清创后,放置引流、缝合伤口
- E.彻底清创后,开放伤口引流

81. 某女,30岁产下一男婴,其母为HBV病毒携带者,该男婴为预防 HBV病毒感染首选采取的措施是

- A.注射抗生素
- B.注射丙种球蛋白
- C.注射乙肝疫苗
- D.注射HBIG
- E.注射干扰素

82. 男婴,3个月.出生体重2.8kg,母乳喂养,未添加辅食,食欲好.自出生至今大便6-8次/日,为黄色软便,无特殊味,经治疗无好转.现体重5.5kg,体格检查无异常.最可能的诊断是

- A.慢性细菌性痢疾
- B.肠结核
- C.生理性腹泻
- D.真菌性肠炎
- E.迁延型腹泻

83. 女,65岁.绝经15年,阴道不规则流血10余天.高血压,糖尿病病史10年.妇科检查:宫颈光滑,宫体如8周妊娠大小,质软,双附件未见异常.应首先考虑的疾病是

- A.子宫内膜癌
- B.子宫内膜炎
- C.子宫腺肌病
- D.子宫内膜息肉

E.子宫肌瘤

84. 女,28岁,尿急,尿频,尿痛2天,查体: T36.5 双肾区无叩痛,尿沉渣镜检: RBC5-10/HP,WBC20-30/HP 最可能的诊断为

- A.急性膀胱炎
- B.急性肾小球肾炎
- C.急性间质性肾炎
- D.急性肾小管肾炎
- E.急性肾盂肾炎

85. 男,10岁.发热11天,体温38-39℃,刺激性咳嗽明显,胸痛.查体:双肺散在干啰音,胸片示:左肺下野淡薄片状阴影,最可能的诊断是

- A.腺病毒肺炎
- B.呼吸道合胞病毒肺炎
- C.肺炎支原体肺炎
- D.金黄色葡萄球菌肺炎
- E.肺炎链球菌肺炎

86. 女,56岁.全身麻醉下行右乳癌改良根治术术后2小时.查体: T36.9℃,P85次/分,R21次/分, BP130/85mmHg,意识清醒.此时宜采取的体位是

- A.斜坡卧位
- B.仰卧位
- C.头低脚高位
- D.侧卧位
- E.高半坐位卧式

87. 女,22岁.停经40天,阴道少量流血1周.月经规律,周期为28天.有性生活史,曾行人工流产2次.妇科检查:子宫稍大,宫颈举痛(+),左侧附件区可触及5cm×5cm大小包块,质中,压痛(+).为明确诊断,首选的常用辅助检查是

- A.腹腔穿刺
- B.诊断性刮宫
- C.宫腔镜检查
- D.超声检查
- E.腹腔镜检查

88. 男,35岁.B超发现右输尿管上段结石,大小1.2cm×0.8cm,合并轻度右肾积水.无发热,静脉尿路造影(IVU)显示右侧输尿管上段结石,右肾轻度积水,输尿管显影.首选的治疗方法是

- A.体外冲击波碎石
- B.输尿管镜碎石取石
- C.经皮肾镜碎石取石
- D.开放输尿管切开取石
- E.腹腔镜输尿管切开取石

临床医师资格笔试各单元考试科目及分值

西医执业医师资格考试内容(仅供参考)

第一单元	基础100、少部分其他临床部分
第二单元	循环45、泌尿35、血液25、运动20、内分泌20、风湿5
第三单元	消化80、呼吸40、其他15、传染15
第四单元	妇产70、儿科50、精神30

西医助理医师资格考试内容(仅供参考)

第一单元	消化40、循环23、精神22、呼吸20、 运动15、血液13、内分泌12、风湿5
第二单元	基础60、妇产30、儿科25、泌尿15、其他10、传染10

89. 女, 22岁, 初产妇. 妊娠38周, 规律宫缩7小时. 检查: 宫口开大5cm, S=0, 枕左前位, 胎心148次/分, 预估胎儿体重2800g. 目前应采取的处理是

- A. 严密观察产程进展
- B. 静脉推注地西洋
- C. 人工破膜
- D. 人工灌肠
- E. 静脉滴注缩宫素

90. 女婴, 5个月. 3天内抽搐4次. 发作时意识不清持续2分钟, 自行缓解, 醒后活泼如常, 不伴发热. 实验室检查: 血钙1.73mmol/L, 血镁1.00mmol/L, 血糖3.9mmol/L. 最可能的诊断是

- A. 维生素D依赖性佝偻病
- B. 低镁血症
- C. 低血糖症
- D. 婴儿痉挛症

维生素D缺乏性手足搐溺症

91. 调查发现某高原地区居民结肠癌的发病率高于全国平均水平, 研究者注意到该地区人们的饮食习惯具有高脂肪摄入, 低蔬菜、水果摄入的特点, 拟开展一项课题研究, 分析饮食习惯与结肠癌的关系, 考虑到因果现象发生的时间顺序, 最佳研究方法应为

- A. 生态学研究
- B. 横断面研究
- C. 队列研究
- D. 病例对照研究
- E. 临床试验

92. 某人群随着对环境有害物质暴露的增加, 所引起的具有某种生物效应的人数随着变化的现象, 为

- A. 时间-效应关系
- B. 剂量-效应关系
- C. 时间-反应关系
- D. 剂量-反应关系
- E. 剂量-发病关系

93. M药厂销售代表在和某医院几名医师达成协议后, 医师在处方时使用M药厂生产的药品, 并按使用量的多少接受了药厂给予的提成. 事情曝光以后, 对M药厂按《药品管理法》的有关规定处理; 对于医师的错误行为, 有权决定给予处分、没收违法所得的部门是

- A. 药品监督管理部门
- B. 工商行政管理部门
- C. 医师协会
- D. 公安部门
- E. 卫生行政部门

94. 在多中心人体试验审查中, 项目总负责人单位伦理委员会审查通过后, 项目参加单位的伦理委员会应当

- A. 重新审查
- B. 不再审查
- C. 只审查本单位的可行性
- D. 只审查方案的科学性
- E. 只审查受试者的知情同意书

95. 某高校心理咨询工作人员接待了一位大学生, 该生对心理咨询师说, 他多次难以自控地想杀死其女友. 那么, 此情况下心理咨询员的最佳做法是

- A. 联系精神病医院并直接送该生入院
- B. 严格保守该生的秘密
- C. 告知该生女友家属对其进行保护, 同时建议该生家属带其进行必要的心理诊治
- D. 通知该生的家长对其妥善监管
- E. 劝其尽快接受治疗

96. 女, 35岁. 丈夫因车祸去世, 令其痛不欲生, 遂到心理咨询门诊寻求帮助. 该女生在诉说其目前的心境时痛哭流涕. 对此, 心理咨询师在初始阶段一般不应采取的措施是

- A. 对质其懦弱
- B. 帮助其领悟
- C. 增强其自控
- D. 指导其放松
- E. 接受其宣泄

97. 女, 65岁. 间歇全程肉眼血尿2个月, 尿呈洗肉水样. 无尿频、尿急、尿痛. 间断出现, 近日血尿加重. 配偶吸烟. 最可能的疾病是

- A. 膀胱癌
- B. 膀胱炎
- C. 肾盂肾炎
- D. 尿路结石
- E. 肾癌

98. 男婴, 8个月. 发热3小时, 体温39.3. 就诊过程中突然双眼上翻, 肢体强直, 持续半分钟后缓解. 查体肺、心、腹及神经系统无异常, 2个月前曾有同样发作, 其表现考虑为

- A. 病毒性脑炎
- B. 热性惊厥
- C. 癫痫
- D. 结核性脑膜炎
- E. 中毒性脑病

99. 女, 35岁, 外阴瘙痒、分泌物增多、性交痛2周. 妇科检查: 阴道黏膜充血、宫颈充血, 阴道内多量白带, 呈灰黄色、稀薄泡沫状, 臭味. 最可能的诊断是

- A. 外阴阴道假丝酵母菌病
- B. 滴虫阴道炎
- C. 细菌性阴道病
- D. 萎缩性阴道炎
- E. 非特异性外阴炎

100. 女, 40岁. 1小时前服敌百虫200ml, 查体: 躁动, 瞳孔缩小, 四肢强直、肺部可闻及湿啰音. 下列处理措施不恰当的是

- A. 药物导泻
- B. 清洗呕吐物污染的皮肤
- C. 静脉应用阿托品
- D. 应用解磷定
- E. 2%碳酸氢钠溶液洗胃

101. 女, 1岁, 诊断为蛋白质-能量营养不良. 患儿突然发生面色灰白, 神志不清, 脉搏减慢, 呼吸暂停. 应首先考虑

- A. 低钠血症
- B. 自发性低血糖
- C. 继发感染
- D. 心力衰竭
- E. 低钙血症

102. 女, 22岁, 妊娠30周. 外阴灰白色疣状物伴瘙痒、灼痛不适半个月. 外阴皮损病理组织学检查见挖空细胞. 最可能的

- A. 梅毒
- B. 尖锐湿疣
- C. 淋病
- D. 细菌性阴道病
- E. 滴虫阴道炎 **人医考原创整理**

103. 女, 18岁. 近几个月来常因琐事与父母发生激烈争吵, 闷闷不乐, 被诊断为抑郁症而入院治疗. 两周后, 其父母去探视, 患者起初表现出既想见又不想见的矛盾心理, 但最终还是决定拒绝见其父母. 医生根据病情同意了患者的决定. 该患者起初的心理状态属于

- A. 双重趋避冲突
- B. 趋避冲突
- C. 回避冲突
- D. 双避冲突
- E. 双趋冲突

104. 因女性不孕而实施的体外授精-胚胎移植技术, 可能产生的伦理问题不包括

- A. 用剩余胚胎进行干细胞研究
- B. 代孕母亲
- C. 妇女的"贞操"
- D. 卵子商品化

E. 对胚胎进行非医学目的的性别鉴定

105. 医学道德修养是指医务人员在医学道德方面所进行的自我教育、自我锻炼和自我陶冶, 以及在此基础上达到的是

- A. 医学道德境界
- B. 医疗实践能力
- C. 医疗技术水平
- D. 医患沟通能力
- E. 医疗道德意识

106. 女, 48岁, 某乡镇企业负责人, 5个月前被确诊为乳腺癌并接受手术治疗, 术后患者仅休息了2个月, 便全身心地投入了工作, 同患病前一样从事日常工作, 参加各种会议, 对于自己身体的康复情况并不重视, 不按照要求到医院复查, 也不愿意再接受任何其他的治疗.

该女性角色行为改变类型属于

- A. 角色行为冲突
- B. 角色行为缺如
- C. 角色行为异常
- D. 角色行为减退
- E. 角色行为强化

107. 女, 30岁. 妊娠40周. 临产12小时后在产钳助娩下分娩一4100g女婴. 胎儿娩出后15分钟胎盘人工剥离取出, 检查胎盘无异常, 继之发生阴道大流血. 下列处理不恰当的是

- A. 刮宫术
- B. 配血
- C. 子宫注射或静脉滴注缩宫药物
- D. 迅速补液
- E. 按摩子宫

108. 6个月女婴"发热咳嗽3天、气促1天"入院. 查体: T 38.6, 呼吸急促, 口周发青, 咽充血, 双肺闻及中小水泡音, 心、腹(-). 血常规: 白细胞 $10 \times 10^9/L$, $N0.65, L0.35$. 该患儿最可能的诊断是

- A. 支气管炎
- B. 支气管肺炎
- C. 毛细支气管炎
- D. 支气管哮喘
- E. 原发性肺结核

109. 1岁男孩, 自幼体弱, 多次患肺炎. 胸片示: 肺纹理增强, 左心房、左心室增大, 肺动脉段突出, 主动脉弓增大. 考虑该患儿存在

- A. 房间隔缺损
- B. 室间隔缺损
- C. 动脉导管未闭
- D. 法洛三联症

E. 艾森门格综合征

110. 男, 65岁. 进行性排尿困难2年, 不能自行排尿2小时, 膀胱膨隆, 轻压痛. 首选的治疗方法应是

- A. 导尿并保留导尿管
- B. 药物治疗

C. 耻骨上膀胱穿刺

- D. 耻骨上膀胱造瘘
- E. 针灸

A3型题

答题说明

每一道题下面有A、B、C、D、E五个备选答案, 请从中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(111~112题共用题干)

女, 28岁. 停经45天, 右下腹剧烈疼痛1小时伴晕厥, 平素月经规律。

11. 首先考虑的诊断是

- A. 输卵管妊娠破裂
- B. 急性阑尾炎
- C. 卵巢囊肿蒂扭转
- D. 不全流产
- E. 急性输卵管炎

112. 对该患者采取的处理措施不正确的是

- A. 剖腹探查术
- B. 立即补液
- C. 腹腔镜手术
- D. 继续观察
- E. 立即配血

(113~115题共用题干)

患儿, 1岁. 发热3天, 体温39~40℃, 家长一直服用中药治疗, 今日热退, 发现患儿出现皮疹, 遂就诊. 查体: 一般情况好, 咽部充血, 耳后淋巴结肿大, 红色斑丘疹以颈及躯干多见。未见其他异常。

113. 该患儿最可能的诊断是

- A. 麻疹
- B. 风疹
- C. 水痘
- D. 猩红热
- E. 幼儿急疹

114. 致病的病原体为

- A. 水痘病毒
- B. 柯萨奇病毒
- C. 人疱疹病毒6型
- D. 腺病毒
- E. 麻疹病毒

115. 水痘皮疹出现在发热后

- A. 发热时出疹

B. 热退疹出

- C. 发热后1天
- D. 发热后2天
- E. 发热后3~4天

(116~117题共用题干)

女, 42岁, 1周前无意间发现左乳外上象限4cm × 3cm肿物, 距乳头距离5cm, 质硬, 可推动, 但病人双手叉腰时肿块活动度明显受限, 左腋窝未扪及肿大淋巴结。

116. 该患者最可能的诊断是

- A. 乳腺癌
- B. 乳房纤维腺瘤
- C. 乳房内瘤
- D. 乳腺炎
- E. 乳管内癌头状瘤

117. 为明确肿物性质最适合的检查是

- A. 粗针穿刺活检
- B. 钼靶X线摄片
- C. 切取活检
- D. 近红外线扫描
- E. 细针穿刺细胞学

(118~119题共用题干)

女, 45岁, G2P2. 痛经进行性加重伴经量增多6年. 妇科检查: 宫体均匀增大如3个月妊娠大小, 质硬, 压痛(+), 血 Hb64g/L.

118. 该患者最可能的诊断是

- A. 子宫肉瘤
- B. 子宫腺肌病
- C. 子宫内膜癌
- D. 子宫肌瘤
- E. 功能失调性子宫出血

119. 该患者首选的辅助检查是

- A. B超检查
- B. MRI 检查
- C. PET-CT 检查

- D. CT检查
- E. X线检查

(120~121题共用题干)

男, 57岁. 间歇性无痛性血尿2个月, 有血块, B超见膀胱内有1.5cm × 2.0cm × 1.0cm新生物, 有蒂.

120. 对诊断最重要的检查是

- A. 膀胱镜+活检
- B. B超
- C. 尿常规
- D. IVP
- E. CT

121. 目前最常用的治疗方法是

- A. 膀胱灌注化疗
- B. 膀胱全切
- C. 开放手术
- D. 经尿道电切
- E. 全身化疗

(122~124题共用题干)

女, 26岁, 停经4个月, 早孕反应消失, 以阴道少量流血、下腹痛就诊, 妇科检查: 宫口闭, 子宫如妊娠16周大.

122. 为明确诊断, 首选的检查是

- A. 腹部 CT
- B. 血 hCG 测定
- C. 诊断性刮宫
- D. B超检查
- E. 血孕酮测定

123. 该患者最可能的诊断是

- A. 习惯性流产
- B. 稽留流产
- C. 不全流产
- D. 先兆流产
- E. 难免流产

124. 该患者正确处理措施是

- A. 休息、肌注黄体酮
- B. 抑制宫缩
- C. 静注缩宫素引产
- D. 雌激素治疗后刮宫
- E. 雄激素治疗后刮宫

(125~127题共用题干)

某研究者探讨脂肪摄入量与男性前列腺癌的关系, 在社区内选择高脂肪和低脂肪摄入者各200名, 从50岁开始对他们进行随访10年. 随访中, 高脂肪摄入组中有20人, 低脂肪摄入者中有10人被诊断为前列腺癌

125. 这种研究方法为

- A. 现况调查
- B. 实验研究
- C. 生态学研究
- D. 队列研究
- E. 病例对照研究

126. 与低脂肪摄入组相比, 高脂肪摄入组的前列腺癌的相对危险度(RR) 是

- A. 1.5
- B. 0.75
- C. 1.0
- D. 2.0
- E. 0.05

127. 高脂肪摄入者所致前列腺癌的特异危险度为

- A. 30/100
- B. 10/100
- C. 15/100
- D. 无法计算
- E. 5/100

(128~130题共用题干)

男, 52岁, 公司经理, 吸烟10年每天2包, 体重75kg, 身高166cm

128. 从临床预防心血管疾病的角度讲, 应检查

- A. 肝功能
- B. 血常规
- C. 冠状动脉造影
- D. 血脂
- E. 超声心动图

129. 患者的BMI是

- A. 21.4
- B. 23.5
- C. 25.8
- D. 27.2
- E. 29.4

130. 应该建议该就诊者采取的预防措施是

- A. 流感疫苗接种
- B. 肺炎链球菌疫苗接种
- C. 戒烟, 适当运动合理饮食
- D. 冬令进补
- E. 冷水沐浴锻炼

(131~133题共用题干)

患儿女, 1岁, 母乳喂养. 近1个月来面色渐苍白, 间断腹泻, 原可站立, 现坐不稳, 手足常颤抖. 体检: 面色苍黄、略水肿, 表情呆滞. 血红蛋白80g/L, 红细胞 $2.4 \times 10^{12}/L$, 白细胞 $5.0 \times 10^9/L$

131. 该患儿可诊断为
- 甲状腺功能减低症
 - 营养性缺铁性贫血
 - 维生素D缺乏性佝偻病
 - 病毒性脑膜炎
 - 营养性巨幼红细胞性贫血
132. 为明确诊断,需进一步进行的检查是
- 脑电图检查
 - 外周血涂片
 - 血清铁检查
 - 血清维生素B12和叶酸测定
 - 血清钙、磷、碱性磷酸酶测定
133. 该患儿有效的治疗措施是
- 铁硫酸亚铁加维生素C
 - 肌注维生素D3
 - 肌注维生素B12
 - 肌注维生素B6
 - 维生素C口服

(134~136题共用题干)

女婴,3个月,高热,频繁呕吐3天,嗜睡,查体:双眼凝视,前囟膨隆,反应差,脐部见少量脓性分泌物,心肺正常,脑膜刺激征(+)

134. 该患儿的最可能的诊断
- 颅内出血
 - 新生儿缺氧缺血性脑病
 - 化脓性脑膜炎
 - 脑发育不全
 - 低钙惊厥
135. 错误的处理措施是
- 抗生素治疗10-14天
 - 早期、足量、足疗程
 - 严密观察生命体征
 - 必要时可以应用肾上腺皮质激素
 - 腰穿降颅压
136. 该患儿最易出现的并发症是
- 脑积水
 - 智力低下
 - 硬脑膜下积液
 - 低钙抽搐
 - 脑萎缩

B型题

答题说明

以下提供若干组考题,每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案.请从中选择一个与问题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号相应字母所属的方框涂黑,每个备选答案可能被选择一次、多次或者不被选择。

(137~138题共用备选选项)

- 30分钟
 - 1小时
 - 2小时
 - 6小时
 - 24小时
137. 甲类传染病城镇上报的时间是
138. 乙类传染病农村上报的时间是

(139~140题共用备选选项)

- 烂苹果味
 - 大蒜味
 - 腥臭味
 - 酒味
 - 苦杏仁味
139. 氰化物中毒时,患者的呼吸气味可呈
140. 有机磷中毒时,患者的呼吸气味可呈

(141~142题共用备选选项)

- 主动—被动型
 - 被动—主动型
 - 指导—合作型
 - 共同参与型
 - 合作—指导型
141. 对于长期慢性病人,宜采取的医患模式是
142. 对于切除阑尾的术后病人,宜采取的医患模式是

(143~144题共用备选选项)

- 心理学研究项目
 - 受试者的知情同意
 - 医学新技术研究项目
 - 受试者个人隐私
 - 对生物学研究项目进行伦理审查、检查和监督
143. 伦理审查委员会伦理审查的任务是
144. 伦理委员会审查的内容不包括

(145~146题共用备选选项)

- A. 无痛性肉眼血尿
- B. 终末血尿伴膀胱刺激症状
- C. 排尿突然停止
- D. 血尿+蛋白尿
- E. 疼痛伴血尿

145. 泌尿系肿瘤血尿是

146. 泌尿系结石血尿是

(147~148题共用备选选项)

- A. 胎儿缺氧
- B. 胎儿状况良好
- C. 宫缩时胎头受压
- D. 宫缩时脐带受压兴奋迷走神经引起
- E. 胎盘功能不良

147. 胎心率减速与宫缩无固定关系,下降迅速,恢复迅速,临床上提示

148. 宫缩时减速,宫缩后马上恢复正常(在宫缩之前),下降幅度 <50 次/分,持续时间短,恢复快,宫缩后迅速恢复正常,临床上提示

(149~150题共用备选选项)A. 尿三氯化铁试验

B. 苯丙氨酸耐量试验

C. 血清苯丙氨酸浓度测定

D. Guthrie细菌抑制试验

E. 尿硝普钠试验

149. 用于苯丙酮尿症新生儿筛查的是

150. 疑为苯丙酮尿症的儿童初筛应做

