

# 皮肤与性病学（中级）

〔专业代码:338〕

- 
- 1、环境温度过高时主要的散热途径是**汗液蒸发**
  - 2、皮肤中的水分主要存在于**真皮**
  - 3、**Zn<sup>2+</sup>**的缺乏可引起肠病性肢端皮炎
  - 4、皮肤对脂溶性物质吸收的主要途径是**毛囊和皮脂腺**
  - 5、真皮结缔组织中主要的常驻细胞为**成纤维细胞和肥大细胞**
  - 6、为毛发提供营养的是**毛乳头**
  - 7、成人皮肤总面积约为 **1.5m<sup>2</sup>**
  - 8、基底膜带结构异常时可引起**表皮下水疱或大疱**
  - 9、缺氧时通过无氧酵解途径提供能量的葡萄糖占表皮总量的 **70% ~ 80%**
  - 10、**慢性肉芽肿性疾病**主要病理表现为假上皮瘤样增生
  - 11、原发性皮肤 T 细胞淋巴瘤可见 **Pautrier 微脓肿**
  - 12、细胞内水肿主要发生于**棘层**
  - 13、采取皮肤标本时**手术切取法**最为常用
  - 14、**表皮突延长**不属于疣状增生时的病理变化
  - 15、**背部**不容易发生裂隙
  - 16、带状疱疹的水疱位于**棘层**
  - 17、**脓疱型银屑病的脓疱**是由非感染性炎症引起的
  - 18、萎缩的累及皮下组织则表现为**明显凹陷**
  - 19、出血斑直径小于 **2mm** 时称瘀点
  - 20、H<sub>1</sub> 受体拮抗剂的作用机制是**与组胺竞争结合受体**
  - 21、光化学疗法采用的光源是 **UVA**
  - 22、糊剂不适合用于**头部皮损**

- 
- 23、环磷酰胺属于烷化剂类
  - 24、全反式维 A 酸属于第一代维 A 酸
  - 25、直接免疫荧光法检查梅毒螺旋体呈绿色荧光
  - 26、斑贴试验不适用于检查慢性单纯性苔藓
  - 27、甲屑属于浅部真菌标本
  - 28、斑贴试验后受试部位有淡红斑为可疑反应
  - 29、直接免疫荧光法主要用于检测病变组织或细胞中存在的抗体或补体
  - 30、疣的治疗主要采用外用药物和物理治疗
  - 31、传染性软疣的典型皮损是半球形丘疹，表面蜡样光泽，中央有脐凹，内含乳白色干酪样物质
  - 32、带状疱疹后遗神经痛是指皮损消退后 4 周，疼痛持续存在者
  - 33、带状疱疹的传染途径是呼吸道
  - 34、手足口病多发人群是 2~10 岁儿童
  - 35、苹果酱现象可见于寻常狼疮
  - 36、脓疱疮的主要传播途径是直接接触或自身接种传播
  - 37、丹毒需与接触性皮炎，类丹毒，癣菌疹，蜂窝织炎鉴别
  - 38、白癣有自愈倾向
  - 39、手足癣的主要致病菌是红色毛癣菌
  - 40、癣菌疹的治疗应首先予抗过敏治疗
  - 41、治疗孢子丝菌病的首选药是碘化钾
  - 42、最常见的浅部真菌病是手足癣
  - 43、花斑癣的致病菌是马拉色菌

- 
- 44、体癣的传染途径是**直接或间接接触**
  - 45、疥疮的传染途径是**接触传播**
  - 46、**硫黄软膏**不能用于隐翅虫皮炎的治疗
  - 47、疥疮易侵入**皮肤薄嫩处**
  - 48、疥疮临床表现有皮损形态为**丘疹、丘疱疹、线状隧道、疥疮结节**；自觉瘙痒，**晚间为甚**
  - 49、由杜克雷嗜血杆菌引起的性传播疾病是**软下疳**
  - 50、在淋病的发病机制中，淋球菌主要被**单层柱状上皮细胞**吞饮，并在其内繁殖
  - 51、二期梅毒的骨关节损害最常见的是**骨膜炎**
  - 52、非淋病性尿道炎的潜伏期一般是**1~3周**
  - 53、临床上可出现"对吻损害"的疾病是**软下疳**
  - 54、有关生殖器疱疹，妊娠期生殖器疱疹可造成**胎儿流产**
  - 55、非淋病性尿道炎的主要病原体是**沙眼衣原体、生殖和解脲支原体**
  - 56、**L-2血清型沙眼衣原体**是性病性淋巴肉芽肿的病原体
  - 57、**扁平湿疣**是二期梅毒的皮损表现
  - 58、人乳头瘤病毒主要感染**上皮部位**
  - 59、皮肤接触水后出现荨麻疹首先考虑是**水源性荨麻疹**
  - 60、接触性皮炎皮损：皮损形态与接触物**一致**
  - 61、痤疮、毛囊炎型主要见于**长期接触石油、焦油类、矿物类的工人**
  - 62、急性荨麻疹病程不超过**6周**
  - 63、患儿，5岁，从小发病，四肢屈侧红斑、丘疹，呈片状苔藓化，剧痒，反复发作加重，时有少量渗出，其父有哮喘史，诊断为**特应性皮炎**
  - 64、接触致敏反应的诱导期约需**4日**

- 
- 65、婴儿湿疹与异位性皮炎鉴别点是**家族中**有无过敏性疾病史
  - 66、荨麻疹患者伴有高热、脉速和全身中毒症状应注意是**败血症**
  - 67、**接触紫外线**属于工业职业性皮肤病的物理致病因素
  - 68、固定型药疹的皮损可见到**水疱**
  - 69、特应性皮炎渗出性损害最常见于**婴儿**
  - 70、引起接触致敏反应的致敏因子是**半抗原**
  - 71、患者局部外伤感染后于全身出现红斑、丘疹、水疱，糜烂，伴有瘙痒，局部淋巴结肿大，要考虑是**自身敏感性皮炎**
  - 72、表现为局部浸润肥厚，常于冬季引起裂隙的湿疹是**手部湿疹**
  - 73、接触性皮炎与湿疹型的严重程度主要取决于**接触物性质及机体免疫状态**
  - 74、尾蚴皮炎的治疗原则为**消炎、止痒、防止继发感染**
  - 75、急性荨麻疹皮损持续时间一般不超过 **24 小时**