



微信搜一搜



金英杰口腔学院

2021 执业医师考试

压轴命题卷[®]



金英杰口腔学院

2021 年

医师资格考试专用



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



第一单元

A1 型题

每一道考试题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。
请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的
相应字母所属的方框涂黑。

- 下列哪一项不属于一般型成釉细胞瘤的分类
 - 周边型
 - 滤泡型
 - 丛状型
 - 颗粒细胞型
 - 棘皮瘤型
- 球状上颌囊肿诊断条件不包括
 - 囊肿位于上颌恒侧切牙和尖牙之间
 - 邻近牙齿为活髓牙
 - 呈边界清楚的倒置的梨形放射透光区
 - 有时可见含有未萌出牙的牙冠
 - 组织学上可能是牙源性囊肿
- 关于牙周炎描述哪项是错误的
 - 是一种由细菌微生物引起的牙周组织炎症性破坏性疾病
 - 临床特征是：牙龈出血、牙齿松动、牙周溢脓
 - 主要病理改变是：结合上皮破坏向根方移位，牙周袋形成，牙槽骨吸收
 - 所有牙周炎的发展均为一种持续性缓慢过程
 - 晚期牙齿松动、脱落
- 决定牙周炎进展和结局的主要因素是
 - 细菌微生物
 - 食物因素
 - 宿主因素
 - 时间因素
 - 环境因素
- 根据半多能双储备细胞理论，多形性腺瘤来源于
 - 腺上皮细胞
 - 肌上皮细胞
 - 闰管细胞
 - 闰管储备细胞
 - B+C
- 下述哪一项不是疣状癌的特征
 - 常见于 50 岁以上的老年患者
 - 以下唇多见
 - 呈白色刺状或乳头状
 - 生长迅速
 - 上皮细胞成球状向下方结缔组织中破坏性推进生长
- 下列腺体中可能具有内分泌功能的是
 - 舌下腺
 - 腮腺
 - 腮腺
 - 颊腺
 - 舌腺

- 舌下腺
 - 腮腺
 - 腮腺
 - 颊腺
 - 舌腺
- 增殖性红斑在临床表现为红色斑块的原因是
 - 上皮表层为不全角化层覆盖
 - 钉突之间的上皮萎缩变薄
 - 结缔组织内血管增生，扩张充血
 - 上皮钉突增大处的表面形成凹陷
 - 以上均是
 - 早期浸润邻近的神经和血管的肿瘤是
 - 多形性腺瘤
 - 粘液表皮样癌
 - 恶性混合瘤
 - 腺样囊性癌
 - 基底细胞腺瘤
 - 以下哪项不是多形性腺瘤的病理表现
 - 上皮和肌上皮细胞形成条索
 - 上皮和肌上皮细胞形成片块、集密排列
 - 与粘液样或软骨样组织混合
 - 鳞状化生
 - 包膜完整、厚薄一致
 - 肉眼观察，含牙囊肿的囊壁附着于
 - 牙冠 1/2 处
 - 牙根冠方 1/3 处
 - 牙根根方 1/3 处
 - 釉牙骨质界
 - 釉牙本质界
 - 不属混合性腺体范畴的是
 - 舌下腺
 - 唇腺
 - 颊腺
 - 腮腺
 - 磨牙后腺
 - 牙体硬组织形成先后顺序正确的是
 - 牙釉质、牙本质、牙骨质
 - 牙本质、牙釉质、牙骨质
 - 牙骨质、牙本质、牙釉质
 - 牙本质、牙骨质、牙釉质
 - 牙釉质、牙骨质、牙本质
 - 下列哪项不是进展期牙周炎的病理变化
 - 结合上皮下方的胶原纤维水肿、变性、丧失
 - 牙槽嵴顶的固有牙槽骨吸收、消失
 - 结合上皮向根方增殖、延伸，形成深牙周袋



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



- D. 牙周袋内有大量炎性渗出物
E. 结缔组织内出现大量的淋巴细胞
15. 下述哪个因素与合力大小无关

A. 性别
B. 年龄
C. 合力方向
D. 面部距离
E. 咀嚼习惯

16. 咀嚼效率对临床诊断和治疗的意义有下列几点, 除了

A. 诊断咀嚼器官功能紊乱影响的程度
B. 可帮助判断全身健康情况的强弱
C. 修复或正畸治疗后咀嚼功能的评定
D. 为制订矫治计划提供依据
E. 牙列缺失后咀嚼功能的评定

17. 下述磨耗的生理意义中哪一条不正确

A. 消除早接触
B. 有利于冠根比的协调
C. 形成尖牙保护合
D. 为第三磨牙萌出提供空间
E. 磨除初期龋坏

18. 磨耗与磨损的主要区别为

A. 都是牙与牙之间的磨擦, 发生在牙体的部位不同
B. 都是牙与食物之间的磨擦, 发生在牙体的部位不同

同

C. 前者是牙与牙之间的磨擦, 后者是牙与食物之间的磨擦

D. 前者是牙与牙或牙与食物之间的磨擦引起, 后者是牙与外物机械磨擦产生, 且发生在牙体的部位不同

E. 前者是牙与牙或牙与食物之间的磨擦引起, 后者是牙与外物机械磨擦产生, 且发生在牙体的部位相同

19. 下述舌的生理功能中哪一项不正确

A. 在口腔内保持或运送被咀嚼的食团
B. 接触被嚼细的食物, 产生吞咽反射
C. 具有味觉感受器, 能辨别不同的滋味
D. 具有触、压、温度和痛觉, 能辨认异物
E. 清除牙齿间和口腔前庭的食物残片

20. 患有腭裂的病人在行使口腔功能时会出现下述问题, 除了

A. 嚼细食物有困难
B. 说话有鼻音
C. 易使食物误入气管
D. 吞咽困难
E. 吸乳困难

21. 下述有关咀嚼对牙合、颌、面生长发育的影响中哪项不正确

A. 咀嚼运动对咀嚼肌所附着的上下颌骨均是功能性刺激

B. 强而有力的咀嚼肌附着于下颌骨, 因而比上颌骨发育粗壮

C. 为适应咀嚼力, 上颌骨有尖牙支柱、颧突支柱和翼突支柱以增加对咀嚼力的承受

D. 颌骨表层因咀嚼肌的附着而坚厚, 附着处突起成嵴

E. 下颌角由于咀嚼肌的牵引向后下突起。下颌角变钝

22. 下述咀嚼运动的功能刺激, 在正常建合的作用中哪点不正确

A. 促进建立中性合关系
B. 通过生理性咀嚼磨耗消除早接触点
C. 刺激颌骨的增长
D. 促进恒牙的正常萌出
E. 促进形成组牙功能合

23. 有关唾液的性质哪一点不正确

A. 粘稠液体
B. 比重较水大
C. pH 值范围在 6.0~7.9
D. 餐后为酸性
E. 渗透压随分泌率变化

24. 唾液对食物的分解是通过什么起作用

A. 氧化酶
B. 溶菌酶
C. 淀粉酶
D. 硫酸盐
E. 唾液腺素

25. 下列关于眶下孔的描述, 哪项是错误的

A. 位于眶下缘中点下方约 0.5cm 处
B. 位于尖牙窝的上方
C. 向后下外通入眶下管
D. 孔内有眶下神经血管通过
E. 经眶下管通眶下沟

26. 腭大孔表面标志为

A. 上颌第三磨牙腭侧龈缘至腭中缝连线的中外 1/3 交点上

B. 上颌第三磨牙腭侧龈缘至腭中缝连线的中点上

C. 上颌第一磨牙腭侧龈缘至腭中缝连线的中外 1/3 交点上

D. 上颌第一磨牙腭侧龈缘至腭中缝连线的中点上

E. 上颌第二磨牙腭侧龈缘至腭中缝连线的中点上

27. 下列关于颞孔的描述, 哪个是错误的

A. 位于第二双尖牙的下方

B. 位于第一、二双尖牙之间的下方



- C. 成人多朝向后、上、外方
D. 一般位于下颌骨上下缘之间的稍上方
E. 随年龄的增大该孔位置可逐渐下移
28. 已知双链 DNA 中一条链的 A=25%，C=35%，其互补链的碱基组成应是
- A. T 和 G60%
B. A 和 G60%
C. G 和 G35%
D. T 和 G35%
E. T 和 G35%
29. 酶催化胆汁酸的去结合反应和脱 7 α -羟基作用是
- A. 肠道细菌酶
B. 磷脂酶
C. 磷酸酶
D. 脂肪酶
E. 葡糖醛酸基转移酶
30. 能引起骨髓抑制的药物是
- A. 两性霉素
B. 制霉菌素
C. 四环素
D. 妥布霉素
E. 氯霉素
31. 不属于抗肠蠕虫病的是
- A. 甲苯达唑
B. 哌嗪
C. 阿苯达唑
D. 噻嘧啶
E. 氯喹
32. 主要用于控制远期复发和传播的抗疟药
- A. 吡喹酮
B. 氯喹
C. 伯氨喹
D. 乙胺嘧啶
E. 青蒿素
33. 可引起灰婴综合征的是
- A. 氯霉素
B. 多西环素
C. 土霉素
D. 四环素
E. 米诺环素
34. 磺胺药抗菌机制是
- A. 抑制 DNA 螺旋酶
B. 抑制二氢叶酸还原酶
C. 抑制二氢叶酸合成酶
D. 改变膜通透性

- E. 抑制分枝菌酸合成
35. 卫办医政发〔2009〕38 号文的要求，当目标细菌耐药率超过 50% 的抗菌药物时应
- A. 及时将预警信息通报本机构医务人员
B. 参照药敏试验结果选用
C. 慎重经验用药
D. 暂停该类抗菌药物的临床应用
E. 无需处理
36. 医疗机构临床用血文书不包括
- A. 输血治疗知情同意书
B. 输血过程和输血后疗效评价意见
C. 输血记录单
D. 患者输血适应证的评估
E. 献血员信息
37. 某地区某种疾病的发病率明显超过历年的散发发病率水平，则认为该病
- A. 暴发
B. 散发
C. 有季节性
D. 大流行
E. 流行
38. 采用化学预防的对象主要是
- A. 已出现症状的病人
B. 有既往病史的人
C. 正在治疗的人
D. 正在康复的人
E. 无症状的人
39. 不属于毒蕈中毒类型的是
- A. 胃肠炎型
B. 溶血型
C. 神经精神型
D. 类伤寒型
E. 肝损伤型
40. 一位心理学专家为了对 1-3 岁幼儿作心理评估，去孩子所在的幼儿园观看该幼儿在游戏中的表现，这种心理评估的方法是
- A. 现状调查法
B. 自由式会谈法
C. 控制观察法
D. 自然观察法
E. 心理测验法
41. “心理障碍大多为幼年压抑的潜意识冲突而引起”。持这种观点的学派是
- A. 心理生理学派
B. 人本主义学派
C. 认知行为学派





D. 行为主义学派

E. 精神分析学派

42. 根据求医的决定权, 可将求医行为分成

A. 主动型、参与型、强制型

B. 主动型、指导型、合作型

C. 主动型、被动型、强制型

D. 参与型、指导型、合作型

E. 参与型、被动型、强制型

43. 依据心理学的理论和方法对人的心理品质及水平做出的鉴定称为

A. 心理诊断

B. 心理测量

C. 心理测验

D. 心理调查

E. 心理评估

44. 2 岁前生活在高氟区的儿童, 以后随父母迁居低氟区, 观察到氟牙症病变的恒牙是

A. 前牙和第一磨牙

B. 第一前磨牙和第一磨牙

C. 前牙、第一前磨牙和第一磨牙

D. 尖牙

E. 全部牙均有病变

45. 堤平面与上唇下缘的关系是

A. 唇上 2mm

B. 与唇平齐

C. 唇下 2mm

D. 唇下 3mm

E. 唇下 4mm

46. 上颌前牙的远中向倾斜角度为

A. 中切牙=侧切牙=尖牙

B. 中切牙>侧切牙>尖牙

C. 中切牙>类牙>侧切牙

D. 侧切牙>尖牙>中切牙

E. 尖牙>侧切牙>中切牙

47. 临床上用于记录颌位关系的是

A. 基托

B. 暂基托

C. 合堤

D. 托

E. 蜡基托

48. HB 中一个亚基与其配体 (O₂) 结合后, 促使其构象发生变化, 从而影响此寡聚体与另一亚基与配体的结合能力, 此现象称为

A. 协同效应

B. 共价修饰

C. 化学修饰

D. 激活效应

E. 别构效应

49. 某环境卫生监督机构拟定对全市噪音进行监测取证, 其卫生学评价中表示声音强度大小的单位最常用的为

A. 声阈值

B. 声指数

C. 声震率

D. 声压级

E. 声强度

50. 牙髓组织切片中见血管扩张、充血, 慢性炎细胞浸润。其中见胶原纤维包绕一圆形组织坏死区, 内充满死亡的中性粒细胞。此病变最可能是

A. 急性化脓性牙髓炎

B. 急性浆液性牙髓炎

C. 牙髓坏死

D. 慢性闭锁性牙髓炎

E. 慢性溃疡性牙髓炎

51. 一个 1 岁半男婴, 口内检查发现, 上下颌乳中切牙和乳侧切牙均已萌出, 按照一般乳牙萌出顺序: 在其口内萌出的下一颗牙为

A. 下颌乳尖牙

B. 上颌乳尖牙

C. 上颌第一乳磨牙

D. 下颌第一乳磨牙

E. 下颌第二乳磨牙

52. F 药厂销售代表和某医院多名医师约定, 医师在处方时使用 F 药厂生产的药品, 并按使用量的多少给予提成。事情曝光以后, 按《药品管理法》的规定, 对 F 药厂可以作出行政处罚的部门是

A. 药品监督管理部门

B. 工商行政管理部门

C. 税务管理部门

D. 医疗保险部门

E. 卫生行政部门

53. 皑皑白雪, 在晚霞的映照下显现出一片红色, 但人们仍然对雪地知觉为白色, 这是因为人的知觉具有

A. 整体性

B. 选择性

C. 理解性

D. 恒常性

E. 多维性

54. “来访者, 男, 18 岁, 大学生, 求助的问题是, 多年来不能感知自己内心的感受, 更不知如何向其他人包括自己的家人讲述自己内心的感受, 从而来寻求帮助。”对于这样的来访者, 心理治疗师首选的方法为



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



- A. 人本主义
- B. 精神分析
- C. 生物反馈
- D. 厌恶治疗
- E. 催眠治疗

55. 不属于可摘局部义齿的部件是

- A. 间接固位体
- B. 冠内固位体
- C. 桥体
- D. I 杆
- E. 邻面板

56. 人工后牙的牙尖斜度过小会导致

- A. 咀嚼效率降低
- B. 力过大
- C. 力过小
- D. 侧向力过大
- E. 早接触

57. 属于主承托区

- A. 上颌牙槽嵴顶
- B. 磨牙后垫
- C. 切牙乳突
- D. 颊侧前庭
- E. 颊系带

58. 适度扩大基托面积, 可以达到以下目的, 除了

- A. 减小单位面积压力
- B. 增加义齿强度
- C. 增大义齿吸附力
- D. 增大大气压力的作用
- E. 利于组织保健

59. 全口义齿初戴时, 如果出现前牙开合, 其原因不可能是

- A. 颌关系错误
- B. 人工牙变位
- C. 上下颌基托远端有早接触
- D. 后牙区咬合高
- E. 患者不会用义齿咬合

60. 下颌基托一般应盖过磨牙后垫的

- A. 全部
- B. 2/3
- C. 3/1~1/2
- D. 1/4
- E. 前缘

61. 腭小凹位于

- A. 切牙乳突前方
- B. 腭皱与切牙乳突之间
- C. 腭皱后方

D. 上颌牙槽嵴后缘

E. 软硬腭交界处, 腭中缝两侧

62. 全口义齿修复应在拔牙多长时间后进行

- A. 一周
- B. 三周
- C. 一个月
- D. 三个月
- E. 六个月

63. 全口义齿后牙选用无尖牙的优点不包括

- A. 侧向力小
- B. 有利于义齿的稳定
- C. 容易达到平衡合
- D. 对牙槽嵴损害小
- E. 咀嚼效率低

64. 全口义齿摘戴时疼痛, 定位明确, 戴入后无明显不适。其原因是

- A. 基托边缘过长
- B. 基托进入组织倒凹
- C. 基托组织面有小结节
- D. 骨隆突处未缓冲
- E. 基托不密合

65. 切牙乳突在全口义齿修复中的作用是

- A. 确定: 平面的标志
- B. 确定后堤区的标志
- C. 确定牙槽嵴顶的标志
- D. 确定基托伸展范围的标志
- E. 排列上颌中切牙的参考标准

A2 型题

每一道考试题都是以一个小案例出现的, 其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

66. 女, 25 岁, 颊黏膜处有一蓝紫色的包块, 质软, 可被压缩。镜下可见瘤组织由衬有内皮细胞的血窦组成, 其间可见菲薄的结缔组织间隔。病理诊断为

- A. 蔓状血管瘤
- B. 毛细血管瘤
- C. 肉芽组织性血管瘤
- D. 海绵状血管瘤
- E. 血管性龈瘤

67. 男, 40 岁。左下颌磨牙区颌骨逐渐膨胀 1 年。X 线片显示下颌骨磨牙区有不规则透光区内含有大小不等的不透光团块。镜下可见肿瘤有多边形上皮细胞组成, 细胞间桥清晰, 上皮细胞排列成片状或岛状, 细胞之间可见圆形嗜酸性均质性物质。病理诊断为

- A. 成釉细胞瘤





- B. 牙源性角化囊肿
- C. 牙源性钙化上皮瘤
- D. 成釉细胞纤维瘤
- E. 牙源性腺样瘤

68. 男, 6 岁。严重营养不良, 口腔卫生较差, 软垢和牙石较多。龈乳头及龈缘坏死, 牙龈边缘呈蚕食状缺损, 表面有灰白色假膜, 患处易出血。颌下淋巴结肿大。镜下可见病变表面有纤维索性渗出, 结缔组织水肿, 有大量中性粒细胞浸润, 龈沟液涂片可见到大量的螺旋体和梭形杆菌。病理诊断为

- A. 慢性龈炎
- B. 龈增生
- C. 急性坏死性溃疡性龈炎
- D. 浆细胞龈炎
- E. 剥脱性龈病损

69. 男, 65 岁, 口底区有一菜花样肿物, 质硬, 不活动。镜下可见角化的上皮向外呈乳头状过度增生, 向下浸润至结缔组织内, 细胞轻度异型。结缔组织内炎症反应不明显

- A. 腺样鳞状细胞癌
- B. 腺鳞癌
- C. 未分化癌
- D. 基底样鳞状细胞癌
- E. 疣状癌

70. 女, 58 岁, 硬腭部出现一小的包块, 约 1cm, 偶有轻微不适。镜下可见肿瘤细胞排列成圆形、卵圆形或不规则的上皮团块, 呈筛孔状排列, 筛孔中心为黏液样组织, 嗜酸性染色。病理诊断为

- A. 肌上皮瘤
- B. 黏液表皮样癌
- C. 腺淋巴瘤
- D. 多形性腺瘤
- E. 腺样囊性癌

71. 男, 50 岁, 软腭处有一疱, 约 $1 \times 1 \text{cm}^2$ 大小, 稍有糜烂, 疼痛明显。皮肤尼氏征阳性。镜下可见, 棘层松解, 上皮内疱形成。基底细胞附着于结缔组织的上方, 疱底可见不规则的乳头成绒毛状突起, 突起表面有基底细胞层。固有层有炎细胞浸润。病理诊断为

- A. 天疱疮
- B. 良性黏膜类天疱疮
- C. 扁平苔藓
- D. 慢性盘状红斑狼疮
- E. 复发性阿弗他溃疡

72. 男, 70 岁。腮腺区有一包块, 质硬, 不活动, 面部有麻木感。镜下可见肿瘤组织中与上皮细胞构成的实性团片, 偶见筛孔状结构。病理诊断可考虑为

- A. 多形性腺瘤
- B. 上皮肌上皮癌
- C. 黏液表皮样癌
- D. 腺泡细胞癌
- E. 腺样囊性癌

73. 男, 54 岁, 腮腺区无痛性包块 2 年。镜下可见肿瘤有上皮和淋巴样组织组成。上皮成分形成不规则的囊腔并突入管腔内, 其上皮细胞排列成假复层。病理诊断为

- A. 多形性腺瘤
- B. 腺淋巴瘤
- C. 肌上皮瘤
- D. 嗜酸性腺瘤
- E. 黏液表皮样癌

74. 男, 60 岁, 唇部有一包块, 常有溃疡, 边缘较硬, 与周围组织粘连, 不活动。镜下可见癌细胞向黏膜下层浸润生长, 呈团块状排列, 形成癌巢, 中间可见角化珠。癌巢周边立方状基底细胞中可见核分裂像。病理诊断为

- A. 鳞状细胞癌
- B. 基底细胞癌
- C. 乳头状瘤
- D. 黏液表皮样癌
- E. 未分化癌

75. 男, 20 岁, 无明显症状, 拔除左侧第三磨牙时发现下颌升支部有一大的阴影。镜下可见: 囊肿衬里上皮为一薄层复层鳞状上皮, 无上皮钉突。基底细胞层界限清楚, 棘层较薄。衬里上皮表面常呈波状或皱折状。病理诊断为

- A. 成釉细胞瘤
- B. 含牙囊肿
- C. 球状上颌囊肿
- D. 牙源性钙化囊肿
- E. 牙源性角化囊肿

76. 男, 26 岁, 牙齿松动 1 月余, 患牙有合创伤。镜下可见牙槽骨的硬骨板消失。牙根面发生吸收。牙周膜间隙增宽, 固有牙槽骨一侧发生吸收, 一侧发生增生。病理诊断为

- A. 牙周炎
- B. 牙周萎缩
- C. 牙周创伤
- D. 牙周变性
- E. 以上都不是

77. 女, 18 岁, 上颌尖牙区有一 1cm 大小的包块, X 线片显示包块中有不透光的钙化颗粒。镜下可见 4 种结构: ①肿瘤上皮组成的玫瑰花样结构。②腺管样结构由





立方状细胞组成腺管样结构组成。③由多边形嗜酸性鳞状细胞组成的小结节。④肿瘤的周边部有筛状结构。病理诊断为

- A. 成釉细胞瘤
- B. 牙源性腺样瘤
- C. 含牙囊肿
- D. 牙源性钙化上皮瘤
- E. 牙源性钙化囊肿

78. 女, 38 岁, 双颊粘膜白色病变 1 年。活检标本见上皮萎缩, 表面不全角化, 上皮钉突呈不规则延长, 基底细胞层液化变性, 液化明显者可出现上皮下疱, 固有层内近上皮区域见淋巴细胞浸润带。病理诊断应为

- A. 慢性盘状红斑狼疮
- B. 寻常性大疱疮
- C. 扁平苔藓
- D. 良性粘膜类天疱疮
- E. 念珠菌病

79. 男, 45 岁, 口腔内粘膜多处起疱, 疱破后形成结痂。镜下见病变浅层上皮脱落, 仅见基底细胞附着于结缔组织上方, 呈绒毛状, 其上方见个别松散的圆形细胞, 胞核圆形, 大而肿胀, 染色质多, 胞核周围有窄的晕。上述表现提示的病理诊断为

- A. 寻常性天疱疮
- B. 良性粘膜类天疱疮
- C. 艾滋病的口腔表现
- D. 扁平苔癣
- E. 肉芽肿性唇炎

80. 某一 17 岁的男患者, 近来饮冷水时, 有左上后牙一过性疼痛。检查发现: 左上第一磨牙近中邻面有深龋洞, 在治疗这个龋过程中, 最易出现意外穿髓的部位是

- A. 近中颊侧髓角和远中颊侧髓角
- B. 近中舌侧髓角和远中舌侧髓角
- C. 近中颊侧髓角和近中舌侧髓角
- D. 远中颊侧髓角和远中舌侧髓角
- E. 以上都不是

81. 男, 50 岁, 左上中切牙有深楔状缺损, 可探及露髓孔, 探无感觉, X 线检查发现根尖有大面积阴影。在进行根管治疗时, 有关开髓部位的选择哪一种说法是正确的

- A. 由于楔状缺损部位已经通髓腔, 可从楔状缺损处制备进入髓腔的洞型
- B. 由于切牙的舌面窝髓壁薄, 可以从舌面窝向牙颈部方向钻入
- C. 由于切牙的髓腔形态与切牙的外形基本一致, 可以从切端开始向牙根方向钻入

D. 只要能进入髓腔的任何一部位都可以

E. 以上都不是

82. 女性, 25 岁, 因重度四环素牙, 欲行切牙贴面修复, 临床检查发现: 除牙齿颜色呈深褐色外, 无明显牙体缺损, 在制作树脂贴面形成中切牙唇面外形时, 下列说法哪个是正确的

- A. 近中边缘嵴和远中边缘嵴一样, 比较直
- B. 切缘与近远中边缘嵴都成直角
- C. 颈缘成直线型
- D. 切缘与远中边缘嵴所成的角度比近中边缘嵴成的角度要圆钝
- E. 以上都不是

83. 某一医生用拔牙钳先后拔除上颌中切牙和侧切牙时, 发现他在同样施用旋转的方式, 而且拔牙钳安放位置正确。施力的大小和速度基本一致情况下, 侧切牙的牙根尖三分之一折断在牙槽窝内, 分析其原因最有可能的是

- A. 侧切牙的牙根比中切牙的牙根更易折断
- B. 侧切牙牙根尖三分之一常有弯曲施用旋转力拔除时较易折断
- C. 拔除侧切牙时, 旋转力施用不够
- D. 与拔除中切牙和侧切牙的先后顺序有关
- E. 以上都不是

84. 男, 50 岁, 因深楔状缺损, 致左侧上颌尖牙, 牙冠折断。现已行完善根充及桩核修复, 即将开始用冠修复尖牙外形。临床检查发现, 尖牙在牙弓中的位置及咬合关系基本正常, 对侧尖牙外形正常, 在形成冠外形时, 下列说法哪一个是正确的

- A. 在邻面与侧切牙相邻的面比与双尖牙相邻面更为突出且短小
- B. 从唇面观, 近中牙尖嵴比远中牙尖嵴更长
- C. 在舌窝中央, 没有明显的纵嵴出现
- D. 与侧切牙的接触区距牙尖嵴近, 与双尖牙的接触区距牙尖嵴远中而且偏舌侧
- E. 以上都不是

85. 男, 20 岁, 精神分裂症, 一直服用氯丙嗪, 原来的激动不安、幻觉妄想已消失, 近来变得行为退缩、寡言少语, 情感淡漠有明显手指颤动, 请选用一组药物代替氯丙嗪

- A. 氯氮平、苯海索
- B. 氯氮平、阿托品
- C. 氟奋乃静、阿托品
- D. 三氟拉嗪、左旋多巴
- E. 氟奋乃静、左旋多巴

86. 女, 40 岁, 因风湿性心脏病出现心衰, 心功 II 级, 并有下肢水肿, 经地高辛治疗后, 心功有改善, 但



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



水肿不见好转，检查发现血浆醛固酮水平高，此时最好选用

- A. 呋塞米
- B. 氢氯噻嗪
- C. 螺内酯
- D. 丁苯氧酸
- E. 氨苯蝶啶

87. 病员患胆管癌，术中术者用手指钝性剥离胆总管而撕破静脉急性大出血，慌乱中用钳夹止血，造成静脉完全离断，虽经吻合，病员终因急性肝功能衰竭而死亡。产生的后果属于

- A. 医疗意外
- B. 医疗差错
- C. 病情重笃而发生的难以避免的死亡
- D. 医疗事故
- E. 手术难以避免的并发症

88. 某男性，某矿场采矿工，年龄 25 岁，工龄约 2 年。主诉咳嗽、气短、胸痛就诊。检查发现，X 线胸片呈肺纹理增加，伴有块状阴影和典型结节。患者自述，他工作场所条件很差无防尘设施，此工人最可能患何种类型矽肺

- A. 晚发性矽肺
- B. 弥漫性矽肺
- C. 间质性矽肺
- D. 重型矽肺
- E. 速发性矽肺

89. 女，45 岁，牙龈起疱半年，色灰白，不易破溃。镜下见上皮基底层下疱，基底细胞变性，部分区域上皮全层剥脱，结缔组织表面平滑，胶原纤维水肿，其中有大量淋巴细胞、浆细胞及嗜酸粒细胞浸润。最可能的病理诊断为

- A. 复发性阿弗他溃疡
- B. 寻常性天疱疮
- C. 良性粘膜类天疱疮
- D. 艾滋病的口腔表现
- E. 肉芽肿性唇炎

90. 女，35 岁，发现舌背白色病损 4 个月，检查发现其舌背左侧约 0.5cm×0.5cm 白色角化病损，边界欠清楚，表面光滑略呈淡紫色。患者发病前有精神创伤史，下肢皮肤有多角形紫红色丘疹，表面有 Wickham 条纹。分析该患者诊断可能是

- A. 白斑
- B. 扁平苔藓
- C. 白色角化症
- D. 梅毒斑
- E. 盘状红斑狼疮

91. 男，80 岁，全口无牙牙合。戴全口义齿近 15 年，因黏膜不适就诊。查见黏膜呈红亮色，水肿，有黄白色假膜，直接镜检见菌丝和芽胞。该患者治疗中不妥的用药为

- A. 制霉菌素
- B. 酮康唑
- C. 碳酸氢钠漱口水
- D. 青霉素
- E. 克霉唑

92. 男，25 岁。因口腔颌面部创伤致舌体裂伤，出血明显，口底肿胀，来院急诊，最有效合理的止血方法是

- A. 注射止血针
- B. 指压患侧的颈总动脉
- C. 用纱布块填塞止血
- D. 创口缝合止血
- E. 做颈外动脉结扎术

93. 男，35 岁，远中舌侧大面积龋坏缺损，已进行完善根管治疗后，原银汞充填物经常脱落，现要求全冠修复，检查：无叩痛无松动，咬合距离正常，临床牙冠较高，可用以下几种修复治疗方法，除外

- A. 金属烤瓷全冠
- B. 烤瓷全冠
- C. 塑料全冠
- D. 金属全冠
- E. 嵌体

94. 女，30 岁。查，牙体未见异常，牙龈红肿，有真性牙周袋形成，冷热刺激痛，X 线显示：牙槽骨吸收 1/3。诊断：牙周牙髓联合病变。牙周炎引起牙髓炎的途径最可能是

- A. 根管
- B. 副根管
- C. 根管侧支
- D. 管间侧支
- E. 根尖分歧

95. 男，16 岁。不慎跌倒，颈部先着地受撞击，致下颌中线偏左侧，左侧后牙早接触，前牙及右侧后牙开牙合，应考虑的诊断是

- A. 左侧髁状突颈部骨折
- B. 颞肌、咬肌痉挛
- C. 右侧颞下颌关节脱位
- D. 左侧颞下颌关节脱位
- E. 左侧髁突骨质增生

96. 56 岁无牙颌患者，义齿戴用 7 年，自觉咀嚼不利，面显苍老。其原因是

- A. 垂直距离过高





- B. 垂直距离过低
- C. 下颌前伸
- D. 咬合不平衡
- E. 义齿固位差

97. 女性, 24 岁, 主诉: 用牙线清洁牙齿时牙龈有时出血。检查: 牙龈乳头轻度充血、水肿, PD: 2~3mm, 未及附着丧失。此患者最可能的诊断是

- A. 边缘性龈炎
- B. 牙间乳头炎
- C. 青少年牙周炎
- D. 青春期龈炎
- E. 急性坏死性龈炎

98. 10 岁男孩, 右下后牙疼痛 1 星期就诊。检查: 右下第一前磨牙畸形中央尖折断, 叩(++), 松动 2 度。牙龈充血。x 线检查, 右下第一前磨牙根形成 2/3。根周骨硬板不连续。治疗选择

- A. 氢氧化钙冠髓切断术
- B. 备洞光敏树脂充填
- C. 氢氧化钙根尖诱导成形术
- D. 氧化锌丁香油糊剂根管治疗
- E. 碘仿糊剂根管治疗术

99. 女, 14 岁, 前牙牙列不齐、拥挤、前牙唇侧牙间乳头肥大, 牙龈充血水肿, 无疼痛, 此患者最可能的诊断是

- A. 妊娠期龈炎
- B. 牙龈纤维瘤病
- C. 药物性增生
- D. 青春期龈炎
- E. 白血病

100. 某患者, 右下 6 缺失, 行双端固定桥修复。固定桥试戴时, 固定桥前后翘动, 桥体下黏膜发白, 最可能的原因是

- A. 邻接触点过紧
- B. 就位道不一致
- C. 有早接触
- D. 制作的桥体龈端过长
- E. 固位体边缘过长

101. 患者张某, 因患有大骨节病来某医院诊治。医务人员发现此病例较典型, 欲拍摄多个部位的 x 线片作为教学资料, 于是没有征求患者的同意, 又让患者补拍双膝、双肘、双手、双足、脊柱等部位的 x 线片。关于本案例, 说法恰当的是

- A. 医生未尊重患者知情同意的权利
- B. 促进医学教学和科研是患者的一项义务, 医生的做法无不妥之处
- C. 医生可不向患者说明, 但应免费拍摄增加的部位

D. 医生为了减少纠纷而不向患者说明情况是可以理解的

E. 对患者无大伤害而对医院有利的事情在道德上是能通过辩护的, 即可以不让患者知情

102. 患者男性 25 岁, 左面颊、上下眼睑及额头巨大动静脉畸形, 可闻及杂音, 触及波动感。对于该患者的最佳治疗方案为

- A. 硬化剂治疗
- B. 手术切除
- C. 冷冻治疗
- D. 栓塞后手术治疗
- E. 放射治疗

103. 某患者, 一上前牙牙冠大部缺损, 作桩冠修复时, 根管制备的长度应达根长的

- A. 1/5~2/5
- B. 3/5~4/5
- C. 1/2~1/3
- D. 1/4~1/2
- E. 2/3~3/4

104. 患者男性 30 岁, 横位埋伏阻生, 拔除过程中发现根长大, 紧卡于两牙之间, 为避免损伤正常牙根, 最佳的处理方法为

- A. 平凿劈开牙冠与牙根
- B. 冠周增隙
- C. 继续扩大骨窗
- D. 涡轮钻分开牙根与牙冠
- E. 关闭伤口, 停止手术

105. 患者男, 36 岁, 三个月前因外伤一上前牙脱落。口腔检查: 左上 1 缺失, 间隙正常, 牙槽嵴无明显吸收。右上 1 缺失, 间隙正常, 牙槽嵴无明显吸收。右上 1 牙冠 1/2 缺损, 已露髓, 探稍敏感, 叩诊阴性, 无松动。左上前牙牙龈轻度红肿, 易出血, 可见菌斑及牙石。余牙未见异常。下列对桩核牙体预备的描述正确的是

- A. 按金瓷冠预备体的要求进行右上 1 的残冠磨除
- B. 齐龈磨除右上 1 的残冠
- C. 牙体预备不应磨除薄壁
- D. 为增强固位可在根管内壁预备倒凹
- E. 以上都不对

106. 患者男, 36 岁, 三个月前因外伤一上前牙脱落。口腔检查: 左上 1 缺失, 间隙正常, 牙槽嵴无明显吸收。右上 1 缺失, 间隙正常, 牙槽嵴无明显吸收。右上 1 牙冠 1/2 缺损, 已露髓, 探稍敏感, 叩诊阴性, 无松动。左上前牙牙龈轻度红肿, 易出血, 可见菌斑及牙石。余牙未见异常。下列哪项不是修复前进行的必要的检查和治疗工作

- A. 前牙区牙片





- B. 右上 1 根管治疗
- C. 右上 2 根管治疗
- D. 牙周洁治
- E. 取研究模型

107. 患者右下 6 缺失三个月，要求固定修复。为抵抗桥体受力产生的屈矩作用所导致的脱位，固位体增加的辅助固位沟应位于

- A. 基牙颊舌侧
- B. 基牙近远中侧
- C. 基牙邻颊轴线角
- D. 基牙邻舌轴线角
- E. 以上都不是

108. 内科医生王某，在春节探亲的火车上遇到一位产妇临产，因车上无其他医务人员，王某遂协助产妇分娩。在分娩过程中，因牵拉过度，致新生儿左上肢臂丛神经损伤。王某行为的性质为

- A. 属于违规操作，构成医疗事故
- B. 属于非法行医，不属医疗事故
- C. 属于超范围执业，构成医疗事故
- D. 属于见义勇为，不构成医疗事故
- E. 属于采取紧急医疗措施，虽造成不良后果，但不属医疗事故

109. 某病人于 2003 年 6 月 1 日因胆囊炎住院手术治疗，术中曾输血 300ml，住院 22 天后出现全身乏力、纳差，伴肝区疼痛，经诊断为乙肝。你认为该患者是

- A. 院内感染
- B. 院外感染
- C. 自身感染
- D. 接触感染
- E. 住院感染

110. 某患者，右下 6 缺失，一年前行双端固定桥修复。近日右下 5 出现自发痛，冷热刺激加重。最可能的原因是

- A. 牙髓炎
- B. 牙周炎
- C. 牙本质过敏
- D. 创伤
- E. 负担过大

111. 男，25 岁。外地民工，车祸后昏迷被送某医院急诊室，诊断为多发性骨折伴出血，需马上手术。医生要求病人家属签字并缴纳手术押金后方能手术，因此延误了病人的治疗。医生的做法明显侵犯了病人的

- A. 平等权
- B. 监督权
- C. 知情权
- D. 隐私保密权

E. 生命健康权

112. 男，12 岁。半年前上前牙外伤，冠折露髓未治疗，现因唇侧牙龈肿就诊。医师必须做的检查是

- A. 叩诊
- B. 查松动度
- C. 温度测验
- D. X 线片检查
- E. 牙周袋探诊

113. 女，40 岁。因右下第一中切牙缺失要求修复。临床检查时发现右下侧切牙近中面釉质呈白垩色及黄褐色斑点，釉质有缺损。诊断为光滑面浅龋。应做的治疗是

- A. 药物治疗
- B. 再矿化治疗
- C. 玻璃离子水门汀充填
- D. 复合树脂充填
- E. 银汞合金充填

114. 男，52 岁。右侧严重的三叉神经第 II、III 支痛伴痛性抽搐。所谓痛性抽搐，是指伴疼痛而发生的

- A. 面部潮红
- B. 眼结膜充血
- C. 表情肌不自主痉挛
- D. 咬唇、伸舌
- E. 用力揉搓面部

115. 男，38 岁。右下颌角部无痛性肿大 3 年，结合 X 线检查，明确诊断为右下颌骨成釉细胞瘤。符合传统治疗原则的是

- A. 成釉细胞瘤刮除术
- B. 肿瘤外 0.5cm 处切除
- C. 肿瘤外 1.0cm 处切除
- D. 肿瘤外 1.5cm 处切除
- E. 肿瘤外 2.0cm 处切除

116. 一患者戴用全口义齿一周，主诉咀嚼费力，粘膜压痛，面部酸胀。处理方法是

- A. 坚持戴用，逐渐适应
- B. 调合
- C. 基托组织面缓冲
- D. 重新制作
- E. 重衬

117. 患者戴用全口义齿一月，复查时自述戴牙后一直感觉咀嚼无力，面部酸痛。如果检查发现息止颌间隙过大，最好的处理方法是

- A. 重衬
- B. 自凝塑料加高咬合
- C. 嘱患者慢慢适应
- D. 修改面形态





E. 重新制作

118. 男, 50 岁。金属全冠黏固后一个月, 咀嚼时出现咬合痛, 最有可能的原因是

- A. 急性牙髓炎
- B. 创伤性尖周炎
- C. 牙龈萎缩引起颈部过敏
- D. 慢性牙髓炎
- E. 继发龋

119. 6 岁儿童, 第一恒磨牙完全萌出, 检查发现猙面窝沟深, 窝沟点隙似有初期龋损, 此时适宜采取的防治措施是

- A. 应做窝沟封闭
- B. 应做充填
- C. 应做预防性充填
- D. 尚不能做窝沟封闭
- E. 口服氟片

120. 某无牙颌患者, 上下颌弓位置关系正常, 牙槽嵴丰满, 上颌相当于 3 牙槽嵴唇侧尖锐骨尖。此患者在全口义齿修复前需进行

- A. 唇颊沟加深
- B. 上颌结节修整
- C. 牙槽骨修整
- D. 唇系带修整
- E. 颊系带修整

A3/A4 型题

以下提供若干个案例, 每个案例下设若干道考题。请根据案例所提供的信息, 在每一道考题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(121~123 题共用题干)

患者男, 36 岁。2 周前发现右下后牙牙龈有小包, 平时无明显不适。检查见右下第一磨牙咬合面深龋, 穿髓孔探无感觉, 叩诊(±), 右下第二磨牙根尖处牙龈有瘘管开口, 挤压有少许脓液溢出。X 线片见右下第一磨牙近中根尖 X 线透射区不规则, 边界模糊。

121. 主诉牙应诊断为

- A. 慢性牙髓炎
- B. 慢性根尖周炎
- C. 根尖囊肿
- D. 根尖肉芽肿
- E. 慢性牙周炎

122. 为确诊牙龈瘘管的病牙, 应作

- A. 瘘管探诊
- B. X 线片检查
- C. 牙周袋探诊
- D. 瘘管诊断丝 X 线片

E. 牙周袋诊断丝 X 线片

123. 主诉牙的治疗是

- A. 充填治疗
- B. 塑化治疗
- C. 根管治疗
- D. 根尖手术
- E. 拔除

(124~125 题共用题干)

患者, 女, 7 岁, 食冷饮时左后牙感到酸痛半个月, 无自发痛史。检查发现 6 颊合面深龋, 龋蚀范围稍广, 腐质软而湿润, 容易挖除, 但敏感。测牙髓活力同正常牙, 叩诊(-)。

124. 根据上述临床表现和检查结果, 拟诊断为

- A. 慢性根尖周炎
- B. 急性牙髓炎
- C. 急性龋
- D. 慢性龋
- E. 慢性闭锁性牙髓炎

125. 首次就诊时, 对该患牙该做的处理为

- A. 双层垫底即刻充填
- B. 置放失活剂
- C. 氧化锌丁香油糊剂暂充
- D. 活髓切断
- E. 局麻下活髓摘除

(126~127 题共用题干)

一食堂, 就餐者就餐 1 小时后。陆续出现唇、指甲以及全身皮肤青紫等症状

126. 根据中毒症状, 中毒的原因最可能是

- A. 钡盐中毒
- B. 赤霉病毒中毒
- C. 磷化锌中毒
- D. 亚硝酸盐中毒
- E. 黄变米中毒

127. 你采取何种措施进行急救措施

- A. 洗胃、导泻
- B. 洗胃、导泻、灌肠
- C. 静脉注射维生素 C
- D. 静脉注射美蓝
- E. 洗胃、灌肠、导泻, 静脉注射维生素 C 和美蓝

B1 型题

以下提供若干组考题, 每组考题共用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(128~131 题共用选项)



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



A. 成牙本质细胞内和细胞间液体积聚形成水泡, 挤压邻近的成牙本质细胞, 使其体积缩小变形, 状似稻草束

B. 牙髓出现大小不等泡状间隙, 充满液体, 牙髓细胞减少, 成牙本质细胞、血管和神经消失, 呈现充满液体的纤维网状结构

C. 牙髓内细胞成分减少甚至消失, 纤维成分增多, 粗大的胶原纤维与牙髓长轴平行, 或显均质状玻璃样变

D. 由于某些刺激使牙髓细胞变性、坏死, 成为钙化中心, 周围层沉积钙盐而形成

E. 牙髓细胞核固缩、核碎裂、核溶解, 牙髓结构消失

128. 髓石

129. 牙髓网状萎缩

130. 牙髓纤维性变

131. 成牙本质细胞空泡性变

(132~133 题共用选项)

A. 食物粗糙, 咀嚼功能强, 颌骨发育大, 错合少

B. 食物粗糙, 咀嚼功能强, 颌骨发育大, 龋病多

C. 食物粗糙, 咀嚼功能弱, 颌骨发育小, 龋病少

D. 食物精细, 咀嚼功能弱, 颌骨发育小, 错合多

E. 食物精细, 咀嚼功能弱, 颌骨发育小, 错合少

132. 原始人

133. 现代人

(134~136 题共用选项)

A. 人中点

B. 唇峰

C. 唇红

D. 唇红缘

E. 唇珠

134. 上下唇皮肤与粘膜的移行区为

135. 上唇唇弓的正中点为

136. 上唇正中唇红向前下方突出的结节为

(137~139 题共用选项)

A. 氢键、盐键、疏水键和二硫键

B. S 形

C. 加热

D. 双曲线

E. α -螺旋

137. 肌红蛋白分子中主要的二维结构

138. 血红蛋白的氧解离曲线是

139. 蛋白质分子三级结构的稳定因素

(140~141 题共用选项)

A. 阿托品+毛果芸香碱

B. 阿托品+碘解磷定

C. 肾上腺素

D. 去甲肾上腺素

E. 色甘酸钠

140. 抢救中、重度有机磷酸酯类中毒的药物是

141. 受体阻断药可翻转哪种药物的升压作用

(142~143 题共用选项)

A. 成瘾性

B. 耐药性

C. 快速耐受性

D. 高敏性

E. 反跳现象

142. 吗啡易引起上述哪种反应

143. 长期应用氢化可的松突然停药可发生上述哪种反应

(144~145 题共用选项)

A. 罚款

B. 责令暂停 6 个月以上 1 年以下执业活动

C. 吊销其执业证书

D. 承担民事赔偿责任

E. 承担刑事责任

144. 非法行医, 情节严重构成犯罪的

145. 以不正当手段取得医师执业证书的

(146~147 题共用选项)

A. 选择性偏倚

B. 无应答偏倚

C. 测量偏倚

D. 回忆偏倚

E. 检查者偏倚

146. 调查时由于调查对象的代表性很差, 使结果出现误差的偏倚是

147. 受检者由于主观或客观原因未能接受检查的偏倚是

(148~150 题共用选项)

A. 可用于小儿感染所致呼吸衰竭

B. 不能抑制癫痫病灶异常放电, 可阻止其向正常脑

组织扩散

C 临床主要用于失神性发作, 为防治小发作的首选

药

D. 用于苯妥英钠不能耐受的癫痫大发作

E. 苯巴比妥对大多数惊厥动物模型有效, 缺乏选择

性

148. 苯妥英钠

149. 乙琥胺

150. 苯巴比妥

第二单元

A1 型题



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



每一道考试题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。
请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的
相应字母所属的方框涂黑。

1. 恒牙列中，牙齿患龋率最高的是
 - A. 上颌第一磨牙
 - B. 上颌第二磨牙
 - C. 前磨牙
 - D. 下颌第一磨牙
 - E. 下颌第二磨牙
2. 牙面获得性膜形成后，最初附着于牙面的细菌主
要是
 - A. 黏性放线菌
 - B. 变形链球菌
 - C. 唾液链球菌
 - D. 血链球菌
 - E. 轻链球菌
3. 布莱克分类窝洞考虑的充填材料是
 - A. 复合体
 - B. 银汞合金
 - C. 复合树脂
 - D. 磷酸锌粘固剂
 - E. 玻璃离子粘固剂
4. II 类洞型咬合面鸠尾形设计的根据是
 - A. 邻面龋的深浅
 - B. 邻面洞的位置
 - C. 邻面龋的牙体
 - D. 邻面龋的类型
 - E. 邻面洞的大小
5. 复合树脂充填洞形制备特点是
 - A. 底平壁直，洞形必须达到一定的深度
 - B. 点线角应圆滑，洞缘角应制备短斜面
 - C. 应制备典型的箱状洞，并设计良好的固位形
 - D. 洞缘角应呈直角，不宜在洞缘角制备短斜面，需
去净无基釉
 - E. 无需去净无基釉，但要有良好的抗力形
6. 具有激发痛深龋的治疗方法应选择
 - A. 双层垫底，一次完成充填治疗
 - B. 局麻后开髓失活，行牙髓治疗
 - C. 先做安抚疗法，待 1~2 周复诊时症状消除后，
再以双层垫底充填
 - D. 施行活髓切除术
 - E. 间接盖髓、双层垫底一次完成充填治疗
7. 临床常用的酸蚀剂是
 - A. 10%~30%枸橼酸
 - B. 10%~15%磷酸
 - C. 30%~50%磷酸
 - D. 30%~50%醋酸
 - E. 10%~15%醋酸
8. 临床检查牙本质过敏症的主要方法是
 - A. 冷刺激
 - B. 热刺激
 - C. 酸、甜刺激
 - D. 尖锐探针探查
 - E. 叩击
9. 牙髓活力热测验中刺激的温度是
 - A. 低于 45° C
 - B. 45~50° C
 - C. 50~55° C
 - D. 55~60° C
 - E. 高于 60° C
10. 残髓炎的诊断要点包括
 - A. 有牙髓治疗史
 - B. 长期牙周炎病史
 - C. 无明显自觉症状
 - D. X 线片显示髓腔内有局限性不规则的膨大区域
 - E. X 线片显示髓腔内有阻射的钙化物
11. 炎症牙髓中可以分离到的细菌不包括
 - A. 链球菌
 - B. 放线菌
 - C. 乳杆菌
 - D. G 一杆菌
 - E. 葡萄球菌
12. 根尖周炎的病因不包括
 - A. 感染
 - B. 电流刺激
 - C. 创伤
 - D. 化学刺激
 - E. 免疫因素
13. 根管扩大的标准是
 - A. 至少比初尖锉扩大 1 号
 - B. 至少比初尖挫扩大 2 号
 - C. 至少比初尖挫扩大 3 号
 - D. 按照医师个人习惯
 - E. 只要牙胶尖能进入根管即可
14. 增生性龈炎的直接病因是
 - A. 牙石
 - B. 龋洞
 - C. 不良卫生习惯
 - D. 牙菌斑
 - E. 不良修复体
15. 造成牙龈炎的最主要因素是
 - A. 遗传





R 全身性疾病

C. 病毒感染

D. 龈上菌斑

E. 龈下菌斑+龈下牙石

16. 关于妊娠期龈炎的治疗原则, 说法不正确的是

A. 去除局部刺激因素是关键

B. 需口服抗生素, 控制炎症

C. 对于过度增生的牙龈可以择期手术切除

D. 治疗完成后定期复查

E. 自我口腔卫生维护很重要

17. 下列哪一项与 ANUG 无关

A. 慢性龈炎

B. 吸烟

C. 心身因素

D. 全身消耗性疾病

E. 精神病

18. 下列关于急性龈乳头炎的说法, 错误的是

A. 局限于个别牙龈乳头的急性非特异性炎症

B. 不恰当地使用牙签剔牙, 过尖食物刺伤可引起

C. 牙菌斑是其直接病因

D. 牙龈乳头发红肿胀

E. 有明显探痛, 易出血

19. 牙周洁治时, 应以哪一手指为支点

A. 示指

B. 中指和小指联合支点

C. 中指和无名指联合支点

D. 无名指

E. 小指

20. 牙周病复查的时间一般为

A. 1~2 个月复查一次

B. 3~6 个月复查一次

C. 9 个月复查一次

D. 10 个月复查一次

E. 12 个月复查一次

21. 重度牙周炎患牙附着丧失达

A. $\geq 6\text{mm}$

B. $\leq 5\text{mm}$

C. $\leq 6\text{mm}$

D. $< 5\text{mm}$

E. $\geq 5\text{mm}$

22. 口腔科医师应对下列哪一全身免疫缺陷性疾病提高必要的警惕, 对可疑的病例进行恰当和必要的化验检查以及转诊

A. Down 综合征 (先天愚型)

B. 掌跖角化-牙周破坏综合征

C. 白细胞功能异常

D. 艾滋病

E. 急性肾炎

23. 牙周袋加深时, 牙髓受影响的机会大大增加, 是因为

A. 细菌的毒力增加

B. 牙松动度增加

C. 暴露的侧支根管数量增加

D. 根面龋引起

E. 暴露的牙本质小管数量增加

24. 在菌斑成熟过程中, 首先吸附到牙面的是

A. 唾液链球菌

B. 变形链球菌

C. 革兰氏阳性球菌

D. 革兰氏阴性杆菌

E. 革兰氏阴性厌氧菌

25. 融合牙临床表现不正确的是

A. 冠根完全融合

B. 冠部融合, 根部分离

C. 冠部分离, 根部融合

D. 乳牙列融合多发生在双侧

E. 乳牙列融合牙比恒牙列多

26. 乳牙龋病对儿童口腔局部影响不正确的是

A. 咀嚼功能明显降低

B. 继承恒牙的窝沟龋.

C. 特纳牙的发生

D. 损伤局部口腔黏膜组织

E. 继承恒牙萌出过早或过迟

27. 活髓切断术不适用于

A. 前牙深龋

B. 后牙深龋

C. 部分冠髓牙髓炎

D. 牙髓坏死

E. 前牙外伤性冠折露髓

28. 口腔单纯疱疹病毒感染常用的辅助诊断方法不包括

A. 基因诊断

B. 涂片查找包涵体

C. 电镜检查受损细胞

D. 免疫学检查

E. 组织活检

29. 以下不属于复发性口疮类型的是

A. 疱疹样阿弗他溃疡

B. 重型阿弗他溃疡

C. 复发性坏死性黏膜腺周围炎

D. 轻型阿弗他溃疡



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



E. Bednar 溃疡

30. 口腔白斑病的病理改变不包括

- A. 过度角化或过度不全角化
- B. 颗粒层明显, 棘细胞层松解
- C. 上皮钉突增大
- D. 结缔组织中有炎细胞浸润
- E. 可伴有上皮异常增生

31. 慢性非特异性唇炎与以下因素无关

- A. 气候干燥
- B. 过敏反应
- C. 烟酒刺激
- D. 嗜好烫食
- E. 舔唇不良习惯

32. 用肥皂液刷洗手和臂时, 浸泡范围应在肘部以

上

- A. 5cm
- B. 6cm
- C. 7cm
- D. 8cm
- E. 10cm

33. 对于腮腺区肿物不宜进行的检查是

- A. 细针吸取细胞学检查
- B. CT 或 MRI
- C. 涎腺造影
- D. 切取活检术
- E. B 超

34. 血压高于多少时应先治疗后拔牙

- A. 120/80mmHg
- B. 130/85mmHg
- C. 140/85mmHg
- D. 160/90mmHg
- E. 180/100mmHg

34. 下列不属于拔牙禁忌证的是

- A. 频发心绞痛
- B. 充血性心力衰竭
- C. 双束支传导阻滞
- D. 未控制的心律失常
- E. 8 个月前发生过心肌梗死

36. 普鲁卡因安全剂量每小时不宜超过

- A. 1g
- B. 1.5g
- C. 2g
- D. 2.5g
- E. 3g

37. 关于下颌切牙拔除描述正确的是

- A. 下颌切牙与上颌切牙牙根外形类似, 可使用旋转

力

- B. 下颌切牙牙根较细易折断, 不可使用旋转力

- C. 下颌切牙牙根较细易折断, 可稍加旋转力

D. 下颌切牙牙根较细但不易折断, 故摇动力和旋转力可同时使用

E. 下颌切牙牙根较细易折断, 故摇动力和旋转力都不能使用

38. 用于智齿冠周炎冲洗的过氧化氢溶液浓度是

- A. 1%~3%
- B. 0.1%~0.3%
- C. 0.3%~0.5%
- D. 0.25%~0.5%
- E. 5%~10%

39. 环甲膜切开后插管时间最长为

- A. 8 小时
- B. 10 小时
- C. 12 小时
- D. 24 小时
- E. 48 小时

40. 颌面部损伤患者, 处理不及时会立即造成生命危险的主要原因是

- A. 出血
- B. 感染
- C. 休克
- D. 窒息
- E. 弥散性血管内凝血

41. 额颞部软组织出血的止血方法是

- A. 压迫面动脉
- B. 压迫颞浅动脉
- C. 压迫上颌动脉
- D. 压迫耳后动脉
- E. 压迫颞深动脉

42. 口腔颌面部感染的主要途径是

- A. 牙源性感染
- B. 腺源性感染
- C. 损伤性感染
- D. 血源性感染
- E. 医源性感染

43. 下列咬肌间隙感染的临床表现不包括

- A. 常因下颌智牙冠周炎引起
- B. 常伴明显开口受限
- C. 脓肿形成后有明显的压痛点
- D. 脓肿形成后, 常在咬肌前缘触及波动感
- E. 可向相邻间隙扩散

44. 下列颧骨骨折中, 复位后不需固定的是

- A. 颧骨体骨折向后下内移位, 不伴有转位



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



- B. 内转位颧骨体骨折
C. 颧弓骨折
D. 复杂性骨折
E. 颧、上颌骨骨折
45. 临床创口分类中包括
A. 无菌创口、污染创口、感染创口
B. 污染创口、感染创口、化脓创口
C. 感染创口、无菌创口、化脓创口
D. 化脓创口、无菌创口、污染创口
E. 无菌创口、可疑创口、污染创口
46. 关于舌癌描述错误的是
A. 多数为鳞癌
B. 是最常见的口腔癌
C. 舌后 1/3 癌肿属口咽癌范畴
D. 生长快，浸润比较强
E. 主要以血道转移为主
47. 恶性黑色素瘤多来源于
A. 皮内痣
B. 交界痣
C. 复合痣
D. 毛痣
E. 雀斑
48. 对放射线不敏感的肿瘤是
A. 未分化癌
B. 恶性淋巴瘤
C. 鳞状细胞瘤
D. 恶性淋巴上皮瘤
E. 骨肉瘤
49. 正颌手术引起牙及骨坏死的原因不包括
A. 软组织张力过大或覆盖不全引起的小区域骨质暴露
B. 切开牙槽骨时损伤两侧牙周或牙根，引起单纯牙髓坏死
C. 牙-骨复合体软组织蒂部撕伤或断裂，造成严重供血障碍
D. 创部感染
E. 患者是乙肝病毒携带者
50. 在面部轴型皮瓣的长宽比例可为
A. 2:1
B. 3:1
C. 4:1
D. 5:1
E. 在血管长轴内不受长宽比例的限制
51. 下牙槽神经阻滞麻醉时出现面瘫的一般处理方法是
A. 注射维生素 B₁、维生素 B₁₂
B. 局部热敷
C. 局部理疗
D. 口服镇静剂
E. 不作特殊处理
52. 三叉神经第三支属于
A. 运动神经
B. 交感神经
C. 感觉神经
D. 混合神经
E. 分泌神经
53. 投照上颌后牙的注意事项是
A. 听眶线与地面平行
B. 听口线与地面平行
C. 听鼻线与地面平行
D. 咬合平面与地面平行
E. 前牙的唇侧面与地面垂直
54. X 线片表现为根尖周界限清楚的大致圆形透射区，周围无致密线条环绕的是
A. 急性根尖周炎
B. 慢性根尖周脓肿
C. 根尖周肉芽肿
D. 根尖周囊肿
E. 牙瘤
55. 下列哪一项不属于下颌骨骨折的好发部位
A. 正中联合部
B. 颏孔区
C. 下颌角区
D. 髁突颈部
E. 喙突
56. X 线表现为唾液腺导管扩张不整，如同“腊肠”状影像的病变是
A. 慢性复发性唾液腺炎
B. 慢性阻塞性唾液腺炎
C. 舍格伦综合征
D. 唾液腺良性肿瘤
E. 唾液腺恶性肿瘤
57. 颞下颌关节紊乱病不包括
A. 咀嚼肌紊乱病
B. 关节结构紊乱病
C. 炎性疾病
D. 关节强直
E. 骨关节病
58. 颞下颌关节紊乱病关节间隙改变最常见的 X 线表现是
A. 前间隙变窄，后间隙增宽，髁突位置前移
B. 前间隙增宽，后间隙变窄，髁突位置后移





- C. 整个关节间隙变窄,髁突位置上移
D. 整个关节间隙增宽,髁突位置下移
E. 以上均为常见表现

59. 唾液腺肿瘤中几乎仅发生于腮腺的是

- A. 腺泡细胞癌
B. 沃辛瘤
C. 腺样囊性癌
D. 多形性腺瘤
E. 黏液表皮样癌

60. 黏液囊肿好发于

- A. 腭部
B. 颊部
C. 下唇及舌尖腹侧
D. 上唇及舌尖腹侧
E. 下唇及舌根腹侧

61. 腮腺“临界瘤”中最常见的是

- A. 圆柱瘤
B. 多形性腺瘤
C. 腺淋巴瘤
D. 腺瘤
E. 神经纤维瘤

62. 投照下颌下腺导管结石的 X 线片检查首选

- A. 下颌下腺造影
B. 下颌体腔片
C. 下颌曲面体层片
D. 下颌下腺侧位片加下颌横断(牙合)片
E. 下颌骨侧位片加下颌横断(牙合)片

63. 牙槽突裂植骨术后拆线时间是

- A. 5 天
B. 7 天

C. 8 天

D. 9 天

E. 10~14 天

64. 进行单侧唇裂整复术最适合的年龄为

- A. 出生后即刻
B. 1~2 个月
C. 3~6 个月
D. 6~12 个月
E. 1~2 岁

65. 预防医学是研究环境因素与

- A. 人体内环境的关系
B. 人体外环境的关系
C. 人体健康的关系
D. 人体状况的关系
E. 人体功能的关系

66. 环境对人类健康影响的危险度评价包括

A. 危害鉴定、暴露评定、剂量-反应关系评定、危险度特征分析

B. 危害鉴定、暴露评定、暴露因素评定、危险度特征分析

C. 最高容许浓度评定、暴露评定、剂量-反应关系评定、危险度特征分析

D. 危害鉴定、间接效应评定、剂量-反应关系评定、危险度特征分析

E. 危害鉴定、暴露评定、相关性评定、危险度特征分析

67. 膳食纤维的营养作用不包括

- A. 供给机体热能
B. 降低血胆固醇
C. 刺激肠蠕动
D. 预防大肠病、直肠癌
E. 增加粪便体积

68. 小白菜在烹调过程中最易损失的营养素为

- A. 维生素 A
B. 维生素 E
C. 维生素 D
D. 维生素 B₁
E. 维生素 C

69. 计算样本率的抽样误差适用公式为

A. $\sqrt{\frac{P(1-P)}{n}}$

B. $\sqrt{\frac{P(1-P)}{n-1}}$

C. $\sqrt{\frac{\pi(1-\pi)}{n}}$

D. $\sqrt{\frac{\pi(1-\pi)}{n-1}}$

E. $\sqrt{\frac{P(1-P)}{N}}$

70. 发生以下重大医疗过失行为时,医疗机构应向所在地卫生行政部门报告

- A. 可能是二级医疗事故的
B. 可能是三级医疗事故的
C. 患者因病死亡的
D. 导致 1 人人身损害后果的
E. 导致 2 人人身损害后果的

71. 根据母婴保健法,婚前医学检查的主要内容是



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



指

- A. 进行性卫生知识、生育知识的教育
- B. 进行遗传病知识的教育
- C. 对有关婚配问题提供医学意见
- D. 对有关生育保健问题提供医学意见
- E. 对严重遗传疾病、指定传染病等的检查

72. 医疗机构发现甲类传染病时应当采取下列措施,除了

- A. 对患者予以隔离治疗
- B. 对疑似患者,确诊前在指定场所隔离治疗
- C. 拒绝隔离治疗的由公安机关协助采取强制隔离治疗措施
- D. 对病原携带者予以隔离治疗
- E. 对医疗机构内疑似患者的密切接触者,在指定场所进行医学观察。

73. 新生儿溶血病如需要换血疗法的

- A. 由患儿家属申请并签字同意
- B. 由经治医师申请并经患儿家属签字同意
- C. 由主治医师申请并经患人同意
- D. 由经治医师申请并经主治医师批准
- E. 由主治医师申请并经患儿家属签字同意

A2型题

每一道考试题都是以一个小案例出现的,其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

74. 何某因意外事故受伤被同事送到医院抢救,何某被送到医院时已昏迷,此时何某急需输血治疗,但其家人还未赶到医院,对何某输血时采取的以下措施符合临床输血技术规范的是

- A. 报何某所在单位同意、备案,并记入病历
- B. 在何某家人赶到同意后再输血
- C. 报医院主管领导同意、备案,并记入病历
- D. 报经治医师所在科室主任同意、备案,并记入病历
- E. 由何某同事同意并签字、备案,并记入病历

75. 患者,男,30岁,主诉:右面部放射性疼痛2天。对于鉴别是否为牙源性疼痛最有价值的检查手段是

- A. 照曲面体层片
- B. 叩诊和牙髓电活力检查
- C. 选择性麻醉
- D. 问诊和探诊
- E. 牙齿松动度检查

76. 患者,14岁,右下后牙夜间痛1天。查见右下第一前磨牙咬合面畸形中央尖折断痕迹,冷测引起剧痛,叩(一)。诊断为

- A. 急性龋

B. 可复性牙髓炎

C. 急性牙髓炎

D. 慢性牙髓炎

E. 急性根尖周炎

77. 患者因龋坏充填治疗后1年,牙齿折裂,要求

治疗。查⁶⁴银汞充填体,近远中牙冠纵向劈裂达根部,下面哪项不是造成牙冠劈裂的原因

- A. 洞壁有悬釉
- B. 剩余牙体组织过少
- C. 咬合创伤
- D. 充填体过大
- E. 充填材料选择不当

78. 患者半年来因右侧后牙咬合痛、冷热痛要求治

疗。查:⁶¹无龋,近中可疑隐裂,冷热测引起疼痛,刺激去除后,持续数秒,叩诊(±)。右侧后牙不同程度磨损,探敏。该患者主诉牙治疗原则为

- A. 不治疗
- B. 调(牙合)
- C. 脱敏
- D. 牙髓治疗后全冠修复
- E. 备洞充填

79. 患者,男,35岁,因左下后牙食物嵌塞2年多就诊。查左下第二前磨牙龋深达髓腔,牙髓无活力,叩诊略异样感,X线片见根尖周透射区3mm×5mm,边界较清楚。该主诉牙应明确诊断为

- A. 慢性根尖周炎
- B. 慢性根尖周脓肿
- C. 根尖周囊肿
- D. 慢性牙髓炎
- E. 有瘘型根尖周脓肿

80. 患者,男,67岁,左下第一磨牙因重度磨耗露髓,拟行根管治疗,常规根管治疗的步骤为

- A. 根管清创、预备和充填
- B. 根管封药和充填
- C. 根管清创和充填
- D. 根管预备、消毒和充填
- E. 根管清创、封药和充填

81. 患者,女,22岁,主诉:近3年来,咀嚼硬物或刷牙时牙龈出血。若诊断为慢性龈炎,牙龈炎症不会有

- A. 牙龈炎症一般局限于游离龈和龈乳头
- B. 牙龈炎症以上前牙区最为显著
- C. 炎症以前牙区为主,也可波及全口牙



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



D. 牙龈松软光亮

E. 严重时波及附着龈

82. 患者，男，22岁，左下后牙突然自发性疼痛1天，否认咬硬物史。临床检查：局部

牙龈乳头充血水肿，牙间有食物嵌塞，探痛明显。

其最可能的诊断是

A. 妊娠期龈炎

B. 急性牙龈乳头炎

C. 牙根折裂

D. 急性坏死性溃疡性龈炎

E. 逆行性牙髓炎

83. 患者，男，54岁，刷牙出血2年，冷热刺激酸痛，无自发痛，下前牙咬合无力半年。检查：CI-S₃，牙龈充血肿胀，牙龈退缩3mm，上、下磨牙牙周袋深5~6mm，下前牙松动Ⅰ度。初步诊断应为

A. 龈炎

B. 慢性牙周炎

C. 侵袭性牙周炎

D. 牙髓炎

E. 青少年后期牙周炎

84. 患者，男，47岁，数月以来右上后牙进食时疼痛，刷牙后缓解。检查：口腔卫生差，CI-S₃，牙龈轻度充

血水肿，81颊向错位、伸长无对颌牙，87间有较多食物嵌塞，龈乳头中度充血水肿，压痛，未探及牙周袋。

导致该症状出现的局部促进因素是

A. 牙石

B. 食物嵌塞

C. 咬合创伤

D. 错颌畸形

E. 牙菌斑

85. 患者，男，7岁，喜食巧克力，右下颌第一恒磨牙刚萌出，已见窝沟浅龋。医生向家长宣传饮食管理的概念，不正确的是

A. 提示家长不过多地让儿童摄取蔗糖

B. 饮料是流动性的液体，不易引起龋齿

C. 控制点心和零食的次数与量

D. 不宜偏食

E. 不宜单侧咀嚼

86. 患儿，1岁，近来哭闹拒食，嘴角流涎，伴有发热，舌腹、硬腭及牙龈均可见簇集的针头大小透明水疱，拟诊断为

A. 白色念珠菌病

B. 急性坏死性龈口炎

C. 原发性疱疹性口炎

D. 复发性疱疹性口炎

E. 球菌性口炎

87. 患者，女，48岁，牙龈充血糜烂，呈剥脱状损害，刷牙出血，舌背可见左右对称性分布椭圆形珠光白色斑块，表面舌乳头萎缩，触之柔软，双侧颊黏膜也有类似斑纹改变，最可能的诊断是

A. 坏死性龈口炎

B. 白色角化病

C. 白斑病

D. 口腔扁平苔藓

E. 盘状红斑狼疮

88. 患者，男，55岁，吸烟25年，每日至少1包，近来舌背左侧发现一处白色斑块，大小约1.5cm×2.0cm，界限清楚，无明显自觉症状，口腔内其余黏膜未见类似病损，首先应该做的是

A. 根治手术

B. 维A酸乳膏局部涂擦

C. 口服肾上腺皮质激素

D. 口服绞股蓝

E. 戒烟

89. 患者，男，30岁，因上颌第三恒磨牙拔除，上牙槽后神经阻滞麻醉后，出现患侧面部肿胀，可能的原因是

A. 感染

B. 炎症

C. 麻药过敏

D. 翼静脉丛损伤

E. 注射过量

90. 患者右上后牙拔牙后3天，麻药注射区局部红肿，触痛明显，皮肤发热，有轻度张口受限，引起疼痛的原因是

A. 注射针头弯曲损伤组织

B. 损伤血管引起血肿

C. 消毒不严格引起深部组织感染

D. 损伤神经

E. 麻药注入翼内肌内

91. 患儿，女，7岁，根尖脓肿伴左下颌下淋巴结肿大，根尖周脓肿切开引流后好转，但下颌下区肿痛加重，局部皮肤发红并出现波动感，此下颌下区感染来源最大可能为

A. 牙源性

B. 腺源性

C. 血源性

D. 创伤性

E. 医源性

92. 患者，男，40岁，口底多间隙感染，肿胀明显，可及捻发音及波动感，主诉呼吸困难，下列处理正确的



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



是

- A. 加大抗生素剂量
- B. 局部热敷
- C. 穿刺抽脓
- D. 广泛切开引流
- E. 局限性切开引流后加压包扎

93. 患者, 男, 32 岁, 颌面部跌伤 4 小时。口腔检查: 下颌偏向左侧, 不能向左侧做侧方运动。前牙及左侧后牙开𪙇, 上、下牙列未见明显骨折段移位。初步诊断为

- A. 双侧髁突骨折
- B. 颞部正中骨折
- C. 颞孔区骨折
- D. 下颌角部骨折
- E. 单侧髁突骨折

94. 患者, 男, 30 岁, 颌面部受击打伤 3 小时。口腔检查: 下颌颞部软组织红肿, 口腔内外未见创口, 咬合关系无异常。下颌正位片示下颌颞部正中有骨折线影像。正确的固定方法是

- A. 手术切开骨间固定
- B. 牙弓夹板固定
- C. 骨钉加金属支架固定
- D. 克氏针内固定
- E. 皮质骨螺钉固定

95. 某患者一侧下颌骨磨牙区、下颌角及升支部渐进性膨大, X 线片示透明囊性阴影, 呈多房性, 房室大小极不一致, 阴影边缘呈切迹状。最可能的诊断是

- A. 牙源性角化囊肿
- B. 成釉细胞瘤
- C. 牙源性黏液瘤
- D. 牙源性钙化囊肿
- E. 牙源性纤维瘤

96. 患者, 男, 9 岁, 舌体外伤出现部分组织缺损, 下列处理原则正确的是

- A. 细针细线缝合
- B. 缝合不宜过深过宽
- C. 保持舌体长度
- D. 保持舌体宽度
- E. 保持舌体厚度

97. 一患者以颞下颌关节开口末、闭口初单音弹响就诊。X 线片显示髁突开口位时超过关节结节, 你认为该患者所患疾病是

- A. 翼外肌痉挛
- B. 翼外肌功能亢进
- C. 颞肌痉挛
- D. 咬肌痉挛

E. 关节盘移位

98. 口腔健康调查前的准备阶段, 技术组专家告诫调查人员, 出现信息偏性的重要原因是

- A. 漏查了一些受检者
- B. 检查对象代表性差
- C. 检查器械不统一
- D. 标准掌握不一致
- E. 受检者回忆有偏差

99. 患儿, 男, 2 岁, 由父母陪同去口腔科就诊, 母亲要求医生为小孩作乳牙窝沟封闭, 医生认为该小孩目前不需作窝沟封闭, 其主要原因是

- A. 乳牙不需作窝沟封闭
- B. 现阶段儿童不易患龋
- C. 封闭剂的氟释放, 儿童易误吞造成氟中毒
- D. 乳牙窝沟封闭年龄一般应为 3~4 岁
- E. 乳牙有机质多, 封闭剂易脱落

100. 患者, 女, 担心使用牙签会使牙缝增宽, 医生告诉她正确使用牙签的方法是

- A. 轻轻置入龈沟底部, 向龈方运动清洁
- B. 轻轻置入龈沟底部, 向冠方运动清洁
- C. 置入牙间隙, 轻轻上下运动清洁
- D. 置入牙间隙, 轻轻左右运动清洁
- E. 视需要向各个方向运动清洁

101. 某同学准备去幼儿园对儿童进行口腔健康教育, 在准备口腔健康教育材料时教授提醒他应特别注意以下内容, 除了

- A. 准确性
- B. 知识性
- C. 创新性
- D. 趣味性
- E. 艺术性

102. 预防口腔医学教学中, 教师强调临床交叉感染的重点是

- A. 手部的消毒
- B. 空气的消毒
- C. 地表的消毒
- D. 机头的消毒
- E. 废物的处理

103. 关于在小学为期两年的含氟牙膏防龋临床实验中用何种龋病指数, 课题组认为最佳指数是

- A. dmft
- B. dmfs
- C. DMFT
- D. DMFS
- E. Dft

B1 型题



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



以下提供若干组考题, 每组考题共用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(104~106 题共用备选答案)

- A. 意外露髓
- B. 充填体脱落
- C. 继发龋
- D. 乳牙内吸收
- E. 充填体过高

104. 充填后咀嚼时疼痛

105. 直接盖髓术的适应证是

106. 制备洞形时, 感染的软化牙本质未去净, 预防性扩展不够, 易导致

(107~109 题共用备选答案)

- A. 侵袭性牙周炎
- B. 艾滋病
- C. 慢性牙周炎
- D. 牙周-牙髓联合病变
- E. 牙龈炎

107. 属于病毒感染性疾病的是

108. 逆行性牙髓炎属于

109. 与异常的宿主反应有关的牙周炎是

(110~111 题共用备选答案)

- A. 牙齿震荡
- B. 牙冠折断
- C. 牙体损伤
- D. 牙周损伤
- E. 牙齿移位

110. 牙齿受外力完全脱出牙槽骨

111. 牙齿外伤后, 没有牙齿硬组织缺损和牙齿移位, 主要影响牙周和牙髓组织

(112~115 题共用备选答案)

A. 唇肿胀、糜烂、干燥、脱屑、结痂, 疣状或颗粒状增生, 可出现白色条纹

B. 有日光照射史, 唇红部以糜烂为主要特征

C. 唇肿胀, 触之有散在、粟粒状小结节, 有透明黏液溢出唇表面, 呈水珠状

D. 唇弥漫性肿胀, 柔软而有弹性

E. 唇突然肿胀, 触之韧而有弹性, 肿胀消退较快

112. 血管神经性水肿的临床表现是

113. 光化性唇炎的临床表现是

114. 腺性唇炎的临床表现是

115. 肉芽肿性唇炎的临床表现是

(116~117 题共用备选答案)

A. 眼睑闭合不全

B. 额部皱纹消失

C. 鼻唇沟变浅

D. 伸舌偏向患侧

E. 下唇歪斜

116. 面神经颊支损伤表现为

117. 面神经颞支损伤表现为

(118~119 题共用备选答案)

A. 暂时制动

B. 牙间结扎

C. 颌间结扎

D. 切开复位内固定术

E. 暂不处理, 随访

118. 移位明显的骨折, 不能手法复位的, 需要

119. 没有移位的骨折, 需要

(120~122 题共用备选答案)

A. 3~6 个月

B. 12~15 个月

C. 4~6 岁

D. 9~11 岁

E. 16 岁以后

120. 单侧唇裂修复术的时间是

121. 腭裂修复术的时间是

122. 语音评价及语音训练治疗时间是

(123~125 题共用备选答案)

A. 正比关系

B. 反比关系

C. 无关系

D. 无线性关系

E. 有正比, 也有反比关系

123. 氟化物的吸收率与胃内 pH 的关系

124. 骨氟含量实际沉淀率与年龄的关系

125. 肾的氟清除率与尿 pH 的关系

(126~128 题共用备选答案)

A. 釉质表面发生白垩色改变, 部分釉质缺损

B. 釉质有缺损, 其他部位釉质正常

C. 釉质表面有可被去除的色素附着

D. 釉质表面有光泽, 牙冠色暗黄

E. 釉质表面有白垩色斑, 边界清楚

126. 釉质发育不全的临床特征是

127. 氟牙症的临床特征是

128. 四环素牙的临床特征是

(129~131 题共用备选答案)

A. 由卫生行政部门给予处分, 没收违法所得

B. 由工商行政管理部门处 1 万元以上 20 万元以下的罚款



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



C. 由卫生行政部门吊销其执业证书

D. 依法追究刑事责任

E. 依法承担赔偿责任

129. 医疗机构违反法律规定, 给药品使用者造成损害的

130. 医疗机构负责人收受药品生产企业给予的财物的

131. 医疗机构在药品购销中暗中, 给予、收受回扣或者其他利益的

A3/A4 型题

以下提供若干个案例, 每个案例下设若干道考题。请根据案例所提供的信息, 在每一道考题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(132~134 题共用题干)

患者, 女, 7 岁, 右上颌中切牙外伤冠折、切角缺损, 即刻来院就诊。口腔检查发现: 穿髓孔大, 探痛明显, 可疑叩痛。

132. 治疗首选

A. 直接盖髓术

B. 活髓切断术

C. 拔髓术

D. 根管治疗术

E. 塑化疗法

133. 进行这种治疗成功的关键是

A. 保证患者无痛

B. 保持操作无菌

C. 止血彻底

D. 盖髓剂的选择

E. 拔髓彻底

134. 若治疗成功, 家长要求修复缺损的牙冠应

A. 局麻备牙, 全冠修复

B. 桩冠修复

C. 复合树脂修复

D. 切角嵌体

E. 解释病情, 待患儿成年后再作修复

(135~137 题共用题干)

患者, 男, 45 岁, 患慢性牙周炎多年, 昨日起右下后牙自发性阵发性疼痛, 夜间加重, 手持冷水瓶就诊。检查: 右下第一磨牙 II 度松动, 叩痛(+), 颊侧牙周袋 6mm。

135. 为了进一步确诊, 还需要进行的检查是

A. 麻醉测验

B. 冷测验

C. 热测验

D. 染色法测验

E. 咬诊法测验

136. 右下第一磨牙的诊断应该为

A. 慢性根尖周脓肿

B. 慢性根尖周囊肿

C. 慢性根尖周肉芽肿

D. 逆行性牙髓炎

E. 急性牙髓炎

137. 主诉进行温度测验的结果为

A. 无反应

B. 短暂的轻度或中度不适

C. 出现疼痛, 但刺激去除后即刻消失

D. 出现疼痛, 刺激去除后持续一段时间

E. 出现剧烈疼痛

(138~140 题共用题干)

患者, 男, 21 岁, 诉牙松动 1 年余。口腔检查见 CI-S:2, 上前牙呈扇形排列, 4 颗第一恒磨牙牙周袋深约 6mm, 松动 II 度。

138. 拟初步诊断为

A. 青少年后期牙周炎

B. 慢性牙周炎

C. 侵袭性牙周炎

D. 快速进展型牙周炎

E. 成人牙周炎

139. 该病的主要致病菌为

A. 牙龈卟啉单胞菌

B. 中间普氏菌

C. 伴放线放线杆菌(伴放线聚集杆菌)

D. 福赛类杆菌

E. 核梭形杆菌

140. 如该患者患有糖尿病, 治疗牙周炎时, 就诊时间应尽量安排在

A. 下午 2~3 点

B. 早餐前

C. 午餐前

D. 早餐及服药后 1.5 小时

E. 午餐及服药后 1.5 小时

(141~144 题共用题干)

患者, 男, 36 岁, 外伤术后, 目前正在接受抗生素治疗, 发现近几天味觉减退, 口腔黏膜干燥并有灼痛, 舌背黏膜充血发红, 舌乳头萎缩明显。

141. 结合病史, 最可能的诊断是

A. 萎缩性舌炎

B. 口干综合征

C. 烟酸缺乏症

D. 白念珠菌(白假丝酵母菌)感染

E. 扁平苔藓

142. 为了明确诊断, 首先应该进行



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



- A. 组织病理检查
- B. 血常规检查
- C. 腮腺造影检查
- D. 免疫功能检测
- E. 直接涂片检查

143. 初步获得检查结果后, 还可以考虑以下哪种进一步检查方法

- A. 肝功能检查
- B. 出凝血时间测定
- C. 泪液分泌功能测定
- D. 唾液培养
- E. 直接免疫荧光检查

144. 本病可以采用以下哪种药物治疗

- A. 1.0%~1.5%过氧化氢溶液局部治疗
- B. 2.0%~4.0%碳酸氢钠溶液局部治疗
- C. 补充维生素
- D. 补充烟酸
- E. 口服磷酸氯喹片

(145~146 题共用题干)

患者, 男, 47 岁, 右下颌后牙反复肿痛 3 个月。口腔检查: 右下第三磨牙萌出不全, 远中有盲袋, 冠周无明显炎症。X 线片示: 右下第三磨牙横向生长, 牙冠朝向右下第二磨牙远中根, 牙根距离下颌管 2mm, 无明显龋坏。

145. 拟拔除右下第三磨牙, 所需麻醉的神经是

- A. 下牙槽神经+舌神经
- B. 下牙槽神经+颊神经
- C. 下牙槽神经+颊神经+舌神经
- D. 下牙槽神经+舌神经+额神经
- E. 下牙槽神经+舌神经+颊神经+咬肌神经

146. 右下第三磨牙经切开去骨后艰难拔除, 拔除 1 周复诊, 出现右下唇麻木, 创口无感染, 为明确诊断需

- A. X 线片检查
- B. 麻醉下搔刮牙槽窝
- C. 麻醉下探查牙槽窝
- D. 口服抗生素
- E. 服用神经营养药

(147~148 题共用题干)

一患者左颞下颌关节在开口、咀嚼时疼痛, 无自发痛, 检查发现开口中度受限、开口型偏向左侧, 左髁突后方明显压痛, 未见红肿。

147. 其诊断应该是

- A. 左翼外肌痉挛
- B. 左关节盘后区损伤
- C. 左关节囊附丽松弛
- D. 左髁突破坏

E. 左关节盘穿孔

148. 其治疗应选用

- A. 0.5%或 1%普鲁卡因封闭
- B. 2%普鲁卡因 2~3ml 封闭
- C. 泼尼松龙 0.5~0.8ml 局部封闭
- D. 复位(牙合)垫治疗
- E. 髁突高位切除加关节盘摘除

(149~150 题共用题干)

患者, 男, 18 岁, 先天性完全性腭裂, 4 岁时行腭裂修复术, 现腭前部牙槽突仍有裂隙与鼻腔相通, 下前牙反(牙合), 上颌牙拥挤, 面中部凹陷, 面下部前突。

149. 腭裂修复术后, 语音功能恢复正常的必要条件

- A. 软腭有长度
- B. 患儿牙列完整, 排列整齐
- C. 悬雍垂外形良好
- D. 发音时能形成良好的腭咽闭合
- E. 患儿咽后壁上派氏嵴明显

150. 腭裂修复术后, 因咽腔过宽需行缩小咽腔手术, 下列属于缩小咽腔的手术术式的是

- A. 三瓣法
- B. 四瓣法
- C. 兰氏法
- D. 改良兰氏法
- E. 腭咽肌瓣成形术

