

2022年执业/助理医师资格考试

# 笔试高频精选冲刺题

临床执业医师精选600题

套卷四【451-600题】

金英杰医学教育

451.(A1型题)以下治疗蛛网膜下腔出血的措施不妥的是

- A.卧床休息4~6周
- B.应用止血药物
- C.低分子量肝素注射
- D.静滴20%甘露醇
- E.口服尼莫地平

答案:C

解析:蛛网膜下腔出血起病急骤,一旦确诊,必须绝对卧床4~6周;立即给予止血药,减少出血;如出血较多引起颅内压增高,宜应用甘露醇等脱水药;蛛网膜下腔出血易引起脑血管痉挛,因而需用尼莫地平扩血管。故排除A、B、D、E。低分子量肝素是抗凝血药和溶血栓药,可应用于脑梗死,坚决杜绝用于出血患者,故本题选C。

452.(A1型题)颅内压增高病人昏迷,治疗呼吸道梗阻最有效措施是

- A.通过鼻腔口腔导管吸痰
- B.气管插管,呼吸机辅助呼吸
- C.环甲膜穿刺
- D.气管切开
- E.用开口器侧卧位引流

答案:D

解析:此题暂无解析

453.(A1型题)颅内压增高的三主征是

- A.血压升高、脉搏细弱、呼吸微弱
- B.头痛、呕吐、视乳头水肿
- C.意识不清、呕吐、行走不稳
- D.头昏、头痛、呕吐
- E.血压下降、脉搏缓慢、呼吸微弱

答案:B

解析:头痛、呕吐和视乳头水肿是颅内压增高的典型表现,称之为颅内压增高"三主征"。

454.(A1型题)急性颅内压增高,有脑疝征象时应立即使用下列哪种药物最佳

- A.25%山梨醇
- B.20%甘露醇
- C.50%葡萄糖
- D.50%甘油
- E.激素

答案:B

解析:20%甘露醇为急性颅内压增高中脱水降颅压的首选药物,甘露醇为渗透性利尿剂,起效迅速,一般在30分钟内起效,但作用时间较短。其他药物作用较慢,适用于颅内压增高程度较轻的病例。

455.(A1型题)脑疝确诊后最先采取的治疗措施应是

- A.立即钻孔探查
- B.立即静脉输给降颅压药物
- C.立即行
- D.立即行MRI检查
- E.立即行脑室穿刺引流脑脊液

答案:B

解析:此题暂无解析

456.(A1/A2型题)震颤麻痹源于什么部位变性

- A.纹状体
- B.黑质细胞
- C.红核
- D.小脑
- E.脑干

答案:B

解析:此题暂无解析

457.(A1/A2型题)帕金森病主要的病理改变在

- A.小脑及脑干
- B.黑质纹状体
- C.大脑皮质
- D.周围神经
- E.外周肌肉

答案:B

解析:此题暂无解析

458.(A1/A2型题)年轻女性患者,反复发作性头痛3年。每次发作前都有2小时左右的烦躁、饥饿感,随之一眼出现异彩,持续约30分钟,缓解后出现头痛,呈钻痛、搏动性,常伴恶心、呕吐,持续4~5小时后进入睡眠可缓解。应诊断为

- A.紧张性头痛
- B.丛集性头痛
- C.无先兆的偏头痛
- D.特殊类型偏头痛
- E.有先兆的偏头痛

答案:E

解析:此题暂无解析

459.(A1/A2型题)不常发作也不很强烈的偏头痛应用

- A.非甾体类抗炎药
- B.发作早期给麦角胺
- C.5-羟色胺受体激动剂
- D.氟桂利嗪
- E.皮质类固醇

答案:A

解析:此题暂无解析

460.(A1/A2型题)临床上癫痫发作与假性癫痫发作的主要鉴别为发作时有

- A.全身抽搐
- B.突然跌倒
- C.呼吸急促,喉中发出叫声
- D.双手紧握,下肢僵直
- E.伴瞳孔散大,对光反应消失

答案:E

解析:假性发作是一种非癫痫性的发作性疾病,是由心理障碍而非脑电紊乱引起的脑部功能异常。在下列情况下要考虑假性发作的可能:①发作时脑电图上无相应的痫性放电。②抗癫痫药治疗无效。③发作没有刻板性,运动表现为非典型癫痫样抽动。④不伴瞳孔散大、对光反射消失。故选E。

461.(A1/A2型题)癫痫持续状态判断的标准之一,是指一次发作的时间至少超过

- A.30分钟
- B.25分钟
- C.20分钟
- D.15分钟
- E.10分钟

答案:A

解析:癫痫的持续状态包括2种情况,一种是指癫痫连续多次发作,在发作间隙期意识未能恢复者,另一种是指一次癫痫发作持续30分钟以上者。任何一种癫痫发作类型都可以产生癫痫持续状态。故选E。

462.(A1/A2型题)关于低钾型周期性瘫痪叙述不正确的是

- A.发作性肌无力
- B.下肢重于上肢
- C.远端重于近端
- D.心电图可见ST段下降, QRS波增宽
- E.最常见的周期性瘫痪

答案:C

解析:此题暂无解析

463.(A1/A2型题)低血钾型周期性瘫痪的临床表现,正确的是

- A.多见于中老年患者
- B.颅神经受损
- C.对称性弛缓性瘫痪
- D.腱反射亢进
- E.病理反射阳性

答案:C

解析:低钾型周期性瘫痪以青壮年发病居多,男性多于女性,为双侧对称性的四肢弛缓性瘫痪,近端重,肌张力低,腱反射减弱或消失。

464.(A1/A2型题)智力单位 $IQ=(MA/CA)\times 100$ 称为

- A.人格智商
- B.离差智商
- C.比率智商
- D.中位数智商
- E.百分位智商

答案:C

解析:比率智商比率智商的计算公式:智商(IQ)=[智力年龄(MA)/实际年龄(CA)]  
 $\times 100$ ;离差智商(Deviation

465.(A1/A2型题)思维迟缓多见于

- A.强迫症
- B.精神分裂症状
- C.抑郁症
- D.分离(转换)性障碍
- E.癫痫

答案:C

解析:此题暂无解析

466.(A1/A2型题)女,65岁。经常出现头晕、四肢麻木感,注意力不易集中,自感记忆力下降半年,近2周突然加重。常半夜起床翻东西,怀疑家中被窃,易哭泣,对一些物品不能命名。既往高血压病史15年。头颅CT示:多发性脑梗死。最可能的诊断是

- A.阿尔茨海默病
- B.血管性痴呆
- C.轻度认知功能损害
- D.高血压病伴精神障碍
- E.匹克病

答案:B

解析:VD=记忆障碍+夜间精神紊乱+脑血管病史

467.(A1/A2型题)35岁男性,病人1年前头部受外伤,后渐出现性格改变,孤僻、待人冷漠,爱发脾气,自私、不关心家人,该患者诊断考虑

- A.躁狂病
- B.抑郁症
- C.双相情感障碍
- D.脑外伤所致精神障碍
- E.人格改变

答案:D

解析:此题暂无解析

468.(A1/A2型题)躯体疾病所致精神障碍的临床表现的共同特点,正确的是

- A.精神症状无"昼轻夜重"的波动性

- B.与原发病在程度上无平行关系
- C.精神症状一般发生在躯体疾病的恢复期
- D.与原发病在时间上有先后关系
- E.无躯体疾病的临床表现和实验室阳性发现

答案:D

解析:躯体疾病的急性期、慢性期、迁延期均可以叠加精神病性症状,情感症状及神经症症状,智能障碍和人格改变等。与原发病在程度上有平行关系。与原发病在时间上有先后关系。

469.(A1/A2型题)女性,空腹血糖高,临床诊断糖尿病所致精神障碍,症状表现以抑郁为主,这时治疗措施应为

- A.控制糖尿病
- B.控制糖尿病+选择性5-羟色胺再摄取抑制剂(SSRI)
- C.选择性5-羟色胺再摄取抑制剂(SSRI)单独使用
- D.三环类抗抑郁药物单独使用
- E.对症治疗+心理治疗

答案:B

解析:此题暂无解析

470.(A1/A2型题)有关美沙酮替代治疗,下列叙述不正确的是

- A.替代时间一般不超过21天
- B.逐日减量,只减不加
- C.首日剂量为60~90mg
- D.首日使用剂量可通过观察瞳孔、脉搏、血压及其他戒断症状来判定
- E.减量过程可以先快后慢,限时减完

答案:C

解析:此题暂无解析

471.(A1/A2型题)中枢神经兴奋剂是指以下哪种

- A.哌替啶
- B.司可巴比妥
- C.甲丙氨酯(眠尔通)
- D.可卡因
- E.苯丙胺

答案:E

解析:此题暂无解析

472.(A1/A2型题)不属于思维内容障碍的是

- A.思维散漫
- B.思维被播散
- C.被洞悉感
- D.被控制感
- E.被监视感

答案:A

解析:思维散漫指思维的目的性、连贯性和逻辑性障碍。患者思维活动表现为联想松弛,内容散漫,缺乏主题,一个问题与另外一个问题之间缺乏联系。说话东拉西扯,以致别人弄不懂他要阐述的是什么主题思想。对问话的回答不切题,以致检查者感到交谈困难。属于思维形式的障碍,不属于思维内容的障碍,所以不正确,选A。

473.(A1/A2型题)患者认为自己只是一个躯壳,自己不复存在,是虚假的,这种症状属于

- A.虚构
- B.错觉
- C.本体幻觉
- D.虚无妄想
- E.自罪妄想

答案:D

解析:妄想是思维变态的一种主要表现。妄想是一种在病理基础上产生的歪曲的信念、病态的推理和判断。妄想有很多种,其中虚无妄想系指患者坚信自己体内某些脏器或整个自身,甚至自己周围的部分或整个世界均不复存在。故选D。

474.(A1/A2型题)抑郁发作时,1日之内的规律是

- A.昼轻夜重
- B.昼重夜轻
- C.中午起逐渐加重
- D.中午最严重以后减轻
- E.半夜最重

答案:B

解析:此题暂无解析

475.(A1/A2型题)利培酮的副作用主要是

- A.锥体外系症状
- B.过敏反应
- C.心血管副作用
- D.粒细胞减少
- E.静坐不能

答案:E

解析:三环类抗抑郁药心血管副作用为主要不良反应,可以影响血压,心律和传导功能,引起窦速、直立性低血压、心律失常和传导阻滞。而利培酮的主要副作用是静坐不能。

476.(A1/A2型题)有关分离(转换)性障碍发作与癫痫大发作的鉴别要点,以下哪种说法不正确

- A.癫痫大发作时意识完全丧失
- B.癫痫大发作时瞳孔多散大且对光反应消失
- C.癫痫大发作常有咬破唇舌、跌伤和大小便失禁
- D.癫痫大发作抽搐无规律性

E.癫痫大发作后完全不能回忆,脑电图检查有特征变化

答案:D

解析:此题暂无解析

477.(A1/A2型题)女,25岁。半年前离婚。某日下班后回到家中突然出现强烈的恐惧感,有如大祸临头,同时心悸、胸闷,呼吸困难,有窒息感。全身多汗、脸红、手脚发麻、四肢颤抖。5-6分钟后逐渐平静。最可能的诊断是

A.恐怖症

B.精神分裂症

C.慢性焦虑症

D.心理生理障碍

E.惊恐发作

答案:E

解析:惊恐发作又称急性焦虑症,特点是发作的不可预测性和突发性,发作时常表现为明显的自主神经症状,如心悸,有剧烈的心跳、心慌、呼吸困难、胸闷、四肢发麻等,甚至出现不能控制的发抖出汗。故此患者惊恐万分,似有濒死之感,有时害怕自己完全失去控制而精神失常。发作时间一般是5~20分钟,很少超过一个小时。发作时意识清楚,发作过后有担心再发作的心理。

478.(A1/A2型题)骨折急救时主要应进行

A.抗感染治疗

B.脱水治疗

C.妥善固定

D.通报家属

E.开放骨折复位

答案:C

解析:骨折的正确的现场急救和安全转运是减少患者痛苦、防止再损伤或污染的重要措施,其中最要紧的是妥善固定。现场外固定是外伤急救的重要步骤,是确保伤员生命安全,为进一步治疗创造条件。外伤发生后,全身及受伤部位尤其是骨折部位需要稳定,以减少损伤的进一步加重,减轻伤员疼痛,有利于转运。抢救现场不做恰当的固定处理,就盲目地搬动伤员,就会使骨折或损伤部位组织器官增加新的创伤,给以后的治疗增加难度。故本题选C,可排除其它选项。

479.(A1/A2型题)符合骨折功能复位的是

A.10岁女孩干骺端骨折对位达1/4

B.6岁儿童股骨骨折短缩1.5cm

C.20岁女性肱骨干骨折分离移位0.5cm

D.45岁女性股骨骨折短缩2cm

E.青年男性胫腓骨骨折侧方成角 $20^{\circ}$

答案:B

解析:临床上有时虽尽最大努力,骨折仍未能达到解剖复位,但愈合后对肢体功能无明显影响者,称功能复位。每一部位功能复位标准不尽一致,一般认为:骨折部的旋转移位,分离移位必须完全矫正。下肢骨折缩短移位,在成人不超过1cm,儿童不超过2cm;骨横形骨折在骨干部端对位达到1/3,干骺端对位达到3/4以上,

在幼儿向前或向后成角移位因与关节活动方向相致，可在骨痂塑形期自行矫正，但在下肢，成人向前或向后成角移位不超过10度，儿童不超过15度，日后在骨痂塑形期也可自行矫正，向侧方成角与关节活动方向垂直，日后不能自行矫正，必须完全复位，否则关节内外两侧在负重时所受压力不均，日后可继发创伤性关节炎，引起疼痛及关节畸形。上肢骨折部位不同要求不同，肱骨干的轻度畸形，对功能影响不多，前臂双骨折就要求对位对线都好，否则将影响前臂旋转功能。根据以上复位原则可知，A、C、D、E均不符合功能复位，B符合要求，故本题选B。

480.(A1/A2型题)女，66岁。2小时前跌倒时手掌着地受伤。查体：右腕明显肿胀，压痛(+)侧面观呈“银叉样”畸形。最可能的诊断是

- A.Monteggia骨折
- B.Galeazzi骨折
- C.Smith骨折
- D.Colles骨折
- E.Chance骨折

答案:D

解析:此题暂无解析

481.(A1/A2型题)患者女，60岁。不慎跌倒，右手背着地，当即右腕肿痛，腕下垂，活动受限。其首选的诊断是

- A.Colles骨折
- B.Smith骨折
- C.尺神经损伤
- D.桡神经损伤
- E.腕关节脱位

答案:B

解析:桡骨下断骨折可以分为伸直型骨折(Colles骨折)和屈曲型骨折(Smith骨折)。伸直型骨折多为腕关节处于背伸位、手掌着地、前臂旋前时受伤，典型畸形为银叉样或枪刺样；屈曲型骨折多由于跌倒时腕关节屈曲、手背着地受伤引起，伤后出现腕部下垂，局部肿胀，腕部活动受限。故选B。

482.(A1/A2型题)男，32岁。车祸致左大腿受伤。X线片示坐骨皮质连续性中断。对诊断最有意义的临床表现是

- A.瘀斑
- B.活动受限
- C.压痛
- D.肿胀
- E.反常活动

答案:E

解析:此题暂无解析

483.(A1/A2型题)男性，35岁。2个月前由高处跌落，发生第1腰椎压缩性骨折，双下肢不全瘫，CT片显示脊髓被向后突出的第1腰椎后缘骨嵴压迫。此时应采用

- A.自身功能复位

- B.双踝悬吊复位
- C.椎板切除减压术
- D.两桌法复位
- E.椎管侧后方减压术

答案:E

解析:此题暂无解析

484.(A1/A2型题)下肢短缩,髋关节屈曲、内收、内旋畸形

- A.肩关节脱位
- B.肘关节脱位
- C.髋关节后上脱位
- D.髋关节前下脱位
- E.髋关节中心脱位

答案:C

解析:此题暂无解析

485.(A1/A2型题)在断指再植的手术指征中,哪项是错误的

- A.青年断指者,应尽量设法再植
- B.小儿断指者,均宜争取再植
- C.拇指功能最重要,要千方百计再植
- D.两处以上断离的断指应力争再植
- E.老人断指者,一般应慎重决定再植或不再植

答案:D

解析:此题暂无解析

486.(A1/A2型题)22岁青年,被电锯伤及右手小鱼际,有2.0cm×2.5cm的皮肤缺损,基底未见骨外露和神经外露,经清洗、消毒、清创后,应采取哪种修复方法

- A.局部皮瓣移植
- B.前臂交叉皮瓣移植
- C.胸、腹部皮瓣移植
- D.游离中厚皮片植皮
- E.吻合血管的游离皮瓣移植

答案:D

解析:此题暂无解析

487.(A1/A2型题)腕部正中神经损伤的表现不包括

- A.中指远节感觉消失
- B.示指远节感觉消失
- C.手部桡侧半感觉障碍
- D.拇指对掌功能障碍
- E.拇指和示指中指屈曲功能障碍

答案:E

解析:正中神经位于腕部和肘部位置表浅,易受损伤,尤以切割伤多见。在肘上无分支,其损伤可分为高位损伤(肘上)和低位损伤(腕部)。腕部损伤时支配的鱼

际肌和蚓状肌麻痹，所支配的手部感觉障碍。临床表现为：拇短展肌麻痹所致拇指对掌功能障碍，手掌桡侧半感觉障碍，特别是示、中指和远节感觉障碍。如果肘上正中神经损伤，则支配的前臂肌麻痹，除出现上述表现外，还有拇指和示、中指屈曲功能障碍。

488.(A1/A2型题)男，32岁。右上臂被重物砸伤2小时。局部疼痛，肿胀，活动受限。查体：右中下部可见畸形及异常活动，垂腕，手指不可伸直，最可能合并损伤的神经

- A.桡神经
- B.正中神经
- C.腋神经
- D.肌皮神经
- E.尺神经

答案:A

解析:此题暂无解析

489.(A1/A2型题)弹响指各手指发病频度最多的是

- A.拇、示指
- B.示、中指
- C.中、环指
- D.环、小指
- E.拇、小指

答案:C

解析:此题暂无解析

490.(A1/A2型题)腰椎间盘突出症，感觉减退出现在外踝部及足背外侧，踝反射减弱或消失，最常受压迫的神经根是

- A.腰3神经根
- B.腰4神经根
- C.腰5神经根
- D.骶1神经根
- E.骶2神经根

答案:D

解析:此题暂无解析

491.(A1/A2型题)男，35岁。左足第一跖趾关节突发红肿热痛和据按8小时。化验：血尿酸800 $\mu$ mol/L。此时最合适的治疗药物是

- A.别嘌醇
- B.苯溴马隆
- C.别嘌醇联合非甾体抗炎药
- D.苯溴马隆联合非甾体抗炎药
- E.非甾体抗炎药

答案:E

解析:此题暂无解析

492.(A1/A2型题)慢性骨髓炎死骨摘除术指征,是

- A.有死骨、死腔,骨包壳薄弱
- B.发热,局部红肿,有死骨、死腔
- C.开放性骨折感染,骨折尚未愈合,有大块死骨
- D.骨包壳充分形成,有死骨、死腔
- E.死骨分界不清,有死腔与窦道

答案:D

解析:此题暂无解析

493.(A1/A2型题)(2001、2012)对于急性化脓性骨髓炎早期诊断最具价值的检查是

- A.B超
- B.白细胞计数
- C.CT
- D.X线
- E.局部分层穿刺涂片与培养

答案:E

解析:此题暂无解析

494.(A1/A2型题)女,14岁。右大腿下端肿痛1个月。查体:局部软组织肿胀、压痛,X线片示右股骨下端溶骨性破坏,伴有骨膜反应,血碱性磷酸酶明显增高。最可能的诊断是

- A.转移性骨肿瘤
- B.骨肉瘤
- C.骨髓炎
- D.骨结核
- E.骨巨细胞瘤

答案:B

解析:此题暂无解析

495.(A1/A2型题)女,20岁。右小腿上端内侧发现肿物4年,无明显疼痛,X线显示,右胫骨上端内侧骨性突起,基底较宽,边界清,骨结构无明显破坏。可能诊断为

- A.骨肉瘤
- B.慢性骨髓炎
- C.骨巨细胞瘤
- D.骨软骨瘤
- E.胫骨先天畸形

答案:D

解析:骨软骨瘤是一种常见的良性肿瘤。其结构包括骨组织和其上的软骨帽。多见于长骨的干骺端,如股骨下端、胫骨上端合肱骨上端。在骨软骨瘤和周围的肌或肌腱反复摩擦,可形成附加滑囊。有1%单纯骨软骨瘤可恶变,多发性骨软骨瘤及广基底的骨软骨瘤有明显恶变倾向。临床上,骨软骨瘤可长期无症状,多为无意中发骨性包块而就诊。若肿瘤压迫周围组织以及其表面的滑囊发生炎症,则可产生疼痛。体格检查所见肿块较X线片显示的大。图示如下:

496.(A1/A2型题)女, 35岁, 因蝶形红斑关节肿痛血小板减少, ANA阳性确诊为系统性红斑狼疮, 在使用强的松45mg/d治疗一个月后突发38.8°C伴寒战、咳嗽和咳痰, 化验: WBC $16 \times 10^9/L$ , 首选以下哪项治疗

- A.环磷酰胺静脉冲击
- B.干细胞移植
- C.头孢菌素静脉滴注
- D.甲基强龙静脉冲击
- E.倍他米松肌注

答案:C

解析:在SLE的治疗中, 如存在感染, 应及早发现和治疗感染。

497.(A1/A2型题)女性, 35岁, 双手关节疼痛6个月, 偶有肿胀, 晨僵约30min, 间断低热。查体:双手指间关节压痛阳性, 未见明显肿胀和活动受限。血红蛋白102g/L, WBC $2.8 \times 10^9/L$ , 血小板 $123 \times 10^9/L$ ;尿蛋白1.0g/L;血沉52mm/h。为明确诊断首要的检查项目是

- A.抗核抗体谱
- B.双手X线检查
- C.肾脏穿刺
- D.骨髓涂片
- E.急性期反应物

答案:A

解析:患者为年轻女性, 发热伴关节痛, 血常规中白细胞和血红蛋白降低, 血沉增快, 尿常规可见蛋白, 多系统受累, 考虑可能患有系统性红斑狼疮。为明确诊断首要的检查项目是抗核抗体谱, 尤其是其中的抗ds-DNA抗体和抗Sm抗体。故选择A。

498.(B型题)属非选择性COX抑制剂, 半衰期长

- A.布洛芬
- B.双氯芬酸
- C.萘丁美酮
- D.美洛昔康
- E.塞来昔布

答案:C

解析:此题暂无解析

499.(B型题)易发生结膜炎或巩膜炎的是

- A.强直性脊柱炎
- B.银屑病关节炎
- C.肠病性关节炎
- D.幼年型强直性脊柱炎
- E.反应性关节炎

答案:E

解析:此题暂无解析

500.(A1型题)重度新生儿寒冷损伤综合征患儿复温时间为

- A.12—24小时
- B.0—1小时
- C.6—12小时
- D.24—36小时
- E.3—6小时

答案:A

解析:重度新生儿寒冷损伤综合征体温 $<30^{\circ}\text{C}$ 。当肛温 $<30^{\circ}\text{C}$ ，一般均应将患儿置于箱温比肛温高 $1\sim 2^{\circ}\text{C}$ 的暖箱子，中途进行外加热。每小时提高箱温 $0.5\sim 1^{\circ}\text{C}$ （箱温不超过 $34^{\circ}\text{C}$ ）在 $12\sim 24$ 小时内恢复正常体温，然后根据患儿体温调整暖箱温度。故选A。

501.(A1型题)确诊新生儿败血症最有意义的检查是

- A.血培养
- B.免疫功能检测
- C.血常规
- D.分泌物涂片革兰染色
- E.血CRP

答案:A

解析:此题暂无解析

502.(A1型题)风湿性心包炎的特点，以下哪项是错误的

- A.心前区疼痛，呼吸困难
- B.早期可听到心包摩擦音
- C.心音遥远少见
- D.发病早期积液量增多
- E.X线心脏搏动减弱

答案:D

解析:此题暂无解析

503.(A1型题)有关风湿热的预后下述哪项有错误

- A.舞蹈病的预后一般良好
- B.首次发作累及心脏者，预后较差
- C.反复发作累及心脏者预后不良
- D.并发心功能不全者预后不良
- E.伴发心包炎者预后良好

答案:E

解析:此题暂无解析

504.(A1型题)风疹的典型临床表现是

- A.潜伏期 $5\sim 7$ 天
- B.高热
- C.热退后全身出疹

D.颈后、枕后、耳后淋巴结肿痛

E.出疹后脱皮

答案:D

解析:风疹系风疹病毒感染,全身症状轻,耳后、枕部淋巴结肿大并触痛面部一躯干四肢,斑丘疹,疹间有正常皮肤,退疹后无色素沉着及脱屑。潜伏期14~21天,平均18天。为低热,伴轻微卡它症状。发热后半天至1天出疹。一般出疹历时3天,出疹后蜕皮极少。故D为本题正确选项。其余选项均有错误。风疹的典型临床表现是颈后、枕后、耳后淋巴结肿痛。

505.(A1型题)不符合幼儿急疹特点的是

A.高热时可有惊厥

B.红色斑丘疹在颈及躯干多见

C.可有耳后淋巴结肿大

D.出疹期热度更高

E.高热3~5天

答案:D

解析:幼儿急疹是由病毒感染引起的一种小儿急性传染病,多见于6~18个月小儿。临床表现为突起高热,体温在39~40°C,高热早期可能伴有惊厥,故不选A,发热期间有咽部充血、枕部、颈部及耳后淋巴结肿大,故不选C,发热持续3~5天后骤退,热退时出现大小不一的淡红色斑疹或斑丘疹,初起于躯干,很快波及全身,故不选B、E,选D。

506.(A1型题)结核性脑膜炎早期的主要症状是

A.发热

B.头痛

C.性格改变

D.呕吐

E.便秘

答案:C

解析:此题暂无解析

507.(A1型题)下列哪项不是结核性脑膜炎中期临床表现

A.头痛剧烈

B.呕吐加重

C.脑膜刺激征

D.颅神经障碍

E.嗜睡、频繁惊厥

答案:E

解析:此题暂无解析

508.(A1型题)1/2张液体是

A.2:3:1液

B.2:1液

C.4:3:2液

D.4:1液  
E.2:6:1液

答案:A

解析:此题暂无解析

509.(A1型题)关于小儿腹泻的易感因素,描述错误的是

- A.正常肠道菌群对入侵的致病微生物没有拮抗作用
- B.生长发育快,所需营养物质相对较多,消化道负担较重
- C.胃内酸度低,而婴儿胃排空较快
- D.血液中免疫球蛋白和胃肠道SIgA均较低
- E.肠道内感染不是导致小儿腹泻病的内在因素

答案:A

解析:小儿消化系统特点:①消化系统发育不良,胃酸和消化酶分泌较少,对食物的耐受力差;②因生长发育快,所需营养物质相对较多,消化道负担较重,因此易于发生消化功能紊乱。另外,小儿机体防御功能较差表现为:①胃内酸度低,而且婴儿胃排空较快,对进入胃内的细菌杀灭能力减弱;②血液中免疫球蛋白和胃肠道SIgA均较低;③正常肠道菌群对入侵的致病微生物有拮抗作用,新生儿生后尚未建立正常肠道菌群时或由于使用抗生素等引起肠道菌群失调时,均易患肠道感染。肠道内感染不是导致小儿腹泻病的内在因素。

510.(A1/A2型题)小儿肺炎合并脓胸时应给予的最佳治疗

- A.大剂量有效抗生素治疗
- B.胸腔闭式引流
- C.胸腔穿刺排脓
- D.胸廓成形术治疗
- E.中成药治疗

答案:B

解析:此题暂无解析

511.(A1/A2型题)支气管肺炎一般用鼻前庭导管氧浓度不超过

- A.10%
- B.20%
- C.40%
- D.50%
- E.60%

答案:C

解析:此题暂无解析

512.(A1/A2型题)卵圆孔解剖上关闭的时间为

- A.生后3周内
- B.生后5周内
- C.生后8~10周
- D.生后3~4个月
- E.生后5~7个月

答案:E

解析:此题暂无解析

513.(A1/A2型题)在胸骨左缘第2~4肋间可听到II~IV级喷射性收缩期杂音的先  
天性心脏病是

- A.室间隔缺损
- B.房间隔缺损
- C.动脉导管未闭
- D.法洛四联症
- E.肺动脉狭窄

答案:D

解析:此题暂无解析

514.(A2型题)女, 13岁。因水肿3天, 剧烈头痛、呕吐2天入院。2周前曾发热、咽痛。  
查体:P110次/分, BP170/120mmHg。双肺无异常。Hb110g/L。尿常规:蛋白(++),  
RBC30~50/HP, 尿比重1.020, 血尿素氮9.4mmol/L, 最可能的诊断是

- A.急性肾小球肾炎并严重循环充血
- B.急进性肾小球肾炎
- C.急性肾小球肾炎并高血压脑病
- D.急性肾小球肾炎并急性肾功能不全
- E.急性肾小球肾炎

答案:C

解析:急性肾小球肾炎临床表现为急性起病, 多有前期感染, 以血尿、蛋白尿、水  
肿、高血压为主要表现, 并可有一过性氮质血症的一组疾病。急进性肾小球肾炎  
的临床起病过程和表现类似急性肾小球肾炎但肾功能急剧减退、早期出现少尿  
性急性肾衰竭为特征。结合案例, 选C。

515.(A2型题)男孩, 8岁。水肿5天, 血尿、少尿3天入院。查体:P110次/分, R32次/  
分, BP140/90mmHg, 烦躁, 颜面、双下肢明显水肿, 双肺底可闻及少量湿啰音,  
肝肋下2cm。尿常规:蛋白(++), RBC70~80个/HP。WBC40~50个/HP。首选的  
治疗药物是

- A.呋塞米
- B.毛花苷丙
- C.硝普钠
- D.低分子右旋糖酐
- E.糖皮质激素

答案:A

解析:此题暂无解析

516.(A2型题)男, 10个月, 面色苍黄, 毛发稀疏, 易怒少哭, 查体:体温正常, 神清,  
不会扶站, 四肢抖动, 踝阵挛, 巴氏征(+), 该患婴的诊断可能是

- A.先天愚型
- B.多动症
- C.病毒性脑膜炎

D.癫痫小发作

E.巨幼细胞性贫血

答案:E

解析:该患婴面色苍黄,首先考虑贫血,而巨幼细胞性贫血除一般贫血表现外,还伴有神经精神症状,如易怒少哭,查体四肢抖动,踝阵挛,巴氏征(+)等支持巨幼细胞性贫血。

517.(A1/A2型题)患儿,9个月,一个月前肺炎,治愈后始终不愿进食,仅吃母乳。近半个月,面色渐白,活动减少,血象RBC $3.05 \times 10^{12}/L$ , Hb70g/L, WBC $8 \times 10^9/L$ , PLT $156 \times 10^9/L$ , MCV72pg, CH25fl, MCHC30%,该患儿诊断应考虑什么

A.巨幼细胞性贫血

B.缺铁性贫血

C.营养性混合性贫血

D.再生障碍性贫血

E.急性白血病

答案:B

解析:此题暂无解析

518.(A2型题)2岁儿童,发热、头痛、恶心呕吐2天,嗜睡1天。查体:体温 $39.5^{\circ}$ ,浅昏迷,瞳孔等大,对光反应良,颈强(+),克氏征(+),胸腹部多个出血点。化验:WBC $19 \times 10^9/L$ , N85%,最可能的诊断是

A.结核性脑膜炎

B.流行性脑脊髓膜炎

C.流行性乙型脑炎

D.流行性出血热

E.中毒性细菌性痢疾

答案:B

解析:除高热、惊厥和脑膜刺激征外,胸腹部多个出血点符合流脑的诊断。本题应为传染病学试题。

519.(A1/A2型题)女孩,9岁。发热、头痛、呕吐2天,烦躁不安1天,于2月20日入院。查体:T $39.8^{\circ}C$ , BP130/80mmHg,神志清,精神差,全身散在瘀点,瘀斑,颈抵抗(+),Kernig征(+),Babinski(+)征。实验室检查:血WBC $20 \times 10^9/L$ , N0.90。脑脊液检查:压力240mmH<sub>2</sub>O,外观浑浊, WBC $20 \times 10^9/L$ ,蛋白1.5g/L,糖1.5mmol/L,氯化物100mmol/L。最可能的诊断是

A.钩端螺旋体病

B.中毒型细菌性痢疾

C.流行性乙型脑炎

D.结核性脑膜炎

E.流行性脑脊髓膜炎

答案:E

解析:此题暂无解析

520.(A1型题)下列各项,不属传染病基本特征的是

- A.有病原体
- B.有感染后免疫性
- C.有流行病学特征
- D.有发热
- E.有传染性

答案:D

解析:传染病基本特征包括:有病原体、有传染性、有流行病学特征、有感染后免疫性,而发热则是多种疾病的一种临床表现。

521.(A1型题)条件致病菌指的是

- A.正常菌群中的细菌
- B.入侵的病原菌
- C.带菌者排出的病原菌
- D.患者排出的病原菌
- E.在某些特定条件下由正常菌群转变成的致病菌

答案:E

解析:此题暂无解析

522.(A2型题)男性,30岁,结核菌试验1:2000弱阳性,而无结核症状,体征从X线发现

- A.病原携带状态
- B.重复感染
- C.潜在性感染
- D.显性感染
- E.既往有过感染

答案:E

解析:此题暂无解析

523.(A1型题)诊断钩端螺旋体病的血清学检查方法为

- A.肥达反应
- B.外-斐反应
- C.补体结合试验
- D.显微镜凝集溶解试验
- E.红细胞溶解试验

答案:D

解析:显微镜凝集溶解试验是诊断钩端螺旋体病常用的血清学检查方法。抗体效价 $>1/400$ 或早期及恢复期双份血清抗体效价上升4倍或以上,可确定诊断。肥达试验主要用于伤寒、副伤寒的诊断。外-斐试验主要用于流行性斑疹伤寒的诊断。

524.(A1型题)急性肝衰竭主要病理变化

- A.肝内淤胆
- B.肝细胞局灶性坏死
- C.汇管区纤维组织增生
- D.汇管区单核细胞浸润

E.肝细胞广泛坏死

答案:E

解析:此题暂无解析

525.(A1型题)在疟疾的表现中(典型),下列哪项是错误的

A.定时性,周期性寒热,大汗发作

B.有完全缓解间歇

C.脾肿大

D.白细胞增多,中性粒细胞升高

E.贫血

答案:D

解析:此题暂无解析

526.(A1型题)肾综合征出血热的传染源主要是

A.啮齿类

B.猪

C.病毒携带者

D.犬

E.急性期病人

答案:A

解析:此题暂无解析

527.(A1型题)肾综合征出血热早期休克的主要原因

A.病毒血症

B.血浆外渗

C.心肌损害

D.微血管痉挛

E.电解质紊乱

答案:B

解析:此题暂无解析

528.(B型题)生殖道沙眼衣原体感染者需做

A.TPPARPR

B.醋酸白试验

C.HIV

D.衣原体检查

E.真菌涂片

答案:D

解析:此题暂无解析

529.(A2型题)患者男,52岁。车祸致骨盆骨折,脾破裂,脾切除术后胃瘫,给予静脉输入25%葡萄糖400ml和其他液体,术后10天患者出现皮肤、巩膜黄染,并进行性加重,化验血糖20.3mmol/L。出现黄疸的最可能的原因是

A.复合伤导致肝功能失代偿

- B.糖代谢紊乱导致肝功能损害
- C.电解质紊乱导致肝功能损害
- D.药物中毒导致肝功能损害
- E.输血所致血管内溶血

答案:B

解析:葡萄糖是肠外营养主要的能源来源,但葡萄糖的应用也有不少缺点,首先是用于肠外营养(PN)的葡萄糖溶液是高浓度的,对静脉壁的刺激很大;其次是机体利用葡萄糖的能力有限,过量或过快可能导致高血糖、糖尿,甚至高渗性非酮性昏迷;另外,应激时机体利用葡萄糖的能力下降,多余的糖将转化为脂肪而沉积在器官内,如肝脂肪浸润,损害其功能。故选B。

530.(A1型题)关于外科感染的特点,错误的是

- A.多为混合性感染
- B.有明显的局部症状
- C.常需外科处理感染
- D.伴器质性病变
- E.不会引起严重的全身性感染

答案:E

解析:外科感染是指需要外科治疗的感染,包括创伤、手术、烧伤等并发的感染。当细菌毒性大、数量多和(或)宿主抵抗力明显不足时,感染迅速扩散,病菌可定植于血液出现菌血症;机体对于感染的过度反应还可引起全身炎症反应综合征称为脓毒症,由此可知,E选项是错误的。

531.(A1型题)与金黄色葡萄球菌毒力有关的因素

- A.形成血浆凝固酶的能力
- B.透明质酸酶
- C.耐药性
- D.特异性细胞糖类的存在
- E.磷酸酶活力

答案:A

解析:血浆凝固酶是能使含有枸橼酸钠或肝素抗凝剂的人或兔血浆发生凝固的酶类物质,致病菌株多能产生,常作为鉴别葡萄球菌有无致病性的重要标志。故选A。

532.(A1型题)机体对创伤或感染代谢反应不同于禁食代谢反应的主要特点是

- A.机体能量消耗减少
- B.处理葡萄糖的能力降低
- C.体内蛋白质分解减慢
- D.尿氮减少
- E.脂肪动用减慢

答案:B

解析:机体对创伤、手术或感染的代谢反应表现为高合成和分解代谢,其程度与创伤和感染的严重程度成正比,机体能量消耗增加,胰岛素反应不足,处理葡萄糖的能力降低,易发生高血糖。故选B。

533.(A1型题)丹毒的致病菌是

- A.大肠埃希菌
- B.拟杆菌
- C.铜绿假单胞菌
- D.β型溶血性链球菌
- E.金黄色葡萄球菌

答案:D

解析:丹毒临床表现为起病急,局部出现界限清楚的片状红疹,颜色鲜红,并稍隆起,压之褪色。皮肤表面紧张炽热,迅速向四周蔓延,有烧灼样痛是由A组β型溶血性链球菌(即乙型溶血性链球菌)所致的急性真皮炎症。故选D。

534.(A1型题)患者,男,2007年10月8日因车祸被抬入急诊室。CT检查显示颅内出血,量约30ml,合并下颌骨开放性骨折。并有舌后坠,抢救原则首先是

- A.降低颅内压
- B.下颌骨结扎固定
- C.积极扩容
- D.保持呼吸道通畅
- E.开颅手术

答案:D

解析:急救首先要保持呼吸道通畅。

535.(A2型题)男,20岁。右前臂被炸伤4小时,最大伤口长5cm,出血多,伤及肌肉,X线检查无骨折、未见金属异物,其伤口最佳处理是

- A.清创后二期缝合
- B.加压包扎止血、观察
- C.清洗伤口后包扎
- D.包扎,石膏固定患肢
- E.清创后一期缝合

答案:A

解析:开放性火器伤清创原则:绝大多数火器伤应做清创术,清创后伤口一般不作一期缝合,而是做二期缝合。伤后清创越早越好,严格无菌原则,切口要够大,清创要彻底。故本题答案为A。

536.(A1/A2型题)影响创伤愈合因素中,最常见的全身因素

- A.伤口感染
- B.局部血液循环障碍
- C.全身营养不良
- D.免疫功能低下
- E.全身严重并发症

答案:C

解析:此题暂无解析

537.(A2型题)男, 18岁, 右足和右小腿被开水烫伤, 有水疱伴剧痛。创面基底部肿胀发红, 该病人烧伤面积和深度的诊断为

- A.5%浅Ⅱ°
- B.5%深Ⅱ°
- C.10%浅Ⅱ°
- D.10%深Ⅱ°
- E.15%浅Ⅱ°

答案:C

解析:双足占成人体表的7%, 双小腿占成人体表的13%, 所以右足加右腿占10%。水疱伴剧痛, 创面基底部肿胀发红, 应为浅二度。深二度则是有水疱, 痛觉迟钝, 创面微湿, 红白相间。故答案选C。

538.(A2型题)患者男, 8岁。右手烧伤, 有水疱, 剧痛, 在现场急救中, 为减轻疼痛, 最恰当的方法是

- A.安慰和鼓励受伤者
- B.肌内注射地西泮(安定)
- C.肌内注射哌替啶(度冷丁)
- D.抽吸水疱
- E.将手浸入冷水中

答案:E

解析:烧伤后及时冷疗能防止热力继续作用于创面使其加深, 并可减轻疼痛, 减少渗出和水肿, 越早效果越好。一般适用于中小面积烧伤, 特别是四肢烧伤。故选E。

539.(A2型题)患者男, 20岁。右足和右小腿被开水烫伤, 有大小不一水疱。创面基底部肿胀发红, 该患者烧伤面积和深度的诊断为

- A.5%浅Ⅱ度
- B.5%深Ⅱ度
- C.10%浅Ⅱ度
- D.10%深Ⅱ度
- E.15%浅Ⅱ度

答案:C

解析:双足占成人体表的7%, 双小腿占成人体表的13%, 所以右足加右腿占10%。水疱伴剧痛, 创面基底部肿胀发红, 应为浅二度。深二度则是有水疱, 痛觉迟钝, 创面微湿, 红白相间。故答案选C。

540.(A1型题)乳腺癌侵犯乳房悬韧带(Cooper韧带)后, 引起相应的皮肤改变是

- A.橘皮样变
- B.乳头内陷
- C.表面皮肤凹陷
- D.局部水肿
- E.铠甲状胸壁

答案:C

解析:若癌肿累及Cooper韧带,可使其缩短而致肿瘤表面皮肤凹陷,即所谓"酒窝征"。若癌细胞侵及皮内淋巴管并致淋巴管阻塞,引起淋巴回流障碍,出现真皮水肿,乳腺皮肤呈"橘皮样"改变。

541.(A1型题)确定乳房肿块性质最可靠的方法为

- A.临床表现
- B.溢液涂片
- C.乳房X线检查
- D.活组织切片检查
- E.B超断层仪检查

答案:D

解析:此题暂无解析

542.(A1型题)下列哪一项常可提示早期乳癌

- A.月经周期紊乱
- B.乳房周期性胀痛
- C.乳房局限性肿痛
- D.乳房内多个小肿块
- E.乳房内单个无痛性肿块

答案:E

解析:此题暂无解析

543.(A2型题)女,55岁。左乳房红肿、增大1个月,进展较快,无疼痛、发热。查体:左乳房红肿,局部温度略高,发硬,但未触及包块,左腋窝有肿大淋巴结,稍硬,活动度好,无压痛。血常规正常。最可能的诊断是

- A.乳腺增生症
- B.急性乳腺炎
- C.乳房结核
- D.导管内乳头状瘤
- E.炎性乳腺癌

答案:E

解析:炎性乳腺癌发展迅速、预后差。局部皮肤可呈炎症样表现,开始时比较局限,不久即扩展到乳房大部分皮肤,皮肤发红、红肿、增厚、粗糙、表面温度升高。急性乳腺炎病人感觉乳房肿胀疼痛、局部红肿、发热,随炎症进展,疼痛呈波动性,常有患侧淋巴结肿大、压痛。乳管内乳头状瘤患者一般无自觉症状,常因乳头溢液污染内衣而引起注意,溢液可为血性、暗棕色或黄色液体。乳腺良性增生病临床表现为乳房胀痛和肿块,部分病人具有周期性,疼痛与月经周期有关。故本题答案为E。

544.(A1型题)治疗急性有机磷农药中毒致肺水肿的主要药物是

- A.西地兰
- B.阿托品
- C.解磷定
- D.安定(地西洋)

E.地塞米松

答案:B

解析:阿托品是M受体阻断剂,能改善毒蕈碱样表现--平滑肌痉挛和腺体分泌增多,可治疗肺水肿。

545.(A1型题)对敌百虫杀虫剂中毒的患者,洗胃忌用

A.生理盐水

B.2%~3%碳酸氢钠溶液

C.1:5000高锰酸钾

D.清水

E.温开水

答案:B

解析:有机磷农药中毒洗胃可用2%~3%碳酸氢钠溶液、1:5000高锰酸钾、清水,敌百虫中毒忌用碳酸氢钠,对硫磷中毒忌用高锰酸钾。

546.(A1型题)急性有机磷中毒患者应用阿托品过量引起中毒时,解毒剂是

A.依地强钠钙

B.毛果芸香碱

C.青霉胺

D.亚甲蓝

E.二巯基丙醇

答案:B

解析:此题暂无解析

547.(A1/A2型题)颈椎的一般结构不包括

A.椎体小

B.横突有孔

C.椎孔大

D.棘突分叉

E.横突有肋凹

答案:E

解析:颈椎的特点是椎体较小,呈椭圆形,横突上有横突孔,椎动脉和椎静脉由此孔通过;棘突短而分叉;上下关节突的关节近似水平位,使颈部能灵活运动。相邻椎骨上下切迹围成椎间孔,有脊神经和血管通过。故选E。

548.(A1/A2型题)关于椎体的说法,错误的是

A.呈短圆柱状

B.位于椎骨前部

C.主要由松质构成

D.表面有一层密质

E.椎体中央有椎孔

答案:E

解析:此题暂无解析

549.(A1/A2型题)下列哪个颈椎的棘突特别长

- A.第1颈椎
- B.第3颈椎
- C.第5颈椎
- D.第6颈椎
- E.第7颈椎

答案:E

解析:第7颈椎(隆椎)棘突特别长,活体易于触及,常作为计数椎骨序数的标志。

550.(A1/A2型题)形成腹股沟韧带的是

- A.腹外斜肌腱膜
- B.腹内斜肌腱膜
- C.腹横肌腱膜
- D.腹横筋膜
- E.腹壁浅筋膜

答案:A

解析:腹股沟韧带即腹外斜肌腱膜在髂前上棘至耻骨结节间向后上方反折增厚的部分。

551.(A1/A2型题)背阔肌叙述错误的是

- A.全身最大的扁肌
- B.起自下6个胸椎棘突、腰背筋膜
- C.起自下6个胸椎棘突、全部腰椎棘突、骶正中嵴、髂嵴后部
- D.肌束向外上方集中
- E.止于肱骨小结节嵴

答案:B

解析:背阔肌位于腰背部和胸部后外侧皮下,为全身最大的阔肌,呈直角三角形,上内侧部被斜方肌遮盖,以腱膜起自下6个胸椎棘突,全部腰椎棘突,髂嵴外侧唇后1/3。

552.(A1/A2型题)肱二头肌的描述不正确的是

- A.长头起自孟上粗隆
- B.可屈肘、前臂旋后和屈肩
- C.短头起自肱骨体
- D.止于桡骨粗隆
- E.肌腱向内下移行为腱膜止于前臂肌表面

答案:C

解析:肱二头肌的长头起于肩胛骨孟上粗隆,短头起于肩胛骨喙突。长,短二头于肱骨中部汇合为肌腹,下行至肱骨下端,集成肌腱止于桡骨粗隆和前臂筋腱膜。故选C。

553.(A1/A2型题)大唾液腺包括以下哪项

- A.舌下腺
- B.舌腺

- C.唇腺
- D.颊腺
- E.腮腺

答案:A

解析:大唾液腺有3对,即腮腺、下颌下腺和舌下腺。

554.(A1/A2型题)下列何器官不属于后纵隔

- A.食管
- B.支气管
- C.奇静脉
- D.交感干
- E.胸导管

答案:B

解析:此题暂无解析

555.(A1/A2型题)临床进行膀胱穿刺时,可不进入腹膜腔以减少感染,其根据是

- A.因膀胱随尿液充盈程度不同发生位置变化
- B.因膀胱位置浅表不必打开腹膜腔
- C.因膀胱是腹膜间位器官
- D.因膀胱体直接与腹前壁相邻
- E.因膀胱位于盆腔上方

答案:A

解析:此题暂无解析

556.(A3/A4型题)某一类Ig,单体,有四个亚类,有调理吞噬和ADCC效应,在临床上可用该Ig进行免疫治疗。该Ig血清中含量水平

- A.位于所有Ig中的第2位
- B.最高
- C.最低
- D.位于所有Ig中的第3位
- E.位于所有Ig中的第4位

答案:B

解析:此题暂无解析

557.(A3/A4型题)Ig由两条轻链和两条重链组成,通过反复折叠可形成若干球形结构-Ig功能区。用蛋白酶可使其裂解为若干水解片段。CH4功能区只出现在

- A.IgG和IgM
- B.IgA和IgE
- C.IgM和IgA
- D.IgA和IgG
- E.IgM和IgE

答案:E

解析:此题暂无解析

558.(A3/A4型题)男性, 42岁, 长期咳嗽、经常咳脓痰15年, 经常应用抗生素治疗。发热、咳脓臭痰1周来诊, 查体, 左肺下背部呼吸音弱, 可闻湿啰音。治疗药物你选择下列哪项

- A.青霉素
- B.青霉素+复方甘草片
- C.丁胺卡那
- D.哌拉西林/他唑巴坦+丁胺卡那
- E.丁胺卡那+甲硝唑

答案:D

解析:此题暂无解析

559.(A3/A4型题)患者男, 45岁。发热、咳脓痰1周, 胸部X线片示右下叶背段浸润阴影。用头孢呋辛治疗体温稍下降, 但痰量增多, 为脓血痰, 有臭味。1周后复查胸部X线片示: 大片浸润阴影中出现空洞。治疗中需加用的药物是

- A.阿米卡星
- B.左氧氟沙星
- C.甲硝唑
- D.红霉素
- E.万古霉素

答案:C

解析:急性发作的畏寒、高热、咳嗽和咳大量脓臭痰等病史, 结合大片浸润阴影中有空洞的X线征象, 可诊断为肺脓肿, 药物治疗选择青霉素、林可霉素、克林霉素、甲硝唑等, 答案为C。

560.(A3/A4型题)男, 70岁。痰中带血1月余。吸烟10年, 40支/天。胸部X线片: 右肺门大块影伴右上肺不张, 支气管镜见右上肺开口内新生物。初步诊断首先考虑的肺癌类型是

- A.周围型
- B.弥漫型
- C.结节型
- D.中心型
- E.混合型

答案:D

解析:1.位置靠近肺门者称为中心型肺癌;起源于肺段支气管以下的肺癌, 位置在肺的周围部分者称为周围型肺癌。

561.(A3/A4型题)男, 63岁。咳嗽、痰中带血丝半年余。吸烟40余年。胸部X线片示右上肺近肺门处肿块影。为明确病理诊断, 首选的检查是

- A.开胸活检
- B.胸腔镜活检
- C.纵膈镜活检
- D.经胸壁肺穿刺活检
- E.支气管镜活检

答案:E

解析:此题暂无解析

562.(A2型题)男性, 55岁, 刺激性咳嗽, 痰中带血2周, 胸片显示左肺门增大。最可能的诊断是

- A.肺癌
- B.肺结核
- C.肺良性肿瘤
- D.转移癌
- E.支气管扩张

答案:A

解析:根据患者的临床表现与实验室检查(腹泻2天, 为水样便带少量粘液, 量多, 日十余次, 相继呕吐数次。无发热、无腹痛。腓肠肌痉挛。体检:体温36.8°C, 神志清, 皮肤弹性差, 脉细速, 血压70/30mmHg。化验检查:大便镜检白细胞0~2/HP, 血红蛋白160pdL, 血白细胞计数 $12 \times 10^9/L$ , 中性粒细胞0.78, 淋巴细胞0.12, 单核细胞0.10), 与霍乱的表现较为符合, 故此题选D正确。

563.(A3/A4型题)30岁男性, 30分钟前被刀刺右前胸部, 咳血痰, 呼吸困难。体检:血压107/78mmHg, 脉搏96次/分, 右前胸有轻度皮下气肿, 右锁骨中线4肋间可见3cm长创口, 随呼吸有气体进出伤口响声。该患半小时后收入病房, 病人呼吸困难, 轻度紫绀, 右胸部皮下气肿明显加重, X线胸片示右肺完全萎陷, 纵隔向左侧偏移, 右侧平膈肌水平可见液平面。正规处理是

- A.立即输血
- B.准备行手术探查
- C.伤口清创并行胸腔闭式引流
- D.用注射器穿刺排气
- E.继续观察

答案:C

解析:此题暂无解析

564.(A3/A4型题)男, 27岁。发热1个月, 体温波动于37.5°C~38.5°C, 无咳嗽症状。查体:睑结膜略苍白, 双肺呼吸音清, 可闻及干、湿啰音, P136次/分, 律齐, 肋骨左缘第4肋间可闻及3/6收缩期杂音。腹平软, 肝肋下未触及异物, 脾肋下2cm, 可见杵状指。最可能诊断

- A.早产
- B.感染性心内膜炎
- C.风心病风湿活动
- D.白血病
- E.结缔组织病

答案:B

解析:1.根据发热、贫血、心脏杂音、脾大, 可诊断为感染性心内膜炎。

565.(A3/A4型题)男性, 25岁, 反酸伴黑便1月余, 体重无明显变化, 查:贫血貌, 腹软, 无压痛反跳痛, 肝脾肋下未及。最有可能的诊断是

- A.胃溃疡并出血

- B.十二指肠溃疡并出血
- C.食管胃底静脉曲张破裂出血
- D.胃癌
- E.急性胃炎

答案:B

解析:上消化道出血最常见的病因为:十二指肠溃疡病、胃粘膜糜烂、胃溃疡、食管静脉曲张、食管溃疡、食管贲门撕裂症、十二指肠糜烂、赘生物。消化性溃疡中,十二指肠溃疡比胃溃疡更易并发出血。故选B。

566.(A3/A4型题)患者,女,30岁,1周来发热、尿频、尿急、尿痛伴腰痛,既往无类似病史。查体:体温38.3°C,心肺检查未见异常,腹软,肝脾肋下未触及,双肾区有叩击痛、化验:尿蛋白(+),白细胞30~50/HP,可见白细胞管型,不宜作为首选的治疗药物是

- A.喹诺酮类
- B.头孢菌素类
- C.红霉素
- D.半合成广谱青霉素
- E.克林霉素

答案:C

解析:此题暂无解析

567.(A3/A4型题)患者男,70岁。进行性排尿困难10年,夜尿3~4次。从未药物治疗。直肠指检:前列腺体积增大,中央沟消失,表面尚光滑,质地中等。B超:双肾无积水,输尿管未见扩张。最大尿流率10ml/s。首先考虑的疾病是

- A.膀胱结石
- B.膀胱颈部挛缩
- C.前列腺癌
- D.前列腺增生
- E.神经源性膀胱

答案:D

解析:患者进行性排尿困难,并有尿频,直肠指检前列腺增大,中间沟消失,表面光滑、质地中等,故可诊断为前列腺增生。故本题答案为D。

568.(A3/A4型题)男,63岁。因渐进性排尿困难,夜尿增多就诊,医生询问病史后给患者做检查。该患需测残余尿,下列方法中哪项损伤小,最简便并反复测定

- A.排尿后导尿
- B.排尿后B超
- C.膀胱镜检查
- D.膀胱造影
- E.排尿性尿路造影

答案:B

解析:此题暂无解析

569.(A3/A4型题)患儿, 9个月。右睾丸未下降阴囊内, 查右阴囊空虚没触及睾丸, 左侧发育正常。患儿2岁仍未下降应采取治疗是

- A.右隐睾牵引
- B.右睾丸切除
- C.辜酮治疗
- D.绒毛膜促性腺激素治疗
- E.观察等待到5岁

答案:A

解析:此题暂无解析

570.(A3/A4型题)28岁不孕妇女, 痛经3年且逐渐加重。查子宫后壁有2个触痛性硬韧结节, 右侧附件区扪及超鸭卵大、活动不良囊性肿物, 压痛不明显本例右侧附件区囊性肿物最可能是

- A.卵巢滤泡囊肿
- B.卵巢黄体囊肿
- C.卵巢内膜异位囊肿
- D.输卵管卵巢囊肿
- E.多囊卵巢综合征

答案:C

解析:凡育龄妇女有继发性痛经进行性加重和不孕史, 盆腔检查扪及盆腔内有触痛性结节或子宫旁有不活动的囊性包块, 即可初步诊断为内异症。其中卵巢内异症最多见, 以单个多见, 称为卵巢子宫内膜异位囊肿。故选项C正确。

571.(A3/A4型题)女, 30岁。进行性痛经8年, 婚后5年未孕。妇科检查:子宫大小正常, 后位, 固定, 盆底可触及多个痛性结节, 右侧附件区触及直径约6cm的囊性包块, 不活动。左侧附件区组织略增厚。首先考虑的诊断是

- A.盆腔结核
- B.原发性痛经
- C.慢性盆腔炎
- D.子宫内膜异位症
- E.卵巢肿瘤

答案:D

解析:进行性痛经、不孕、盆底可触及多个痛性结节、右侧附件区触及直径约6cm的囊性包块, 最可能是子宫内膜异位症。故本题答案为D。

572.(A3/A4型题)女, 46岁。主诉排便时阴道脱出一物块, 检查见用力时阴道前壁膨出, 宫颈延长, 宫颈外口露于阴道口外, 宫体仍在阴道内, 后倾屈, 附件未扪本例应诊断为

- A.阴道前壁膨出
- B.子宫脱垂I度合并膀胱膨出
- C.阴道后壁膨出
- D.子宫脱垂II度重
- E.子宫脱垂II度轻合并膀胱膨出

答案:E

解析:1.子宫脱垂共分3度:I度轻型为宫颈外口距离处女膜缘小于4cm,但未达处女膜;重型为宫颈已达处女膜,但未超出该缘。II度轻型为宫颈已脱出阴道口,但宫体仍在阴道内;重型为宫颈及部分宫体已脱出阴道口。III度宫颈及宫体全部脱出至阴道外口。故本题应选E。

573.(A3/A4型题)成年男性,三月来双下肢无力、双下肢麻木逐渐发展到腰部,背后疼痛且咳嗽时加剧。查体左半侧T8下痛温觉消失;右下肢肌力III度,腱反射亢进, Babinski征阳性,右下肢足趾振动觉、位置觉消失。可能的诊断为

- A.T8附近脊髓髓内病变
- B.左T8附近脊髓髓外病变
- C.右T8附近脊髓髓外病变
- D.T8附近脊髓休克性病变
- E.右T8附近脊髓髓内病变

答案:C

解析:此题暂无解析

574.(A2型题)男,38岁。因反复左侧头痛半年,加重伴呕吐3天于急诊留观。查体:浅昏迷,双侧瞳孔为左侧3mm,右侧2mm,对光反应迟钝。右侧肢体肌力4级,右侧Babinski征阳性。最可能的诊断是

- A.脑梗死
- B.颅内血肿
- C.颅脑肿瘤
- D.蛛网膜下腔出血
- E.脑膜脑炎

答案:C

解析:根据患者的临床表现与实验室检查(腹泻2天,为水样便带少量粘液,量多,日十余次,相继呕吐数次。无发热、无腹痛。腓肠肌痉挛。体检:体温36.8°C,神志清,皮肤弹性差,脉细速,血压70/30mmHg。化验检查:大便镜检白细胞0~2/HP,血红蛋白160pdL,血白细胞计数 $12 \times 10^9/L$ ,中性粒细胞0.78,淋巴细胞0.12,单核细胞0.10),与霍乱的表现较为符合,故此题选D正确。

575.(A3/A4型题)男,38岁。因反复左侧头痛半年,加重伴呕吐3天于急诊留观。查体:浅昏迷,双侧瞳孔为左侧3mm,右侧2mm,对光反应迟钝。右侧肢体肌力4级,右侧Babinski征阳性。引起患者浅昏迷、瞳孔不等大及其他阳性体征的最可能原因是

- A.枕骨大孔疝
- B.小脑幕切迹疝
- C.左侧动眼神经麻痹
- D.左侧视神经损害
- E.脑干功能障碍

答案:B

解析:3.①颅内压增高的症状。②瞳孔改变:病初患侧瞳孔变小,随病情进展逐渐散大,进行性恶化,可致双侧瞳孔散大,此时患者多已处于濒死状态。③运动障

碍。④意识改变。⑤生命体征紊乱。提示小脑幕切迹疝。脑干功能障碍，昏迷程度深，持续时间长。

576.(A3/A4型题)患者，女性，40岁。一年前患者乘坐电梯时，被困在电梯里十几个小时后被救。数日后患者开始反复不自主地回忆起被困电梯里的情景，仿佛又回到当时，感觉非常逼真。内心非常恐惧，伴心慌、出冷汗、面色苍白、全身发冷。每天都在心惊胆战中度过，怕得要死。不愿回忆但控制不住，每次持续半小时以上，每天反复出现十余次。睡眠差，经常半夜在噩梦中惊醒。常常一个人发呆，自己感到对任何事情都发生不了兴趣，常常对家人大发脾气。为回避坐电梯，将自家高层卖掉。此病人最可能的诊断是

- A.急性应激障碍
- B.创伤后应激障碍
- C.分离(转换)性障碍
- D.病理性激情发作
- E.躁狂状态

答案:B

解析:此题暂无解析

577.(A3/A4型题)患儿4岁，其母提拉其手上台阶时，出现患儿哭闹，右肘疼痛，不思活动。查体:右肘关节无肿胀，未见明显畸形，X线片未见明显异常征象其诊断最可能是

- A.右肘关节软组织损伤
- B.习惯性右肩关节脱位
- C.右尺骨鹰嘴骨折伴肘关节前脱位
- D.右桡骨头半脱位
- E.右尺神经卡压综合征

答案:D

解析:此题暂无解析

578.(A3/A4型题)女性，40岁，手、膝关节痛1年，RF(+)。见双手多个近指关节肿胀、压痛，双膝关节活动弹响。对主要可能诊断帮助最大的检查是

- A.ESR检查
- B.抗Sm抗体
- C.抗SSB抗体
- D.膝关节X线检查
- E.双手X线检查

答案:E

解析:此题暂无解析

579.(A3/A4型题)患者女，50岁。类风湿关节炎病史7年，治疗不正规。近3个月来感双手指关节痛加重，晨僵约1小时。查体:双手第2~4掌指关节(MCP2~4)肿胀、左手第1~4近端指间关节(PIP1~4)肿胀，压痛明显，右手PIP2和PIP3肿胀伴压痛，双侧腕关节肿胀并屈伸明显受限。双手X线提示骨质疏松，双腕关节各骨融合，

双手掌指关节和近端指间关节间隙变窄。此患者双手X线达到类风湿关节炎的分期是

- A.I期
- B.Ⅱ期
- C.Ⅲ期
- D.Ⅳ期
- E.无法分期

答案:B

解析:类风湿关节炎X线检查有如下分期。①I期:X线显示关节周围软组织肿胀影及关节端骨质疏松。②Ⅱ期:X线片显示关节间隙因软骨破坏而变窄。③Ⅲ期:关节面出现虫蚀样破坏性改变。④Ⅳ期:出现关节半脱位和关节破坏后的纤维性和骨性强直。故选B。

580.(A3/A4型题)女, 20岁, 反复高热伴游走性关节痛, 口腔干燥、溃疡, 脱发月余, 化验尿蛋白++, 颗粒管型5个/HP, 间断有血尿, 类风湿因子1:20(+), 抗SSA抗体阳性, 抗双链DNA抗体阳性。诊断首先考虑

- A.风湿性关节炎
- B.类风湿关节炎
- C.系统性红斑狼疮
- D.慢性肾小球肾炎急性发作
- E.干燥综合征

答案:C

解析:1.抗双链DNA抗体为系统性红斑狼疮的特异性抗体, 题目中出现抗双链DNA抗体阳性, 应首先考虑系统性红斑狼疮, 并且该患者有关节疼痛、口腔溃疡及肾病变, 符合系统性红斑狼疮分类标准。

581.(A3/A4型题)患者女, 45岁。双手和膝关节肿痛伴晨僵1年。体检:肘部可及皮下结节, 质硬, 无触痛。最有助于确定诊断的是

- A.关节影像检查
- B.滑液检查
- C.抗核抗体
- D.ESR
- E.CRP

答案:A

解析:根据题中患者的临床症状与体征(双手和膝关节肿痛伴晨僵1年。体检:肘部可及皮下结节, 质硬, 无触痛), 应首先考虑类风湿关节炎, 关节影像检查对本病的诊断、关节病变的分期、监测病变的演变均很重要。抗核抗体对结缔组织病的诊断有意义。故此题选A正确。

582.(A3/A4型题)患者女性, 30岁, 20天前排尿时疼痛, 7天前出现左膝肿痛, 3天前右腕肿痛, 压痛明显, 查膝关节积液内WBC50000个/ml, HLA-B27阳性。诊断首先考虑

- A.强直性脊柱炎
- B.肠病性关节炎

- C.反应性关节炎
- D.感染性关节炎
- E.类风湿关节炎

答案:A

解析:此题暂无解析

583.(A3/A4型题)女性, 20岁, 服务业人员, 未婚, 不否认有性交行为。半月前躯干、四肢、双手掌跖出现红斑, 无痒痛感, 查躯干、四肢可见玫瑰色椭圆形斑疹, 对称分布, 掌跖部黄豆大小铜红色领圈样脱屑。要诊断梅毒还应做哪项检查

- A.RPRTPPA
- B.抗-HIV
- C.抗-HEV
- D.RPR
- E.血沉

答案:A

解析:此题暂无解析

584.(A3/A4型题)男, 38岁, 经理, 2周前有婚外性行为, 3天前尿道刺痒、刺痛, 查尿道口轻度红肿, 尿道分泌物呈浆液性, 少许。若确诊为生殖道衣原体感染治疗推荐方案为

- A.环孢素
- B.青霉素
- C.阿奇霉素
- D.甲硝唑
- E.头孢曲松

答案:C

解析:此题暂无解析

585.(A3/A4型题)女, 50岁, 因患短肠综合症, 予全胃肠外营养(TPN)治疗。应用一周时病人出现昏迷, 但尿内无酮体。病人既往曾有空腹血糖高(11mmol/L)。此病的预防主要是

- A.开始一周内注意葡萄糖输注的浓度、速度和与胰岛素的比例
- B.加强保肝
- C.加强导管护理、无菌操作
- D.纠正水和电解质紊乱, 预防酸中毒发生
- E.保护肾功能

答案:A

解析:此题暂无解析

586.(A1型题)最有助于自身免疫性胃炎诊断的实验室检查是

- A.血壁细胞抗体检测
- B.血胃蛋白酶原定量
- C.胃液中胃蛋白酶定量
- D.胃酸测定

E.血清胃泌素测定

答案:A

解析:胃萎缩又叫A型胃炎。是萎缩性胃炎一种,萎缩性胃炎分为A、B型胃炎。萎缩性胃炎是慢性胃炎的一种。A型胃炎主要是胃部平滑肌弥漫萎缩,其发病机制与自身免疫有关。诊断依靠血壁细胞抗体检测。故本题选A。

587.(A1型题)胃大部切除术后发生残胃癌至少是几年后

A.20年

B.5年

C.10年

D.15年

E.30年

答案:B

解析:胃大部分切除5年以上易出现残胃癌。

588.(A1型题)溃疡外科手术的适应症是

A.治愈后短期复发

B.周期性发作

C.年龄小于45岁

D.溃疡直径小于1cm

E.幽门螺杆菌反复感染

答案:A

解析:临床对胃溃疡手术指征掌握较宽,适应证主要有:①包括抗Hp措施在内的严格内科治疗无效的顽固性溃疡,如溃疡不愈合或短期内复发者;②发生溃疡出血、瘢痕性幽门梗阻、溃疡穿孔及溃疡穿透至胃壁外者;③溃疡巨大(直径 $>2.5\text{cm}$ )或高位溃疡;④胃十二指肠复合性溃疡;⑤溃疡不能除外恶变或已经恶变者。

589.(A1型题)腹部闭合性损伤诊断的关键在于确定有无

A.休克

B.内脏损伤

C.腹壁损伤

D.腹膜后血肿

E.颅脑损伤

答案:B

解析:此题暂无解析

590.(A1型题)腹部外伤合并失血性休克,主要处理原则为

A.快速补充液体

B.给予大量止血药物

C.主要为输血以补足血容量

D.应用大量抗生素控制感染

E.在积极治疗休克的同时手术探查止血

答案:E

解析:此题暂无解析

591.(A1型题)腹部损伤时做诊断性腹腔穿刺,抽出不凝固血液,最可能的诊断为

- A.空腔脏器破裂
- B.误穿入腹腔血管
- C.前腹壁血肿
- D.实质性器官破裂
- E.后腹膜间隙血肿

答案:D

解析:实质性脏器损伤主要表现为腹腔出血、腹痛,腹膜刺激征较轻。因腹壁有破坏纤维作用,故抽出血液是不凝的。

592.(A1型题)药物的pKa是指

- A.各药物的pKa不同
- B.是弱酸性药物在溶液中50%离子化时的pH值
- C.与pH的差值变化时,药物的离子型与非离子型浓度的比值的相应变化
- D.pKa大于7.5的药物在胃肠道呈离子型
- E.pKa小于4的药物在胃肠道呈离子型

答案:C

解析:此题暂无解析

593.(A1型题)按一级消除动力学消除的药物特点为

- A.药物的半衰期与剂量有关
- B.为绝大多数药物的消除方式
- C.单位时间内实际消除的药量不变
- D.单位时间内实际消除的药量递增
- E.体内药物经2~3个 $t_{1/2}$ 后,可基本清除干净

答案:B

解析:一级消除也称恒比消除,即单位时间内消除药物的比例恒定,药物的消除速率与体内血药浓度成正比,药物的消除半衰期恒定。一级消除为绝大多数药物在治疗剂量下的消除方式,体内药物经5个半衰期( $t_{1/2}$ )后基本清除干净。零级消除也称恒速消除,即单位时间内消除的药物的量是恒定的,不随体内血药浓度的变化而变化,药物的消除半衰期不是恒定的,给药剂量越大半衰期越长。通常是用药剂量过大时,药物在体内的消除能力达到饱和所致。

594.(A1型题)影响药物转运的因素不包括

- A.药物的脂溶性
- B.药物的解离度
- C.体液的pH值
- D.胎盘屏障
- E.血脑屏障

答案:D

解析:此题暂无解析

595.(B型题)能诱导肝药酶加速自身代谢的药物是

- A. 乙琥胺
- B. 苯妥英钠
- C. 地西泮
- D. 氯硝西泮
- E. 卡马西平

答案:B

解析:此题暂无解析

596.(B型题)对各型癫痫都有效的药物是

- A. 乙琥胺
- B. 苯妥英钠
- C. 地西泮
- D. 丙戊酸钠
- E. 硫酸镁

答案:D

解析:此题暂无解析

597.(B型题)碳酸锂用于

- A. 躁狂症
- B. 抑郁症
- C. 焦虑症
- D. 精神分裂症
- E. 神经官能症

答案:A

解析:此题暂无解析

598.(A2型题)患者, 男性, 54岁。有糖尿病史, 近几年因工作紧张患高血压:22/13.6kPa。最好选用哪种降压药

- A. 氢氯噻嗪
- B. 可乐定
- C. 氯沙坦
- D. 普萘洛尔
- E. 利血平

答案:C

解析:此题暂无解析

599.(A2型题)患者, 男性, 53岁, 2型糖尿病, 控制饮食无效, 体重超重, 过度肥胖, 选下列哪种降糖药为最佳

- A. 格列齐特
- B. 格列苯脲
- C. 甲苯磺丁脲
- D. 格列吡嗪
- E. 甲福明

答案:E

解析:此题暂无解析

600.(A2型题)患者, 男性, 40岁, 慢性肾炎合并胆囊炎宜用

A.四环素

B.头孢唑啉

C.多西环素

D.庆大霉素

E.多黏菌素

答案:C

解析:此题暂无解析