

第一站 病案分析 50 分钟

1、王某，女，38 岁，干部，2017 年 4 月 6 日初诊。患者半年前热水洗手后突发皮肤剧痒，后遇热或肥皂水烫洗后则皮肤剧痒难忍反复发作。伴有口干不欲饮，纳差，腹胀。查体：皮损色暗，粗糙肥厚，对称分布，舌淡，苔白，脉弦细。月经史无异常。请与牛皮癣相鉴别

要求：根据上述摘要，在答题卡上完成书面分析

项目	评分标准	分值
中医疾病诊断	乳癖	3
中医证候诊断	肝郁痰凝证	3
中医辨病辨证依据 (含病因病机分析)	患者双侧乳房均出现肿块，伴疼痛，与情绪相关，故诊断为乳癖。情志不舒，肝郁气滞，脾失健运，痰浊内生，气血瘀滞，痰凝瘀血阻于乳络，故致乳房肿块。疼痛，肝郁不舒，故胸闷胁胀，善郁易怒，眠不实，肝郁克土，脾失健运。故见纳谷不香，苔薄黄，脉弦滑均为肝郁痰凝之象。	4
中医类证鉴别	乳癖与乳岩的鉴别：二者都可以见到乳房肿块，区别在于，乳岩多发生于 40—60 岁中老年妇女。多无疼痛，逐渐长大，肿块质地坚硬如石，表面凹凸不平，边缘不清，活动度差，后期破溃如预花样，后较差。乳癖是以乳房有形状大小不一的肿块，来疼痛，与月经周期相关为主要表现的病证。一般预后较好	3
中医治法	疏肝解郁，化痰散结	2
方剂名称	逍遥蒺贝散加减	2
药物组成、剂量及煎服法	柴胡 10g 白芍 12g 当归 20g 白术 9g 瓜蒌 20g 贝母 10g 法半夏 6g 胆南星 6g 生牡蛎 30g (先煎) 茯苓 12g 山慈菇 6g 3 剂，水煎服，每日 1 剂，早晚分服。	3

2、陈某，女，35岁，已婚。患者1年前出现右侧乳房间断胀痛，可触及乳房肿块，在当地医院B超提示“乳腺囊性增生”，平素善郁易怒，时有胸闷、胁胀。眠不实，纳谷不香，二便尚可，苔薄黄，脉弦滑，请与乳岩相鉴别。

要求：根据上述摘要，在答题卡上完成书面分析

项目	评分标准	分值
中医疾病诊断	湿疮	3
中医证候诊断	血虚风燥证	3
中医辨病辨证依据 (含病因病机分析)	以皮肤剧痒，遇热或肥皂水烫洗后则皮肤剧痒难忍为主症，辨病为湿疮。现症见口干不欲饮，纳差，腹胀。查体：皮损色暗，粗糙肥厚，对称分布，舌淡，苔白，脉弦细，辨证为血虚风燥证。病久耗伤阴血，血虚风燥。	4
中医类证鉴别	牛皮癣好发于颈侧、肘、尾骶部，常不对称，有典型的苔藓样变，皮损倾向干燥，无多形性损害。	3
中医治法	养血润肤，祛风止痒	2
方剂名称	当归饮子加减	2
药物组成、剂量 及煎服法	当归 30g 白芍 30g 川芎 30g 生地黄 30g 白蒺藜 30g 防风 12g 荆芥穗 12g 制首乌 30g 白鲜皮 12g 黄芪 30g 蝉蜕 6g 丹参 10g 鸡血藤 15g 乌梢蛇 10g 3剂，水煎服，每日1剂，早晚分服。	3

第二站 中医操作、病史采集、中医临床答辩 20 分钟

1、试题：叙述并指出膈俞、血海、听宫的定位（10 分）

答案：

膈俞：在脊柱区，第七胸椎棘突下，后正中线旁开 1.5 寸

血海：在股前区，髌底内侧端上 2 寸，股内侧肌隆起处

听宫：在面部，耳屏正中与下颌骨髁状突之间的凹陷中

2、试题：叙述并演示隔姜灸的操作方法（10 分）

答案：

1.切取生姜片，每片直径 2~3 cm，厚 0.2~0.3 cm，中间以针刺数孔

2.选取适宜体位充分暴露待灸腧穴

3.放置姜片和艾柱，点燃艾柱：将姜片置于穴上，把艾柱置于姜片中心，点燃艾柱尖端，任其自燃

4.调试温度：如患者感觉局部灼痛不可耐受，术者可用镊子将姜片一侧夹住端起，稍待片刻，重新放下再灸

5.更换艾柱及姜片：艾炷燃尽，除去艾灰，更换艾柱依前法再灸，施灸数壮后，姜片焦干萎缩时，应置换新的姜片

6.掌握灸量：一般每穴灸 6~9 壮，至局部皮肤潮红而不起疱为度，灸毕去除姜片及艾灰。

3、提问：李某，男，78 岁，退休。水肿，加重一个月。（10 分）

要求：

1.现病史询问内容

2.相关病史询问内容

3.根据临床症状不同等情况，有针对性地询问其他相关内容

答案：

1.现病史询问内容。（7 分）

（1）主症的时间，程度：发病缓急？是眼睑先肿还是下肢先肿？水肿是指凹性还是非指凹性？有无诱发因素？是否有心悸、疮毒、紫癜以及久病体虚病史？恶心是阵发性还是持续性？

（2）伴随症状：神志是否清楚？是否伴有身体困重？是否胸闷喘息？食欲如何？有无腹胀？小便是否正常？是否伴有畏寒肢冷、面色白？大便是否正常？有无腰膝酸软？

（3）诊疗经过：是否做过肾功能、尿常规等相关检查？是否确诊？有无治疗，怎样治疗，效果如何？

2.相关病史询问内容。（2 分）既往史、个人史、家族史、过敏史、手术史有无异常？

3.根据临床症状不同等情况，有针对性地询问其他相关内容。（1 分）

3、试题：叙述滑脉的脉象特征及临床意义（5 分）

答案：

滑脉脉象特征：往来流利，应指圆滑，如盘走珠

临床意义:多见于痰湿、食积和实热等病证,亦是青壮年的常脉,妇女的孕脉

第三站 体格检查、西医操作、西医临床答辩

1、试题:演示眼球运动的检查方法(10分)

答案:

- 1.嘱被检查者取坐位,检查者立于被检查者前面
- 2.检查者左手置于被检查者头顶并固定头部,确保头部不能随视线转动,右手指尖(或棉签)放在被检查者眼前30~40cm处
- 3.嘱被检查者两眼注视检查者右手指尖,并随检查者右手指尖移动方向运动
- 4.检查者右手指尖移动的方向是:被检者的左侧→左上→左下,右侧→右上→右下(注意回到中点)
- 5.注意观察眼球运动的幅度,灵活性、持久性及同步情况,询问有无复视

2、试题:演示颈椎损伤的搬运方法(10分)

答案:

- 1.对清醒伤员询问受伤部位,搬运时宜用硬质担架或就地取材如木板、门板等,用颈托固定伤员颈部
- 2.搬运时一人负责扶托下颌和枕骨,沿纵轴略加牵引力,使颈部保持中立位,与躯干长轴一致,同其他三人协同将伤员平抬到担架上,(考官可询问是否需要帮助)
- 3.在头颈部两侧用沙袋或卷叠的衣物固定,防止在搬运中头颈部转动或弯曲活动,保持呼吸道通畅
- 4.切忌被单提拉两端或一人抬肩另一人抬腿的搬运法
- 5.在搬动时尽可能减少不必要的活动

3、试题:试述原发免疫性血小板减少症的治疗(5分)

答案:

- 1.一般治疗:出血严重者应注意休息,血小板低于 $20 \times 10^9/L$ 者,应严格卧床,避免外伤,注意止血药的应用及局部止血
 - 2.糖皮质激素是治疗本病的首选药物,近期有效率约为80%
 - 3.脾切除是治疗本病的有效方法之一
- (1)适应证:①正规糖皮质激素治疗3~6个月无效②泼尼松维持量每日需大于30mg③有糖皮质激素使用禁忌证④ ^{51}Cr 扫描脾区放射指数增高
- (2)禁忌证:①年龄小于2岁②妊娠期③因其他疾病不能耐受手术、切脾治疗有效率为70%~90%
- 4.免疫抑制剂治疗等